

# Plan de gestion 2022-2027

COTEAU ET PRAIRIES  
DES CAFORTS



Réserve  
naturelle régionale  
PAYS DE LA LOIRE




## TOME 1

### DIAGNOSTIC ADMINISTRATIF ÉVALUATION DU PLAN DE GESTION



Conservatoire  
d'espaces naturels  
Pays de la Loire





# RESERVE NATURELLE REGIONALE COTEAU ET PRAIRIES DES CAFORTS PLAN DE GESTION 2022-2027 TOME 1

Avril 2022

Plan de gestion élaboré par le Conservatoire d'espaces naturels des Pays de la Loire



## Equipe projet :

Rédaction : Antoine Avrilla

Relecture : Marek Banasiak, Catherine Gaudin



Ce document peut être référencé de la manière suivante :

AVRILLA A. (coord.), 2022 - Réserve naturelle régionale « Coteau et prairies des Caforts » : Plan de gestion 2022-2027 – Tome 1, 240p.

## Table des matières

|                                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Introduction .....</b>                                                                                | <b>1</b>   |
| Généralités .....                                                                                        | 1          |
| Intérêt écologique .....                                                                                 | 1          |
| <b>Diagnostic administratif et socioéconomique .....</b>                                                 | <b>4</b>   |
| <b>A.1. Informations générales sur la RNR .....</b>                                                      | <b>4</b>   |
| A.1.1. Création de la réserve .....                                                                      | 4          |
| A.1.2. Localisation de la réserve .....                                                                  | 7          |
| A.1.3. Limites administratives et le foncier de la réserve .....                                         | 9          |
| A.1.4. Gestion de la RNR .....                                                                           | 14         |
| A.1.5. Valeurs et enjeux de la RNR .....                                                                 | 14         |
| A.1.6. Evolution historique de l'occupation des sols de la RNR .....                                     | 18         |
| <b>A.2. Le cadre socioéconomique du site et de son environnement proche .....</b>                        | <b>23</b>  |
| A.2.1. Les représentations culturelles de la RNR .....                                                   | 23         |
| A.2.2. Le patrimoine culturel, paysager et historique de la RNR .....                                    | 23         |
| A.2.3. Les activités socioéconomiques dans la RNR .....                                                  | 23         |
| <b>A.3. La vocation à accueillir le public et l'intérêt pédagogique de la RNR .....</b>                  | <b>26</b>  |
| A.3.1. Les activités pédagogiques et les équipements en vigueur .....                                    | 26         |
| A.3.2. Capacité à accueillir du public .....                                                             | 26         |
| A.3.3. Intérêt pédagogique .....                                                                         | 26         |
| A.3.4. Place de la RNR dans le réseau local d'éducation à l'environnement .....                          | 27         |
| <b>B – Présentation du plan de gestion 2016-2021 .....</b>                                               | <b>28</b>  |
| <b>B.1 - Le plan de gestion 2016 – 2021 .....</b>                                                        | <b>28</b>  |
| B.1.1- Structuration du plan de gestion 2016-2021 .....                                                  | 28         |
| B.1.2- Objectifs du plan de gestion 2016-2021 .....                                                      | 28         |
| B.1.3 - Opérations du plan de gestion 2016-2021 .....                                                    | 29         |
| B.1.4- Fiches actions et critères d'évaluation des résultats .....                                       | 33         |
| <b>B.2- Objectifs et méthodes d'évaluation du plan de gestion .....</b>                                  | <b>35</b>  |
| B.2.1- Objectifs .....                                                                                   | 35         |
| B.2.2- Méthodes et outils .....                                                                          | 35         |
| B.2.3- Présentation et synthèse de l'évaluation à mi-parcours .....                                      | 38         |
| <b>C- Evaluation finale du plan de gestion 2016 – 2021 .....</b>                                         | <b>40</b>  |
| <b>C.1- Bilan de la réalisation du plan de gestion 2016-2021 .....</b>                                   | <b>40</b>  |
| C.1.1- Bilan global de la réalisation du plan de gestion : par opération .....                           | 40         |
| C.1.2- Localisation de mise en œuvre des opérations de gestion .....                                     | 45         |
| <b>C.2- Bilan final des opérations de gestion et des objectifs .....</b>                                 | <b>46</b>  |
| C.2.1- Analyse de la structure et de la codification des opérations du plan de gestion 2016-2021 .....   | 46         |
| C.2.2 - Evaluation des opérations actions par actions selon l'arborescence .....                         | 47         |
| C.2.4 -Opérations non prévues .....                                                                      | 164        |
| C.2.5 Synthèse de l'évaluation par opérations : formulation, pertinence, efficacité et efficience .....  | 165        |
| C.2.6- Synthèse de l'évaluation des objectifs opérationnels .....                                        | 169        |
| <b>C.3- Synthèse de l'amélioration des connaissances .....</b>                                           | <b>171</b> |
| C.3.1- Présentation synthétique des opérations d'amélioration des connaissances du plan de gestion ..... | 171        |
| C.3.4- Conclusion sur l'amélioration des connaissances .....                                             | 173        |
| C.3.5- Synthèse et analyse sur les suivis .....                                                          | 174        |
| <b>D. Evaluation des moyens financiers, matériels et humains .....</b>                                   | <b>174</b> |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>D.1- Bilan financier .....</b> | <b>174</b> |
| D.1.1 Les dépenses .....          | 174        |
| D.1.2 Les recettes .....          | 177        |
| D.1.3 Bilan humain .....          | 177        |
| D.1.4 Bilan matériel .....        | 178        |
| <b>Bibliographie .....</b>        | <b>179</b> |
| <b>Annexes .....</b>              | <b>184</b> |



# INTRODUCTION

## GENERALITES

Depuis 1995, le Conservatoire d'espaces naturels des Pays de la Loire (ancien Conservatoire d'espaces naturels de la Sarthe et historiquement Conservatoire du Patrimoine Naturel Sarthois) gère et préserve le site des Coteau et prairies des Caforts, sur la commune de Luché-Pringé au cœur de la vallée du Loir. Les différentes actions menées sur ce site de 3,5 hectares ont permis sa labellisation en Réserve naturelle régionale (RNR) en 2009. S'en est suivie l'élaboration d'un plan de gestion sur 6 ans (2009-2015) puis d'un second plan de gestion (2016-2021) qui prend fin cette année.

L'intérêt patrimonial de la RNR repose principalement sur la présence de pelouses calcaires, d'habitats de mégaphorbiaies et de cavités à chiroptères, qui accueillent une flore et une faune rares et patrimoniales.

Le présent document correspond au premier tome du nouveau plan de gestion (2022-2027). Il comprend :

- Le diagnostic administratif et socioéconomique,
- La présentation du plan de gestion 2016-2021,
- L'évaluation finale du plan de gestion 2016-2021.

## INTERET ECOLOGIQUE

### Habitats naturels et flore

La RNR comprend trois grands types d'habitats distincts :

- Un gradient d'habitats thermophile sur le coteau : des pelouses calcicoles et des fourrés à érables et ormes champêtres ;
- Un ensemble d'habitats humides alluviaux liés aux crues saisonnières du Loir et de l'Organne ;
- Un réseau de cavités : ancienne carrière souterraine et habitations troglodytiques creusées dans le tuffeau du coteau.

6 habitats naturels représentés sur le site sont considérés comme remarquables dans le plan de gestion 2016-2021, soit pour leur classement en habitat d'intérêt communautaire au titre de la Directive Habitats, faune, flore (1992), soit pour leur rareté à l'échelle régionale voire départementale :

- Habitats liés au coteau calcaire :
  - **Pelouses calcaires semi-arides médio-européennes à *Bromus erectus* (*Mesobromion erecti*) (E 1.26)** : les pelouses calcicoles et oligotrophes à Brome érigé occupent une partie du coteau de la RNR. La flore y est diversifiée et caractérisée par la présence d'un important cortège d'Orchidées. On y trouve également la Bugrane jaune (*Ononis natrix*).
  - **Végétations de falaises et éboulis calcaires (H 3.2)**. Localisée au niveau de la falaise en limite nord de la RNR, la végétation se compose d'espèces xérophiles se développant sur de fines accumulations de matière organique. Les enjeux floristiques principaux tiennent à la présence d'une petite population d'Œillet des fleuristes (*Dianthus caryophyllus*) et d'Echinops à tête ronde (*Echinops sphaerocephalus*).

- **Pelouses des dalles rocheuses calcaires à Orpin blanc (CORINE E 1.11).** Sur le sommet du coteau calcaire se trouvent une dalle de roches peu végétalisée et présentant des espèces typiques de ce type de milieu comme des orpins, l'Ail à tête ronde (*Allium sphaerocephalon*) et le Bugle Petit-Pin (*Ajuga chamaeptytis*).
- **Pelouses calcaires ourléifiées à Origan (E 5.21)** On y retrouve un cortège d'espèces liées aux prairies mésoxérophiles, à la faveur d'un replat en pied de coteau qui offre un sol plus épais. Les espèces typiques sont la Centaurée jacée (*Centaurea jacea*) ou le Lin à feuilles étroites (*Linum usitatissimum* subsp. *angustifolium*).
  - Habitats alluviaux, liés aux prairies humides :
- **Mégaphorbiaie mésotrophe à Valériane officinale ; Faciès à Roseau commun, Faciès à Baldingère (E 5.41).** Le Faciès à baldingère se situe le long de l'Organne. Il s'explique probablement par des conditions stationnelles plus hydromorphes, favorable à la Baldingère. Attenant à cet habitat, la mégaphorbiaie mésotrophe à faciès à Roseau commun se constitue d'un cortège d'espèces similaires, mais avec une dominance du Roseau commun (*Phragmites australis*).
 

*La réactualisation de la cartographie des habitats pour ce nouveau plan de gestion (Tome 2) ne considère pas autant d'habitats, les végétations de falaises et de dalles rocheuses étant de surface très restreintes et considérées comme non significatives à l'échelle du coteau.*

  - Réseau de cavités :
- **Grottes non exploitées par le tourisme (CORINE : H 1.2) :** il s'agit de l'ensemble de galeries souterraines creusées dans la falaise calcaire, soit 3000 m<sup>2</sup>. Elles présentent de forts enjeux pour la conservation des Chiroptères en période d'hivernage avec environ 400 individus recensés en 2021, dont 343 Murins à oreilles échancrées (*Myotis emarginatus*).

En outre, la RNR abrite une flore diversifiée comprenant des espèces d'intérêt patrimonial :

- Le Grémil bleu-pourpre (*Aegonychon purpurocaeruleum*), quasi menacé sur la Liste Rouge Régionale
- La Bugrane jaune (*Ononis natrix*) ; quasi menacée sur la Liste Rouge Régionale et déterminante ZNIEFF
- L'Ail à tête ronde (*Allium sphaerocephalon*), n'ayant pas de statut patrimonial particulier mais considérée comme peu répandue localement.



## Faune

---

- Invertébrés

Les cortèges d'invertébrés sont diversifiés sur la RNR, à la faveur d'une mosaïque d'habitats sur le coteau sec et de la zone humide. En particulier, le peuplement se caractérise par la présence de deux espèces remarquables, protégées au niveau national :

- Le Cuivré des marais (*Lycaena dispar*) a été observé pour la première fois sur le site en 2005, et contacté quasiment chaque année depuis. La Sarthe constitue la limite de répartition nord-ouest de cette espèce menacée par la disparition des prairies humides et l'intensification des pratiques agricoles ;
- l'Azuré du serpolet (*Phengaris arion*), connu depuis les années 1990 sur le site, et plutôt inféodé aux milieux calcicoles à Origan.

On note par ailleurs la présence (parfois ponctuelle) de plusieurs espèces de lépidoptères d'intérêt patrimonial comme l'Azuré bleu céleste (*Lysandra bellargus*) présentant des effectifs très importants chaque saison, le Thècle de l'Orme (*Satyrrium w-album*), la Lucine (*Hamearis lucina*) ou le Fluoré (*Colias alfacariensis*).

S'agissant des Orthoptères, la présence du Conocéphale des roseaux (*Conocephalus dorsalis*) est documentée.

# DIAGNOSTIC ADMINISTRATIF ET SOCIOECONOMIQUE

## A.1. INFORMATIONS GENERALES SUR LA RNR

La RNR des « Coteau et prairies des Caforts » est située à l'est de la commune de Luché-Pringé (sud de la Sarthe), dans le prolongement du Coteau du Port des Roches. Elle fait partie intégrante de la vallée du Loir.

Elle occupe une superficie de 3ha 50a 42ca, en bordure de l'Organne (affluent du Loir).

Propriété du CEN des Pays de la Loire, elle est gérée à des fins de conservation du patrimoine naturel depuis janvier 1995.

Le patrimoine naturel de la RNR est constitué d'un complexe de milieux liés aux prairies alluviales ainsi que d'un coteau calcaire sec et d'un réseau de cavités souterraines et d'habitats troglodytiques. On y trouve plusieurs espèces protégées et menacées sur le territoire national, comme le Cuivré des marais (*Lycaena dispar*), l'Azuré du serpolet (*Phengaris arion*) ou encore le Murin à oreilles échancrées (*Myotis emarginatus*).

### A.1.1. CREATION DE LA RESERVE

#### A.1.1.1. Historique

##### Exploitation et exportation du tuffeau

L'histoire du coteau des Caforts est très marquée par l'exploitation de la pierre de tuffeau, qui explique d'ailleurs la présence d'une vaste cavité souterraine au sein de la Réserve naturelle régionale.

Il semble que l'utilisation de la pierre du coteau du Port des roches ait débuté dès le Moyen-âge. Au XIX<sup>e</sup> siècle, une importante activité d'extraction de pierres est en place tout le long de la falaise de tuffeau. Les pierres sont alors acheminées pour exportation jusqu'au « Port des roches », situé le long du Loir. Le nom de ce lieu-dit atteste d'ailleurs de cette activité d'extraction et d'export. Le Loir est alors navigable jusqu'à Luché. Les gabares (*bateaux plats d'une dizaine de mètres de long destinés au transport de marchandises*) accostent pour débarquer leurs produits provenant des vallées de la Loire et du Loir, et en repartir lourdement chargées de pierres de tuffeau et de barriques de vin produit sur les coteaux ensoleillés de Luché-Pringé et de Mareil-sur-Loir.

De cette activité traditionnelle ne subsistent que quelques traces :

- Une galerie souterraine d'environ 0,30 ha aux Caforts, et en un ensemble de cavités creusées à l'intérieur du coteau du Port des roches.
- Des maisons troglodytiques aménagées tout le long de la falaise, dont une aux Caforts.
- Un grand four à pain, encore fonctionnel, au lieu-dit « les Piliers », qui devait autrefois alimenter tout le village. Cette grande cavité est aujourd'hui propriété du Département.

##### Utilisation pendant la Seconde Guerre mondiale

En 1943, les Allemands s'intéressent à l'ancienne carrière des Piliers, en bordure de la D 214 à Luché-Pringé (15km à l'est d'Aubigné-Racan). Cette carrière peut en effet être raccordée à la voie

ferrée Le Lude-La Flèche-Le Mans et comprend une annexe (vaste cave) en capacité d'accueillir des troupes et des techniciens.


L'occupant envisage d'y effectuer le montage de nouvelles armes stratégiques, les Vergeltungswaffe 1, plus connues sous l'acronyme "V1", dont les premières tombent sur Londres le 13 juin 1944. Il s'agit de véritables bombes volantes (une tonne d'explosif) propulsées à 150km/h par un moteur à réaction. Peu performantes, mais psychologiquement efficaces, ces V1 sont remplacés en septembre de la même année par les V2, missiles sol-sol à vitesse supersonique imaginés par l'ingénieur Wernher von Braun. Nous ne savons pas si des V1 et V2 ont été assemblées dans la carrière des Piliers et son annexe, mais ce qui est établi, c'est qu'y ont été stockés le carburant et le comburant destinés aux V1 et que plus de 500 femmes russes furent employées par les Allemands pour la réalisation de travaux destinés à la transformation de l'ancienne champignonnière de Luché en usine souterraine militaire.

### Culture du champignon

Toutes ces cavités ont par ailleurs été exploitées pour la culture du champignon de Paris. Aux Caforts, cette activité a cessé dans les années 1970.

Après la fermeture de la champignonnière des Caforts, le coteau, laissé quelques années à l'abandon, s'est totalement embroussaillé. La maison troglodytique a continué d'être habitée un certain temps.

A noter que de cette époque ont été laissées des ruines et/ou gravats entre les deux entrées de la cavité principale. Ils ont été enfouis à la fin des années 1990 par le CPNS (ex CEN). Aujourd'hui ils sont donc sous la butte embroussaillée située sur la partie Est de la parcelle YB 46.



Culture du Champignon de Paris à Luché-Pringé

### La prise en charge par le CEN des Pays de la Loire

Depuis 1993, le coteau est géré par le Conservatoire d'espaces naturels Pays de la Loire (anciennement CEN Sarthe et CPNS).

L'intérêt du site repose sur un patrimoine historique et culturel riche dont on trouve encore de nombreuses traces : maisons troglodytiques, cavités aménagées pour la culture des champignons,



essences végétales cultivées et naturalisées comme le Noyer, le Prunier, le Poirier sauvage, le Sorbier domestique, la Vigne cultivée, l'Œillet giroflé et l'Echinops à tête ronde.

La partie coteau a été acquise par le Conservatoire en 1995. Des travaux de restauration ont alors été réalisés : enlèvement des débris (carcasses de voitures ou de machines agricoles devant et aux entrées de la cavité), débroussaillage, gyrobroyage, puis mise en œuvre du pâturage. Un troglodyte d'environ 15m<sup>2</sup> situé sous l'actuelle butte entre les deux entrées (zone embroussaillée) est emmuré par le CPNS, sans déblayage préalable (Bernard Tilly, comm. pers). Il ne reste plus de trace actuellement de cet abri, ni de son entrée.

En 1996, la partie zone humide (parcelle YP 02) passe sous maîtrise d'usage du CPNS, via un bail de location de 9 ans. Cette parcelle est ensuite acquise en 2005. Elle représente 2,5 ha.

Afin de mettre en place une gestion cohérente et efficace sur le site, le Conservatoire a sollicité le Conseil régional le 23 mai 2008 pour une demande de classement des terrains en Réserve naturelle régionale. Cette démarche s'inscrit dans la politique régionale de création de Réserves naturelles régionales (délibérations des 26 et 27 janvier 2006).

Le 29 juin 2009, le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) a rendu un avis favorable sur le classement de la RNR, et validé également son plan de gestion.

La Réserve naturelle régionale « Coteau et prairies des Caforts » a été labellisée le 14 décembre 2009 par délibération de la Commission permanente du Conseil régional, laquelle a également approuvé dans le même temps son premier plan de gestion, pour la période 2009-2014.

Le Comité consultatif de la RNR a été institué par arrêté du président de région du 1<sup>er</sup> octobre 2009. Il donne la liste des membres du comité, et désigne le CEN comme gestionnaire de la RNR.

En 2017, plusieurs parcelles voisines sont acquises par le Conservatoire, en amont de l'Organne, pour une superficie de 2,5ha supplémentaires. Enfin, début 2022, une petite parcelle située au nord du coteau est acquise. Elle abrite un petit boisement de pente au-dessus de la falaise. Toutes ces parcelles ne sont à ce jour pas labellisées RNR, mais sont incluses dans la gestion du site.

### **A.1.1.2. Résumé des intérêts qui lui ont valu le classement en RNR**

Une réserve naturelle régionale est un outil réglementaire apte à garantir la préservation d'un site naturel à l'intérêt patrimonial fort pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour la protection des milieux naturels. (Art. L332-2 du Code de l'Environnement). Le Conseil Régional des Pays de la Loire, a choisi de classer en Réserve Naturelle Régionale, les sites ayant une importance particulière pour la conservation :

- de la faune,
- de la flore,
- du sol,
- des eaux,
- des gisements de minéraux et de fossiles,
- et en général du milieu naturel,

ainsi que les sites qu'il convient de soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. (Art. L332-1 du Code de l'environnement).

Les milieux et les espèces d'intérêt patrimonial présents sur le site « du coteau, prairie et cavité souterraine des Caforts » ont pu être maintenus grâce à une gestion conservatoire du site réalisée par le CPNS dès 1995, année d'acquisition du coteau. La maîtrise foncière associée à la labellisation en RNR ont permis de protéger de manière pérenne les Caforts.

Le site des Caforts a été classé pour sa mosaïque d'habitats remarquables. Il comporte :

- une grande cavité abritant différentes espèces de chiroptères en hiver,

- un coteau calcaire typique de la vallée du loir dont l'enjeu principal était et reste son maintien ouvert, les habitats de pelouse étant menacés dans ce secteur. Y sont présentes des espèces patrimoniales telles que le Grémil bleu pourpre, l'Azuré du serpolet ou l'Azuré bleu-céleste.
- une zone humide de 2,5ha située en contexte bocager, et abritant notamment le Cuivré des marais, papillon patrimonial.

### **A.1.1.3. Réglementation**

Le classement en RNR en 2009 implique différentes mesures de protection et de réglementation sur le site. Ces mesures sont synthétisées ici, et consultables en détail en annexe 1 (les dérogations à ces articles ne sont pas systématiquement mentionnées ici).

- Article 3.1 - Protection de la faune de la réserve : Interdiction d'introduire des espèces, de porter atteinte aux espèces présentes, de troubler ou déranger volontairement les animaux domestiques et non domestiques.

- Article 3.2 – Protection de la flore de la réserve : Interdiction d'introduire des espèces, de porter atteinte aux espèces présentes.

- Article 3.3 – Exploitation forestière : Toute exploitation forestière est interdite, sauf si prévue au plan de gestion, si opération de sécurité ou à caractère sanitaire.

- Article 3. 4 - Protection du patrimoine géologique et paléontologique de la réserve : la collecte des minéraux et des fossiles est interdite.

- Article 3. 5 - Activité pastorale et agricole : elles s'exercent conformément aux conventions de gestion passées avec les exploitants. E retournement de prairies, le drainage ou la modification du système hydraulique à des fins d'assèchement, la plantation de peupliers et l'emploi d'engrais, pesticides, insecticides est interdit.

- Article 3.6 - Fréquentation : La circulation et le stationnement des personnes ne sont autorisés que sur les cheminements prévus à cet effet. La pénétration à l'intérieur des parcelles est interdite.

- Article 3.7 – Activités de loisirs : strictement limitées aux activités prévues dans le plan de gestion.

- Article 3.8 – Animaux domestiques : interdits, sauf ceux participant aux missions d'entretien.


- Article 3.9 – Accès aux véhicules à moteur : interdits, sauf participant à l'entretien et aux activités prévues du plan de gestion.

- Article 3.10 – Travaux publics et privés : interdits si susceptibles de modifier l'état et l'aspect des lieux, sauf si prévus dans le plan de gestion.

- Article 3.11 : Autres interdictions : interdiction de polluer le site de quelque manière que ce soit (qualité de l'eau, dépôts d'ordures, publicité, feux...).

## **A.1.2. LOCALISATION DE LA RESERVE**


La Réserve Naturelle Régionale des Caforts est située dans la région des Pays de la Loire, dans le département de la Sarthe et sur la commune de Luché-Pringé. La commune fait partie de la communauté de communes Sud Sarthe, créée le 1<sup>er</sup> janvier 2017 et issue de la fusion de 3 anciennes communautés de communes, dont celle du bassin du ludois à laquelle appartenait Luché-Pringé.



● RNR des Caforts

Carte 1: Localisation du site







### A.1.3. LIMITES ADMINISTRATIVES ET LE FONCIER DE LA RESERVE

Les terrains labellisés en RNR appartiennent au CEN des Pays de la Loire. La liste des parcelles incluses dans le périmètre est donnée dans le tableau suivant.

Selon les données cadastrales, la surface labellisée en RNR s'étend sur **3 ha 50a 42 ca** (cavité souterraine comprise).

Le site labellisé des « Coteau et prairies des Caforts » a été acquis en deux opérations foncières, le coteau et sa cavité le 6 janvier 1995 pour 25 000 francs à M. et Mme GREGOIRE, et la prairie des Caforts le 27 septembre 2005. A noter que la partie prairie (YP 2) est sous maîtrise d'usage par le Conservatoire depuis 1996.

#### - **Coteau des Caforts**

Le coteau est constitué de 5 parcelles situées en limite des lieux dits la Violonnerie et l'Oiselière. La falaise de tuffeau matérialise la limite nord de l'entité protégée. La route départementale 214 de Luché-Pringé à Coulongé délimite la partie sud du coteau.

#### - **Prairies des Caforts**

La prairie localisée au lieu-dit le Pré des Caforts comprend une parcelle longée au nord par la route de Luché-Pringé à Coulongé et au sud par le ruisseau l'Organne (le coteau et les prairies des Caforts sont donc séparés par une route, la D214, laquelle traverse la RNR). L'Organne se jette dans le Loir à l'angle ouest de la parcelle YP2.

#### - **Cavité souterraine**

La cavité dispose de deux entrées principales donnant sur le coteau, elle est entière propriété du Conservatoire d'espaces naturels des Pays de la Loire d'après l'acte de vente du 06 janvier 1995. Elle est située en-dessous de deux parcelles cultivées, les parcelles YB0027 et YB0216. A noter la présence d'un puits d'aération de 14,85m au fond de la cavité (extrémité nord) qui ressort au niveau de la parcelle YB0027. La cheminée est un ouvrage maçonné de 2m de hauteur. Elle ne dispose pas de grille ou de trappe. Il s'agit vraisemblablement du point d'entrée principal pour les chauves-souris.



Figure 1. Puits d'aération de la cavité

Toutes les parcelles acquises par le CEN depuis 2009 au niveau de la RNR sont candidates à une labellisation RNR à l'occasion de ce nouveau plan de gestion. Cela représente 5 nouvelles parcelles cadastrales pour une superficie cumulée de 28 481m<sup>2</sup> (voir tableaux et cartes suivantes pour détails). Cette proposition sera soumise au CSRPN le 02 juin 2022.

**Tableau 1. Parcelles sous maîtrise foncière par le CEN (en vert, les parcelles labellisées RNR ; en blanc, les parcelles candidates à une procédure de labellisation en 2022)**


| Lieu-dit                                  | Parcelles         | Superficie cadastrale | Superficie en m <sup>2</sup> | Date d'acquisition  |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Cavité souterraine</b>                 | -                 | -                     | 3000                         | 06/01/1995          |
|                                           | <b>Sous-total</b> | <b>30a</b>            | <b>3000</b>                  | <b>1995</b>         |
| <b>Pré des Caforts<br/>(zone humide)</b>  | YP 02             | 2ha 47a 07 ca         | 24 707                       | 27/09/2005          |
|                                           | YP 03             | 91a 53ca              | 9 153                        | 2017                |
|                                           | YP 08             | 35a 67ca              | 3 567                        | 2017                |
|                                           | YP 70             | 1ha 13a 46ca          | 11 346                       | 2017                |
|                                           | YP 84             | 35a 70ca              | 3 570                        | 2017                |
|                                           | <b>Sous-total</b> | <b>5ha 23a 49ca</b>   | <b>52 349</b>                | <b>2005 - 2017</b>  |
| <b>Les Caforts<br/>(coteau)</b>           | YB 44             | 12a 15ca              | 1 215                        | 06/01/1995          |
|                                           | YB 45             | 25a 20 ca             | 2 520                        | 06/01/1995          |
|                                           | YB 46             | 13a 60ca              | 1 360                        | 06/01/1995          |
|                                           | YB 47             | 15a 00ca              | 1 500                        | 06/01/1995          |
|                                           | YB 49             | 7a 40ca               | 740                          | 06/01/1995          |
|                                           | YB 48             | 8a45ca                | 845                          | 23/02/2022          |
|                                           | <b>Sous-total</b> | <b>82a 06ca</b>       | <b>8 206</b>                 | <b>1995 - 2022</b>  |
| <b>Total labellisé</b>                    |                   | <b>3ha 50a 67ca</b>   | <b>35 067</b>                | <b>1995 et 2005</b> |
| <b>Total pour labellisation 2022-2023</b> |                   | <b>2ha 84a 81ca</b>   | <b>28 481</b>                | <b>2017 à 2022</b>  |
| <b>TOTAL</b>                              |                   | <b>6ha 35a 48ca</b>   | <b>63 548</b>                | <b>1995 à 2022</b>  |

**Tableau 2. Patrimoine foncier sous label RNR au 1<sup>er</sup> janvier 2022**

| Commune      | Numéro et nom des sites    | Superficie cadastrale | Superficie en m <sup>2</sup> |
|--------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Luché-Pringé | Coteau des Caforts         | 73a 35ca              | 7 335                        |
|              | Prairie humide des Caforts | 2ha 47a 07ca          | 24 707                       |
|              | Cavité souterraine         | 0ha 30 a              | 3000                         |
|              | <b>Total pour la RNR</b>   | <b>3ha 50a 42ca</b>   | <b>35 042</b>                |




## RNR des Caforts - Situation foncière



Date d'acquisition et surface

|                                                                                     |                |                                                                                     |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | 1995 (0,74 ha) |  | Label RNR (2009)              |
|  | 2005 (2,47 ha) |  | Cavité (1995 ; 3000m²)        |
|  | 2017 (2,76 ha) |  | puits d'aération de la cavité |
|  | 2022 (845m²)   |  | Cadastre                      |




Conservatoire  
d'espaces naturels  
Pays de la Loire

Sources : Google maps 2022, CEN  
Production : CEN PDL - 2022.

### Figure 2. Situation foncière du CEN au niveau de la RNR



## Relabellisation de la RNR des Caforts



Parcelles sous maîtrise foncière du Conservatoire

labellisées (3,2 ha sans la cavité)

en demande de labellisation (2,8 ha)



0 150 300 450 m

 Conservatoire  
d'espaces naturels  
Pays de la Loire

Sources : Google maps 2022, CEN  
Production : A. Avrilla - 2022.

Figure 3. Relabellisation de la RNR

## A.1.4. GESTION DE LA RNR

Le classement en RNR du site des « Coteau et prairies des Caforts » a pour objet :

- La protection renforcée et pérenne du site, de manière spécifique à ses enjeux de conservation, son patrimoine naturel, biologique et paysager ;
- Des moyens supplémentaires pour en assurer une gestion sur le long terme ;
- Une meilleure lisibilité de sa protection à l'échelle locale ;
- La reconnaissance du site dans un réseau régional et national.

## A.1.5. VALEURS ET ENJEUX DE LA RNR

### B.1.5.1. Rareté et originalité

La rareté et l'originalité du site résident principalement dans sa diversité d'habitats et d'intérêts patrimoniaux.

Au cœur de la vallée du Loir, le site se compose à la fois d'une zone humide, d'un coteau calcaire et d'une cavité souterraine.

D'un point de vue paysager, la falaise calcaire d'une quinzaine de mètres de hauteur surplombe le site et le vallon de l'organe en contre-bas. Le coteau calcaire et la zone humide abritent des espèces patrimoniales.

La falaise calcaire est naturelle. L'intérieur a été aménagé et exploité par l'Homme depuis le moyen-âge, d'abord en tant que carrière, de maison troglodytique et de champignonnière au XXème siècle. Outre ce patrimoine historique, elle abrite également un patrimoine géologique certain avec des fossiles du Turonien (coques, ammonites...).

### B.1.5.2. Taille et diversité

La surface labellisée en RNR s'étend sur 3,50 ha, cavité comprise (3000m<sup>2</sup>). Avec cela il faut considérer l'ensemble des parcelles voisines sous protection forte et sous maîtrise foncière du CEN, ce qui représente au total 6,35 ha. Malgré la surface restreinte, le site abrite une mosaïque d'habitats intéressante et abritant une flore et une faune variées.

A ce jour et depuis 1983, 1475 taxons ont été observés sur le site. Parmi ces espèces, 845 ont été contactées au cours du dernier plan de gestion, entre 2016 et 2021. Par rapport à la taille du site, il s'agit d'une richesse spécifique remarquable. La connaissance naturaliste peut encore être améliorée sur le site, notamment pour certains groupes encore peu connus.

### B.1.5.3. Menaces et fragilités

D'un point de vue global, les principales menaces et les risques éventuels susceptibles de fragiliser la RNR sont notamment :

- La gestion hydraulique du Loir
- L'intensification des pratiques agricoles à proximité de la RNR
- Le réchauffement climatique

Par ailleurs, la faible surface de la RNR est un facteur limitant, qui l'expose potentiellement aux évolutions paysagères, écologiques et anthropiques locales. Elle limite aussi pour le gestionnaire la possibilité de viser la gestion d'une mosaïque d'habitats et l'incite à cibler des habitats en particulier.

Les menaces et fragilités concernant plus précisément les habitats et les espèces ont été abordées dans la section A.2.

#### **B.1.5.4. Place de la RNR dans un ensemble d'espaces protégés**

La RNR des Caforts se situe au cœur de la vallée du Loir, zone écologiquement très riche et dotée de plusieurs types de zonages environnementaux. La vallée du Loir abrite des zones humides (dont des secteurs paratourbeux), des coteaux calcaires et de nombreuses cavités à Chiroptères. En ce sens, la RNR des Caforts concentre à elle seule l'ensemble de ces grands types d'enjeux en étant, à son échelle, plus ou moins représentative de l'ensemble de la vallée. Les enjeux floristiques sur la RNR restent cependant beaucoup plus modestes qu'à l'échelle de la vallée. C'est le cas également pour l'avifaune ou encore l'entomofaune des zones humides.

Plusieurs sites naturels protégés existent à proximité de la RNR :

- Quatre Espaces naturels sensibles :
  - Les Piliers (site voisin, situé à 200m à l'est et disposant d'un APPB pour les chiroptères)
  - La Prée d'Amont à Vaas
  - Prairie de Cherré à Aubigné-Racan
  - Vallées des Cartes et de la Vésotière à Savigné sous le Lude.
- Deux Réserves naturelles régionales
  - Prairie et roselière des Dureaux
  - Marais de Cré-sur-Loir

Dans l'inventaire du patrimoine naturel, le site de la RNR est compris dans deux Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique :

- ZNIEFF de type I n° 40050029, intitulée « Coteau du Loir et carrière souterraine de la Violonnerie ». Sa superficie atteint 37 hectares
- ZNIEFF de type II n° 40050000 « Vallée du Loir de Pont-de-Braye à Bazouges-sur-le-Loir ».

La RNR est également incluse dans le site Natura 2000 « Vallée du Loir de Bazouges à Vaas », n° FR 5200649.






Figure 3 La RNR au sein du réseau ZNIEFF






Figure 4. La RNR au sein du réseau d'espaces naturels de la vallée du Loir

## A.1.6. EVOLUTION HISTORIQUE DE L'OCCUPATION DES SOLS DE LA RNR

Afin d'évaluer l'évolution historique et paysagère du site, il est possible de comparer d'anciennes photographies aériennes de l'IGN en noir et blanc de 1949, 1974, 1980, 1995, 2011 et 2021.

En **1949**, la quasi-totalité des parcelles de la plaine alluviale est bordée de haies. Le plateau est planté de vergers. La prairie humide est séparée en trois subdivisions par des haies. La subdivision située à l'ouest est cultivée pour partie. Le coteau de la Violonnerie est complètement entretenu. Il semble être alors fauché ou pâturé. Le coteau des Caforts est alors très ouvert (non boisé).

En **1974**, le paysage a fortement changé. Dans la plaine alluviale, les haies ont disparu. Les parcelles sont plus grandes et leurs limites plus rectilignes ; de nouveaux chemins d'exploitation sont créés. Sur le plateau, les cultures semblent plus intensives. Les arbres isolés et les haies ont quasiment disparu. Une parcelle de vigne semble avoir laissé place à un champ cultivé. La parcelle YP2 n'est plus séparée qu'en deux subdivisions, gérées de manière homogène. Les coteaux de la Violonnerie et des Caforts demeurent très ouverts.

En **1980**, la matrice paysagère reste comparable à celle de 1974. Toutefois, si le coteau de la Violonnerie est toujours bien ouvert, celui des Caforts présente des faciès d'embroussaillage. Il n'y a pas de changements visibles sur la prairie.

En **1995**, des arbres isolés ont disparu du plateau. Dans la plaine alluviale, des haies ont été restaurées le long des chemins d'exploitations. Une peupleraie est plantée. Le coteau de la Violonnerie est toujours ouvert alors que le coteau des Caforts est embroussaillé. Une haie est plantée à l'est de la parcelle YP2.

En **2011**, le paysage est marqué nettement par un fort contraste entre le plateau, cultivé de manière intensive au nord de la falaise, et à l'ouest du Loir. La plaine alluviale au sud a gardé un aspect bocager et affiche même plus de haies qu'en 1995. Non loin du site, la zone boisée appelée « le bois de Mervé », proche de la rive gauche du Loir, a disparu au profit d'une culture de céréales. Le coteau de la Violonnerie est de plus en plus fermé par la végétation.

En **2021**, la matrice paysagère reste comparable à celle de 2011. Le coteau de la Violonnerie à l'ouest de la RNR est très embroussaillé, en revanche la partie ouest du coteau de la RNR a été rouverte.





Photo aérienne de 1949 (IGN) avec en rouge la limite du site



Photographie aérienne de 1974



Photographie aérienne de 1980



Photographie aérienne de 1995





Photographie aérienne de 2011






Figure 6; Photos aériennes 1949-2021

## A.2. LE CADRE SOCIOECONOMIQUE DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT PROCHE

### A.2.1. LES REPRESENTATIONS CULTURELLES DE LA RNR

L'ensemble du Port des Roches est bien identifié au sein de la population locale, notamment du fait de son caractère historique, culturel et paysager : exploitation et exportation du tuffeau, culture du champignon de Paris... Ces aspects pourraient permettre une approche du site complémentaire à l'approche naturaliste traditionnelle, et faciliter ainsi la sensibilisation d'un public plus large.

Toutefois, cet ensemble écologique demeure difficile d'accès (nombreuses cavités privées et fermées au public ainsi que leurs abords), ce qui limite l'appréhension des enjeux patrimoniaux par le grand public.

La RNR *sensu stricto* et ce qu'implique ce statut de protection demeurent par ailleurs vraisemblablement sous-identifiés parmi la population locale ou de passage. La RNR est en effet de petite taille ; il n'y a pas d'aménagement permettant de la découvrir librement. Seule une signalisation dédiée en matérialise la présence.

### A.2.2. LE PATRIMOINE CULTUREL, PAYSAGER ET HISTORIQUE DE LA RNR

Le paysage de la RNR, resitué dans le contexte du coteau du Port des Roches et de l'ensemble paysager de la vallée du Loir, est assez remarquable.

Il peut être appréhendé en effet selon un gradient de relief : fonds de vallée humide et inondable, pied de coteau partiellement ouvert, falaise naturelle surmontée du plateau. Cette succession d'ambiances paysagères et d'habitats se prête bien à une lecture paysagère.

L'aspect monumental de la falaise, au sein du coteau du Port des roches, contribue aussi à la singularité du site, de même que la proximité d'autres cavités et habitations troglodytiques discernables dans le paysage.

### A.2.3. LES ACTIVITES SOCIOECONOMIQUES DANS LA RNR

#### A.2.3.1. L'agriculture et la sylviculture

De manière générale la Sarthe présente un fort taux d'activité dans le domaine agricole, avec une surface agricole utile qui atteint 62 %. La vallée du Loir est dominée par la polyculture élevage. Cette dominante donne une impression d'unité avec ses coteaux en tuffeau et ses larges fonds de vallée alluviale. La commune du Luché-Pringé possède une surface agricole utile (SAU) de 3103 ha. De plus elle dispose de 32 exploitations agricoles. Les études récentes de la DDT (Direction Départementale des Territoires) montrent une augmentation des surfaces en terre labourable par rapport à la surface en herbe passant ainsi de 75 % à 90 %. De manière générale, la réserve naturelle ne s'intègre pas dans le système agricole communal. D'une qualité fourragère médiocre, les parcelles de la réserve naturelle n'attirent pas les agriculteurs de Luché-Pringé qui préfèrent de loin les prairies à herbe grasse voire les cultures de céréales. Même constat pour l'élevage, constitué en majorité de bovins, et, qui a besoin de valeur nutritive bien plus importante que les apports des parcelles de la RNR. On notera en 2017 et en 2020 des essais sur le coteau avec le troupeau de brebis de réforme de M. Fleurance, de race béarnaise. Toujours pour ces raisons de manque d'appétence, il ne souhaite pas renouveler le partenariat. Un nouveau partenariat a été trouvé en 2021, avec un particulier ayant 3 chevaux et qui sont mis tantôt sur le coteau, tantôt en zone humide. Pour pallier les difficultés de mise en œuvre du pâturage dans sa politique de gestion, le Conservatoire fait appel aux services de l'agriculteur M. Dorian Delasalle depuis 2019 pour faucher la zone humide, ainsi qu'à des personnes extérieures à la commune pour réaliser la gestion par fauche (pelouses calcicoles).

### **A.2.3.2. La chasse et la pêche au niveau local**

Environ 200 pêcheurs adhèrent à La Gaule Luchoise, l'AAPPMA (Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique) de Luché-Pringé. Cela étant, il est délicat de déterminer combien de pêcheurs pratiquent effectivement sur la commune de Luché-Pringé. Avec le fonctionnement du système des cartes de pêche (timbre halieutique national) tout pêcheur adhérent à une AAPPMA autre du département, voire même d'un autre département, a la possibilité de venir pêcher à Luché-Pringé sans supplément. Seule une enquête de terrain permettrait d'estimer précisément la fréquentation sur Luché-Pringé.

L'AAPPMA gère les parcours les plus proches de la RNR :

- Le Loir sur 7,4 km du barrage de la Courbe au barrage de Mervé (lots n°11 à 14 – domaine public)
- L'aune (domaine privé) de la confluence avec le Casseau à la confluence avec le Loir. La confluence avec le Loir se situe au nord-ouest du Port des roches, rive droite.

Une cale de mise à l'eau a été installée en 2018 par le syndicat intercommunal du Loir, à la confluence entre l'Organne et le Loir.

Une pêche de sondage a été réalisée sur l'Organne dans le cadre du diagnostic Natura 2000 dans les années 2010, en amont du site de la prairie des Caforts (au niveau de la route du Gué Bordelais). Cette pêche, qui n'est pas un inventaire, avait mis en évidence la présence de Perches, Brochets (juvéniles de l'année), Ablettes, Chevesnes, Epinochettes et poissons chat.

Du fait de la très faible pente du cours d'eau au niveau des Caforts, au moins en partie située dans le lit majeur du Loir et sous son influence, ce milieu correspond à une typologie de type zone à brème. Les espèces qui y évoluent sont représentées par des cyprinidés d'eaux calmes majoritairement et les carnassiers associés. Quelques espèces en provenance de l'amont peuvent diversifier cette tendance. Une anguille y a été détectée en 2017.

En outre, il s'agit sans aucun doute (validation par le sondage cité ci-dessus) d'une zone favorable à la reproduction du brochet qui exploite les bordures végétalisées ennoyées, voire même les parties immergées de la prairie lorsque les conditions hydrologiques s'y prêtent.

Concernant la chasse, celle-ci n'est pas autorisée sur la RNR et aucune infraction n'a été constatée.

### **A.2.3.3. La fréquentation et les activités touristiques**

La RNR des Caforts n'est pas accessible librement, et aucun incident ou intrusion n'a été constaté en six ans. La fréquentation est donc uniquement conditionnée par les animations encadrées par le CEN ou le CPIE.



Différents sentiers de randonnée passent à proximité de la RNR. A ce jour cette dernière n'est pas mentionnée et il serait intéressant de la valoriser en proposant un parcours alternatif passant par les futurs panneaux de sensibilisation aux entrées du site. L'ENS des Piliers pourrait également être valorisé.




Figure 7. Sentiers de randonnée à proximité de la RNR

## A.3. LA VOCATION A ACCUEILLIR LE PUBLIC ET L'INTERET PEDAGOGIQUE DE LA RNR

### A.3.1. LES ACTIVITES PEDAGOGIQUES ET LES EQUIPEMENTS EN VIGUEUR

#### **Panneaux et signalisation**

---

L'entrée de la RNR est signalée par un « totem », qui présente de manière succincte le site et son patrimoine. Il rappelle également au moyen de quelques pictogrammes la réglementation en vigueur dans la RNR : interdiction de faire du feu, de pénétrer avec un véhicule ou de récolter des végétaux.

A proximité du totem se trouve un panneau pédagogique présentant la réserve de manière plus détaillée. Il mentionne les gestionnaires historiques du site, l'historique de la création de la RNR, et présente brièvement quelques espèces patrimoniales. Ce panneau serait toutefois à actualiser.

Enfin, les limites externes de la RNR sont matérialisées par des bornes de délimitation. Le périmètre de la RNR est également délimité par un linéaire de clôtures, installé afin de mettre en œuvre la gestion agricole du site, notamment le pâturage.

#### **Activités pédagogiques**

---

La RNR n'est pas accessible librement.

Différents groupes sont toutefois régulièrement accueillis à des fins de formation scolaire et professionnelle ou d'éducation à l'environnement.

Le site est un lieu de formation à la gestion des espaces naturels pour des groupes d'étudiants dans le domaine de l'environnement (BTS, Bac Pro).

Les élèves des groupes scolaires situés à proximité de la Commune de Luché-Pringé viennent également de manière régulière visiter le site.

Enfin, des animations ponctuelles sont organisées, notamment le week-end et dans le cadre d'événements nationaux (semaine de la nature, Fête de la nature, Fréquence Grenouille ou chantiers d'automne). Celles-ci sont principalement destinées au grand public, dans un but de sensibilisation à la protection de la nature et au patrimoine naturel de la RNR.

### A.3.2. CAPACITE A ACCUEILLIR DU PUBLIC

La vocation prioritaire d'une Réserve naturelle est de protéger son patrimoine naturel. Sa fréquentation doit donc être compatible avec le respect des habitats et des espèces, et ne pas entraîner de dégradation des milieux.

A cet égard, la capacité d'accueil du public de la RNR apparaît relativement faible : il s'agit d'un site de petite taille, dont les habitats se prêtent peu à l'accueil d'un grand nombre de groupes ou de visiteurs libres et qui ne dispose pas de réels équipements (sentier bien délimité, platelage...) permettant d'accueillir le public librement et dans de bonnes conditions.

### A.3.3. INTERET PEDAGOGIQUE

La RNR représente un support pédagogique très intéressant grâce à sa variété d'habitats : coteau calcaire, cavité et zone humide. Au-delà du patrimoine naturel qui a justifié le classement en RNR, le site dispose d'une histoire relativement riche, qui a débuté dès le Moyen-âge. Enfin, la cavité et la falaise des Caforts recèlent des fossiles datés du Crétacé supérieur (Turonien). L'intérêt pédagogique est donc pluridisciplinaire ; à la fois naturaliste, écologique, historique, géologique et paléontologique.

Les faiblesses du site sont cependant sa petite taille du site ainsi que le manque d'aménagements en faveur du public. Comme rappelé dans la section précédente, même si l'intérêt pédagogique est certain, la fréquentation ne doit pas être trop élevée pour ne pas impacter le milieu.

#### A.3.4. PLACE DE LA RNR DANS LE RESEAU LOCAL D'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT

L'association de référence en matière d'éducation à l'environnement et au développement durable (EEDD) en vallée du Loir est le Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) « Vallées de la Sarthe et du Loir ». Celui-ci est régulièrement sollicité pour mettre en œuvre des animations à destination du grand public ou des scolaires dans toute la vallée du Loir.

Un partenariat est mis en œuvre depuis 2014 entre le CEN des Pays de la Loire et le CPIE pour la sensibilisation des scolaires dans la RNR. Ainsi des classes de cycle 2 et cycle 3 de plusieurs communes du secteur sont accueillies sur le site.

Plusieurs sites naturels protégés pour lesquels des activités pédagogiques sont proposées existent à proximité de la RNR.

- Des Espaces naturels sensibles :
  - Prée d'Amont à Vaas
  - Camp Gallo-Romain à Aubigné-Racan
  - Vallées des Cartes et de la Vésotière à Savigné sous le Lude.
- Des Réserves naturelles régionales
  - Prairie et roselière des Dureaux
  - Marais de Cré-sur-Loir

La stratégie d'accueil du public gagnerait donc à être envisagée à l'échelle de l'ensemble des sites protégés de la vallée du Loir, afin de coordonner les initiatives, la communication et de proposer une offre cohérente.



## B – PRESENTATION DU PLAN DE GESTION 2016-2021

### B.1 - LE PLAN DE GESTION 2016 – 2021

Ce chapitre propose un rappel succinct des principaux points et objectifs du plan de gestion 2016-2021. Chacune de ces fiches-actions décrit le contenu de l'action prévue et l'objectif du plan de gestion auquel elle se rapporte. Ces fiches donnent des informations sur les résultats attendus, le protocole, les précautions à mettre en œuvre, les coûts estimatifs, la localisation de l'action, les indicateurs de suivis et de résultats, etc.

#### B.1.1- STRUCTURATION DU PLAN DE GESTION 2016-2021

Le plan de gestion 2016 - 2021 s'articule autour de trois grandes parties : le diagnostic du site, la gestion de la RNR et les objectifs desquels découle le programme d'actions.

#### B.1.2- OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2016-2021

Les objectifs à long terme permettent d'atteindre un bon état de conservation ou de maintenir un état de conservation, considéré comme optimal pour la RNR, des habitats et des espèces. Les objectifs à long terme sont définis selon le diagnostic et les enjeux du site. Ils doivent être précis et permanents dans les plans de gestion successifs (sauf erreur de définition ou de formulation dans le plan de gestion précédent) et même si les évaluations démontrent qu'ils sont atteints (Chiffaut, 2006).

Dans le plan de gestion 2016 - 2021, les objectifs à long terme ont été identifiés de A à F, par ordre de priorité, avec :

- A à C : Objectifs liés à la conservation,
- D : Objectifs liés à la connaissance,
- E : Objectifs liés à la pédagogie
- F : Objectifs liés à l'évaluation du plan de gestion et à la gestion administrative, comptable et financière.

Les objectifs opérationnels correspondent à des étapes permettant d'atteindre les objectifs à long terme. Ils ont été codés avec la lettre correspondant à un objectif à long terme (A, B, ...) auquel un chiffre correspondant au rang de priorité de l'objectif a été ajouté. Le tableau I liste les objectifs à long terme et les objectifs opérationnels correspondants.

Tableau 3: Objectifs à long terme et objectifs du plan de gestion 2016-2021

| Objectifs à long terme |                                                                | Objectifs opérationnels |                                                                                                                                                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                      | <b>Maintenir, restaurer et conserver les habitats naturels</b> | A.1                     | Maintenir, restaurer et favoriser l'extension des habitats de pelouse, d'ourlet tout en assurant la conservation d'une mosaïque d'habitats calcicoles variés. |
|                        |                                                                | A.2                     | Conserver et entretenir la diversité de milieux humides                                                                                                       |
|                        |                                                                | A.3                     | Augmenter la superficie bénéficiant d'une gestion conservatoire                                                                                               |
| B                      | <b>Maintenir et conserver les populations de Chiroptères</b>   | B.1                     | Assurer la conservation des populations de Chiroptères dans et hors de la RNR                                                                                 |

|          |                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C</b> | <b>Maintenir une mosaïque paysagère riche et diversifiée</b>                                                                                                | <b>C.1</b> | Conserver le patrimoine bocager et les éléments qui lui sont liés (arbres isolés, arbres têtards,...                                                            |
| <b>D</b> | <b>Assurer le suivi et l'évaluation des opérations de gestion et approfondir les connaissances sur le fonctionnement et le patrimoine naturel de la RNR</b> | <b>D.1</b> | Accroître le niveau de connaissance sur la diversité biologique du site tout en assurant un contrôle des groupes pour un meilleur suivi des actions de gestions |
|          |                                                                                                                                                             | <b>D.2</b> | Compléter et approfondir les connaissances sur le fonctionnement abiotique de la RNR                                                                            |
| <b>E</b> | <b>Développer l'usage pédagogique de la RNR de façon structurée, en cohérence avec les objectifs patrimoniaux et la gestion par pâturage</b>                | <b>E.1</b> | Faire connaître l'intérêt et le rôle de la RNR aux différents publics                                                                                           |
| <b>F</b> | <b>Assurer les missions d'évaluation du plan de gestion, ainsi que la gestion administrative, comptable et financière de la RNR</b>                         | <b>F.1</b> | Assurer les missions d'évaluation du plan de gestion                                                                                                            |
|          |                                                                                                                                                             | <b>F.2</b> | Assurer les missions de gestion et d'évaluation administrative, financière et comptable                                                                         |

### B.1.3 - OPERATIONS DU PLAN DE GESTION 2016-2021

#### Codification utilisée pour les opérations du plan de gestion 2016-2021

Le plan de gestion 2016-2021 de la RNR utilise les codifications suivantes :

- **AD** : Gestion administrative
- **TU** : Travaux Uniques
- **TE** : Travaux d'entretien
- **SE** : Suivis scientifiques
- **RE** : Recherche
- **PI** : Pédagogie, information, animation, édition

#### Liste des opérations du plan de gestion 2016 – 2021

#### Arborescence du plan de gestion 2016-2021

Le tableau 4 présente l'arborescence reliant les objectifs à long terme, les objectifs du plan de gestion 2016-2021 et les actions programmées pour répondre à ces objectifs.

Les opérations programmées dans la RNR correspondent à des opérations de Gestion administrative, de Travaux Uniques et d'entretiens, de Suivis scientifiques, de Recherche et de Pédagogie. Elles sont le fer de lance des objectifs opérationnels. Elles sont concrètes et constituées d'un ou plusieurs moyens qui contribuent à la réalisation des objectifs du plan (Chiffaut, 2006).

Le tableau 4 présente les 39 opérations programmées pour les 6 ans de mise en œuvre de ce plan de gestion.

**Tableau 4. Liste des opérations du plan de gestion 2016-2021**

Liste des opérations du plan de gestion

| CODE DE L'OPERATION | INTITULE DE L'OPERATION                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TU 1                | Restaurer le coteau calcaire par coupe et débroussaillage                                                        |
| TU 2                | Abattre et exporter les noyers                                                                                   |
| TU 3                | Restaurer des bandes de sol nu par décapage                                                                      |
| TU 4                | Elaborer et poser de nouveaux panneaux pédagogiques                                                              |
| TE 1                | Entretenir les zones restaurées                                                                                  |
| TE 2                | Faucher tardivement avec exportation le coteau calcaire                                                          |
| TE 3                | Faucher tardivement avec exportation la prairie humide                                                           |
| TE 4                | Poser une clôture temporaire séparant les zones fauchées des zones non fauchées                                  |
| TE 5                | Faire pâturer tardivement et de manière extensive le coteau calcaire                                             |
| TE 6                | Faire pâturer tardivement et de manière extensive la prairie humide                                              |
| TE 7                | Entretenir par débroussaillage manuel les zones non gérées mécaniquement.                                        |
| TE 8                | Entretenir les zones rudérales                                                                                   |
| TE 9                | Entretenir le linéaire de haies                                                                                  |
| TE 10               | Entretenir les arbres isolés et les arbres têtards                                                               |
| TE 11               | Contrôler et entretenir le linéaire de clôtures                                                                  |
| SE 1                | Mettre en œuvre un suivi phytosociologique des habitats naturels                                                 |
| SE 2                | Suivre annuellement les espèces de flore patrimoniale                                                            |
| SE 3                | Compléter voire accroître les connaissances sur les populations d'Azuré du Serpolet ( <i>Maculinea arion</i> )   |
| SE 4                | Suivre annuellement les populations de Cuivré des marais ( <i>Lycaena dispar</i> )                               |
| SE 5                | Suivre annuellement les populations de Chiroptères sur la RNR                                                    |
| SE 6                | Suivre annuellement les populations de Chiroptère en périphérie de la RNR                                        |
| SE 7                | Suivre annuellement les populations de Lépidoptères                                                              |
| SE 8                | Suivre annuellement les populations de Reptiles                                                                  |
| SE 9                | Suivre annuellement les populations d'Orthoptère en lien avec les communautés végétales                          |
| SE 10               | Rechercher les colonies de Chiroptères en parturition aux alentours de la RNR                                    |
| SE 11               | Effectuer un suivi acoustique des populations de Chiroptères sur le périmètre de la RNR                          |
| RE 1                | Effectuer un inventaire des Syrphes et déduire un diagnostic de l'état de conservation des habitats              |
| RE 2                | Etudier le fonctionnement hydrologique et la composition pédologique de la RNR                                   |
| RE 3                | Effectuer un inventaire des Coléoptères saproxyliques de la RNR                                                  |
| PI 1                | Organiser des animations et des visites de la RNR pour les différents publics                                    |
| PI 2                | Contribuer à l'enrichissement des connaissances naturalistes et scientifiques à l'échelle régionale ou nationale |
| AD 1                | Effectuer une veille foncière en périphérie de la RNR                                                            |
| AD 2                | Rechercher des partenariats financiers et réaliser les suivis comptables et administratifs de la RNR             |
| AD 3                | Réactualiser les conventions de gestion entre les agriculteurs gestionnaires et le gestionnaire                  |
| AD 4                | Préparer et participer à l'animation des réunions du comité consultatif                                          |
| AD 5                | Elaborer annuellement le rapport d'activités                                                                     |
| AD 6                | Evaluer à mi-parcours le plan de gestion                                                                         |
| AD 7                | Evaluer à échéance de 6 ans le plan de gestion                                                                   |
| AD 8                | Elaborer et rédiger le 3 <sup>ème</sup> plan de gestion                                                          |

### Organisation de l'arborescence du plan de gestion 2016 - 2021

Ce tableau présente l'organisation de l'arborescence du plan de gestion 2016 - 2021 avec les objectifs à long terme, les objectifs opérationnels et les opérations selon leurs priorités.

Tableau 5: Arborescence du plan de gestion 2016-2021

OBJECTIFS OPERATIONNELS DU PLAN DE GESTION 2016 – 2021 ET ACTIONS AFFERENTES



|                        | OBJECTIF A LONG TERME                                        | OBJECTIF OPERATIONNEL                                                                                                                                                | CODE DE L'OPERATION | INTITULE DE L'OPERATION                                                                                        | PRIORITES |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENJEUX DE CONSERVATION | A<br>Maintenir, restaurer et conserver les habitats naturels | A.1<br>Maintenir, restaurer et favoriser l'extension des habitats de pelouse, d'ourlet tout en assurant la conservation d'une mosaïque d'habitats calcicoles variés. | TU 1                | Restaurer le coteau calcaire par coupe et débroussaillage                                                      | 1         |
|                        |                                                              |                                                                                                                                                                      | TU 2                | Abattre et exporter les noyers                                                                                 | 1         |
|                        |                                                              |                                                                                                                                                                      | TU 3                | Restaurer des bandes de sols nus par décapage                                                                  | 1         |
|                        |                                                              |                                                                                                                                                                      | TE 1                | Entretenir les zones restaurées                                                                                | 1         |
|                        |                                                              |                                                                                                                                                                      | TE 2                | Faucher tardivement avec exportation le coteau calcaire                                                        | 1         |
|                        |                                                              |                                                                                                                                                                      | TE 5                | Pâturer tardivement et de manière extensive le coteau calcaire                                                 | 1         |
|                        |                                                              |                                                                                                                                                                      | TE 7                | Entretenir par débroussaillage manuel les zones non gérées mécaniquement.                                      | 1         |
|                        |                                                              |                                                                                                                                                                      | TE 8                | Entretenir les zones rudérales                                                                                 | 2         |
|                        |                                                              |                                                                                                                                                                      | TE 11               | Contrôler et entretenir le linéaire de clôtures                                                                | 2         |
|                        |                                                              |                                                                                                                                                                      | SE 1                | Mettre en place un suivi phytosociologique des habitats naturels                                               | 1         |
|                        |                                                              |                                                                                                                                                                      | SE 2                | Suivre annuellement les plantes patrimoniales                                                                  | 2         |
|                        |                                                              |                                                                                                                                                                      | SE 3                | Compléter voire accroître les connaissances sur les populations d'Azuré du Serpolet ( <i>Maculinea arion</i> ) | 1         |
|                        |                                                              |                                                                                                                                                                      | SE 7                | Suivre annuellement les populations de Lépidoptères                                                            | 1         |
|                        |                                                              |                                                                                                                                                                      | SE 9                | Suivre annuellement les populations d'Orthoptères en lien avec les communautés végétales                       | 1         |
|                        |                                                              |                                                                                                                                                                      | RE 1                | Effectuer une étude des cortèges de Syrphes et déduire un diagnostic de l'état de conservation des habitats    | 2         |
|                        |                                                              | A.2<br>Conserver et entretenir la diversité de milieux humides                                                                                                       | TE 3                | Faucher tardivement avec exportation la prairie humide                                                         | 1         |
|                        |                                                              |                                                                                                                                                                      | TE 4                | Poser une clôture temporaire séparant les zones fauchées des zones non fauchées.                               | 1         |
|                        |                                                              |                                                                                                                                                                      | TE 6                | Pâturer tardivement et de manière extensive la prairie humide                                                  | 1         |
|                        |                                                              |                                                                                                                                                                      | TE 11               | Contrôler et entretenir le linéaire de clôtures                                                                | 2         |
|                        |                                                              |                                                                                                                                                                      | SE 1                | Mettre en place un suivi phytosociologique des habitats naturels                                               | 1         |
|                        |                                                              |                                                                                                                                                                      | SE 2                | Suivre annuellement les plantes patrimoniales                                                                  | 2         |
|                        |                                                              |                                                                                                                                                                      | SE 4                | Suivre annuellement les populations de cuivré des marais ( <i>Lycaena dispar</i> )                             | 1         |
|                        |                                                              |                                                                                                                                                                      | SE 7                | Suivre annuellement les populations de Lépidoptères                                                            |           |
|                        |                                                              |                                                                                                                                                                      | SE 9                | Suivre annuellement les populations d'Orthoptères en lien avec les communautés végétales                       | 1         |
|                        |                                                              |                                                                                                                                                                      | RE 1                | Effectuer une étude des cortèges de syrphes et déduire un diagnostic de l'état de conservation des habitats    | 1         |
|                        |                                                              | A.3<br>Augmenter la superficie bénéficiant d'une gestion conservatoire                                                                                               | AD 1                | Effectuer une veille foncière en périphérie de la RNR                                                          | 1         |
|                        | B                                                            | B.1                                                                                                                                                                  | SE 5                | Suivre annuellement les populations de Chiroptères sur la RNR                                                  | 1         |

|                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                  |   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                             | Maintenir et conserver les populations de Chiroptères.                                                                                      | Assurer la conservation des populations de Chiroptères dans et hors de la RNR                                                                                                              | SE 6  | Suivre annuellement les populations de Chiroptères hors RNR                                                      | 1 |
|                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | SE 10 | Rechercher les colonies de Chiroptères en parturition aux alentours de la RNR                                    | 1 |
|                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | SE 11 | Effectuer un suivi acoustique des populations de Chiroptères sur le périmètre de la RNR                          | 1 |
|                                             | C<br><br>Maintenir une mosaïque paysagère riche et diversifiée                                                                              | C.1<br><br>Conserver le patrimoine bocager et les éléments qui lui sont liés (arbres isolés, arbres têtards,...)                                                                           | TE 9  | Entretenir le linéaire de haies                                                                                  | 2 |
|                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | TE 10 | Entretenir les arbres isolés et les arbres têtards                                                               | 2 |
|                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | SE 1  | Mettre en place un suivi phytosociologique des habitats naturels                                                 | 1 |
|                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | RE 3  | Effectuer un inventaire des Coléoptères saproxyliques de la RNR                                                  | 1 |
| ENJEUX DE CONNAISSANCE                      | D<br><br>Assurer le suivi et l'évaluation des opérations de gestion et approfondir les connaissances sur le fonctionnement et le patrimoine | D.1<br><br>Accroître le niveau de connaissance sur la diversité biologique du site tout en assurant un contrôle des groupes bio-indicateurs pour un meilleur suivi des actions de gestions | SE 1  | Mettre en place un suivi phytosociologique des habitats naturels                                                 | 1 |
|                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | SE 2  | Suivre annuellement les plantes patrimoniales                                                                    | 1 |
|                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | SE 3  | Compléter voire accroître les connaissances sur les populations d'Azuré du Serpolet ( <i>Maculinea arion</i> )   | 1 |
|                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | SE 4  | Suivre annuellement les populations de Cuivré des marais ( <i>Lycaena dispar</i> )                               | 1 |
|                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | SE 7  | Suivre annuellement les populations de Lépidoptères                                                              | 1 |
|                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | SE 8  | Suivre annuellement les populations de Reptiles                                                                  | 1 |
|                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | SE 9  | Suivre annuellement les populations d'Orthoptères en lien avec les communautés végétales                         | 1 |
|                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | RE 1  | Effectuer une étude des cortèges de Syrphes et déduire un diagnostic de l'état de conservation des habitats      | 1 |
|                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | RE 3  | Effectuer un inventaire des Coléoptères saproxyliques de la RNR                                                  | 1 |
|                                             |                                                                                                                                             | D.2<br>Compléter et approfondir les connaissances sur le fonctionnement abiotique de la RNR                                                                                                | RE 2  | Etudier le fonctionnement hydrologique et la composition pédologique de la RNR                                   | 2 |
| ENJEUX DE PEDAGOGIE ET INFORMATION          | E<br>Développer l'usage pédagogique de la RNR de façon structurée, en cohérence avec les objectifs patrimoniaux et la gestion par pâturage  | E.1<br>Faire connaître l'intérêt et le rôle de la RNR aux différents publics                                                                                                               | TU 4  | Elaborer et poser de nouveaux panneaux pédagogiques                                                              | 1 |
|                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | PI 1  | Sensibiliser et former les publics à la biodiversité grâce à la RNR                                              | 1 |
|                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | PI 2  | Contribuer à l'enrichissement des connaissances naturalistes et scientifiques à l'échelle régionale ou nationale | 2 |
| ENJEUX DE GESTION ADMINISTRATIVE FINANCIERE | F<br>Assurer les missions d'évaluation du plan de gestion, ainsi que la gestion administrative, comptable et financière                     | F.1<br>Assurer les missions d'évaluation du plan de gestion                                                                                                                                | AD 5  | Elaborer annuellement le rapport d'activités                                                                     | 1 |
|                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | AD 6  | Evaluer à mi-parcours le plan de gestion                                                                         | 1 |
|                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | AD 7  | Evaluer à échéance de 6 ans le plan de gestion                                                                   | 1 |
|                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | AD 8  | Elaborer et rédiger le 3 <sup>ème</sup> plan de gestion                                                          | 1 |
|                                             |                                                                                                                                             | F.2<br>Assurer les missions de gestion et                                                                                                                                                  | AD 2  | Rechercher des partenariats financiers et réaliser les suivis comptables administratifs de la RNR                | 1 |

|  |  |                                                      |      |                                                                                                         |   |
|--|--|------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |  | d'évaluation administrative, financière et comptable | AD 3 | Réactualiser les conventions de gestion entre les agriculteurs gestionnaires et le CEN Pays de la Loire | 2 |
|  |  |                                                      | AD 4 | Préparer et participer à l'animation du comité consultatif                                              | 1 |

## B.1.4- FICHES ACTIONS ET CRITERES D'EVALUATION DES RESULTATS

### Structure des fiches action du plan de gestion 2016-2021

Le plan de gestion 2016 - 2021 détaille sous forme de fiches actions les opérations programmées dans la RNR. Celles-ci décrivent le contenu de l'action prévue et la contribution de celle-ci à la satisfaction de l'objectif du plan de gestion auquel elle est censée répondre. Ces fiches donnent des informations sur les résultats attendus, le protocole et les précautions à mettre en œuvre, les coûts estimatifs, etc.

### Critères d'évaluation des actions

A chacune des actions sont attachés des indicateurs de résultats ayant pour but d'évaluer de manière objective l'atteinte ou non de ladite action à l'issue des 6 ans. Cette atteinte n'est pas binaire et peut parfois se révéler partielle selon les indicateurs pris en compte.

Pour les opérations de gestion, des indicateurs de suivis (SE) sont également présents. Ils prennent la forme de suivis naturalistes permettant d'étudier les variations d'effectifs, la diversité des cortèges ou encore l'évolution de la répartition d'espèces au sein de la RNR au cours des années. L'analyse de ces suivis permet ensuite d'optimiser et d'orienter les différentes actions de gestion au regard des enjeux considérés comme prioritaires.

Tableau 6: Correspondance entre opérations de gestion et indicateurs de suivis

| Correspondance entre opération de gestion et indicateurs de résultats |                              |                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                 |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Opérations de gestion                                                 | Indicateurs de résultats     |                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                 |                                             |
|                                                                       | Indicateurs de pression (IP) |                                                                         | Indicateurs d'état (IE) |                                                                                                                                                                                 |                                             |
| TU 1                                                                  | IP1                          | Coupe de 80 % des surfaces boisées de la RNR                            | IE1                     | Passage à une communauté d'ourlet du <i>Trifolium medii</i> - <i>Agrimonia eupatoria</i> ou une communauté de pelouse du <i>Mesobromion erecti</i> .                            |                                             |
|                                                                       |                              |                                                                         | IE2                     | Apparition d'espèces patrimoniales comme le Grémil bleu-pourpre dans les zones traitées                                                                                         |                                             |
| TU 2                                                                  | IP2                          | 5 Noyers coupés, débités, exportés                                      | IE3                     | Evolution de la surface traitée avec un passage de l'ourlet nitrophile à un ourlet basophile du <i>Knautia arvensis</i> - <i>Agrimonia eupatoria</i> )                          |                                             |
|                                                                       | IP3                          | Fauche mécanique avec exportation rendue possible                       |                         |                                                                                                                                                                                 |                                             |
| TU 3                                                                  | IP4                          | Diminution des interventions dans l'intervention TE 8                   | IE4                     | Limitation, voire diminution du cortège d'ourlets eutrophes (et donc de la végétation à Ortie dioïque), au profit des communautés d'ourlets basophiles ou de pelouses calcaires |                                             |
|                                                                       |                              |                                                                         | IE5                     | Apparition d'espèces annuelles pionnières inféodées aux dalles calcaires nues (comme <i>Thymus sp.</i> )                                                                        |                                             |
| TE 1                                                                  | IP5                          | Limitation durable des rejets sur au moins 70 % de la surface restaurée | IE6                     | Au moins 50 % de la surface traitée en <i>Mesobromion erecti</i> ou végétation approchante en 2021                                                                              |                                             |
|                                                                       |                              |                                                                         | IE7                     | Apparition de nouvelles stations d'Orchidées, Origan ou encore de plantes patrimoniales comme le Grémil bleu-pourpre                                                            |                                             |
| TE 2                                                                  | IP6                          | Passage annuel de la fauche mécanique                                   | IE8                     | a                                                                                                                                                                               | Maintien des habitats de pelouses calcaires |



|       |             |                                                                                                    |             |                                                                                                                                   |
|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |             |                                                                                                    |             | semi-arides et pelouses à Origan                                                                                                  |
|       |             |                                                                                                    | <b>b</b>    | Maintien des habitats d'ourlet mésophile à aigremoine et Knautie des champs                                                       |
|       | <b>IP7</b>  | Evacuation de la biomasse                                                                          | <b>IE9</b>  | Evolution de l'ourlet nitrophile à Ortie dioïque et Gaillet croisettes vers l'ourlet mésophile à Aigremoine et Knautie des champs |
| TE 3  | <b>IP8</b>  | Respect du zonage                                                                                  | <b>IE10</b> | Présence du Cuivré des marais (chenilles et imagos)                                                                               |
|       | <b>IP9</b>  | Evacuation obligatoire de la biomasse                                                              | <b>IE11</b> | Maintien des habitats en place                                                                                                    |
| TE 4  | <b>IP10</b> | Respect des zones de fauche                                                                        |             |                                                                                                                                   |
|       | <b>IP11</b> | Pose de la clôture en amont de la fauche                                                           |             |                                                                                                                                   |
| TE 5  | <b>IP12</b> | Respect des périodes de pâturage                                                                   | <b>IE12</b> | Réduction du développement des rejets de Prunelier, Aubépine monogyne... etc.                                                     |
|       | <b>IP13</b> | Respect du chargement                                                                              |             |                                                                                                                                   |
|       | <b>IP14</b> | Mise en place du pâturage tous les ans obligatoire                                                 |             |                                                                                                                                   |
| TE 6  | <b>IP15</b> | Respect des dates de pâturage                                                                      | <b>IE13</b> | Maintien des habitats en place                                                                                                    |
|       | <b>IP16</b> | Respect du chargement                                                                              |             |                                                                                                                                   |
| TE 7  | <b>IP17</b> | Respect du cahier des charges et suivi du chantier par le gestionnaire                             | <b>IE14</b> | Maintien des habitats pelouses semi-arides et pelouses à Origan                                                                   |
|       |             |                                                                                                    | <b>IE15</b> | Maintien des zones favorables à <i>Maculinea arion</i> (zone à Origan)                                                            |
| TE 8  | <b>IP18</b> | Respect du nombre de passage                                                                       | <b>IE16</b> | Disparition progressive des zones d'orties (en lien avec opération TU 3)                                                          |
|       |             |                                                                                                    | <b>IE17</b> | Diminution de 50 % des zones de clématites                                                                                        |
| TE 9  | <b>IP19</b> | Conservation et rajeunissement des linéaires de haies                                              | <b>IE18</b> | Régression de 50 % au moins des surfaces fortement colonisées par l'Ortie dioïque et la clématite                                 |
|       | <b>IP20</b> | Recépage d'au moins 80% du linéaire de haies en six ans                                            |             |                                                                                                                                   |
| TE 10 | <b>IP21</b> | Taille de tous les arbres têtard                                                                   | <b>IE19</b> | Présence d'insectes saproxyliques                                                                                                 |
|       | <b>IP22</b> | Création de nouveaux arbres têtard (jeunes frênes présents dans la ripisylve à conduire en têtard) |             |                                                                                                                                   |
| TE 11 | <b>IP23</b> | Remplacement d'au moins 80 % de la clôture du coteau calcaire                                      |             |                                                                                                                                   |
|       | <b>IP24</b> | Entretien chaque année de 100 % du linéaire de clôture en prairie humide (TE 6)                    |             |                                                                                                                                   |

## B.2- OBJECTIFS ET METHODES D'ÉVALUATION DU PLAN DE GESTION

### B.2.1- OBJECTIFS

Il est essentiel de prendre du recul sur le dernier plan de gestion avant d'en rédiger un nouveau ; dresser un bilan des opérations effectuées, évaluer leur taux de réalisation et leur pertinence est primordial pour constater ce qui n'a pas fonctionné, reconduire les actions efficaces, ajuster certaines opérations et en proposer de nouvelles, le tout au regard de la connaissance actuelle de la RNR, des faisabilités, des contraintes et des nouveaux objectifs de gestion qui vont découler de cette évaluation.

### B.2.2- METHODES ET OUTILS

L'évaluation du plan de gestion s'appuie notamment sur les cahiers techniques de l'ATEN suivant :

- CT 79 : Guide méthodologique des plans de gestion des réserves naturelles,
- CT 88 : Guide d'élaboration des plans de gestion des espaces naturels.

La présente évaluation s'appuie également sur l'évaluation à mi-parcours présentée dans la section suivante.

Chacune des opérations est évaluée individuellement. Elles sont regroupées par objectifs opérationnels et par objectifs à long terme. Chaque échelon fera l'objet d'une évaluation dédiée, adaptée au format de l'échelon en question.

#### B.2.2.1. Evaluation des opérations

L'évaluation de chacune des opérations se décline comme suit :

1. Objectif et description de l'action,
2. Localisation, période d'intervention,
3. Taux de réalisation de l'action :

Le taux de réalisation se base sur la méthodologie mise en place par Eden 62 (Eden 62, 2013) : et qui s'articule autour du calcul suivant :

Taux de réalisation = Réalisation \* (Temps + Opérateur)

Dans ce calcul, les valeurs Réalisation, Temps et Opérateur (= Moyens techniques) sont établis selon le tableau qui suit :

Tableau 7. barème de notation

|                                    |                                                                          |       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Réalisation<br>(2 points)          | Non réalisée : Non évaluable                                             | 0     |
|                                    | Réalisée au quart (0 < → 25%)                                            | 0.5/2 |
|                                    | Partiellement réalisée (25% → 50 %)                                      | 1/2   |
|                                    | Réalisée au trois quart (50% → 75%)                                      | 1.5/2 |
|                                    | Réalisée totalement (75% → 100%)                                         | 2/2   |
| Temps<br>(9 points)                | Période non respectée                                                    | 0/6   |
|                                    | Période non respectée, mais compatible avec l'objectif                   | 3/6   |
|                                    | Période respectée                                                        | 6/6   |
|                                    | Fréquence non respectée                                                  | 0/2   |
|                                    | Fréquence respectée, ou pas de fréquence                                 | 2/2   |
|                                    | Année non respectée                                                      | 0,5/1 |
|                                    | Année respectée                                                          | 1/1   |
| Moyens<br>techniques<br>(1 points) | Intervention d'un prestataire externe non prévue dans le plan de gestion | 0/1   |
|                                    | Intervention d'un prestataire externe prévue ou Réalisation en interne   | 1/1   |

Ce calcul permet d'obtenir une note qui est ensuite ramenée sur 100 pour obtenir un pourcentage de réalisation.

4. Opérateur et synthèse budgétaire de l'opération,
5. Evaluation des indicateurs :

Afin d'évaluer l'impact des opérations de gestion sur les espèces faunistiques et floristiques, mais aussi sur les différents milieux composant la Réserve, des indicateurs de résultats (indicateurs de pression et indicateurs d'état) et des suivis sont mis en place. Les résultats par rapport aux indicateurs seront détaillés à la fin de chaque fiche opération. Pour chaque indicateur, des valeurs seuils sont définies telles que :

|                                 |                                                |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Indicateurs de pression<br>(IP) | Opération réalisée avec succès                 |  |
|                                 | Opération partiellement réalisée               |  |
|                                 | Echec de l'opération ou opération non réalisée |  |

|                         |                                |  |
|-------------------------|--------------------------------|--|
| Indicateurs d'état (IE) | Objectif atteint               |  |
|                         | Objectif partiellement atteint |  |
|                         | Objectif non atteint           |  |

6. Commentaires sur la mise en œuvre de l'action,
7. Evaluation à partir de quatre critères différents :

Quatre critères sont utilisés pour évaluer les opérations. Ils font référence à des critères régulièrement employés pour l'évaluation de plan de gestion (Couton et Thirion 2017, Chevreau et Lantuejoul 2015). Une note sur 3 est ainsi attribuée à chacun de ces critères :

Effizienz = les ressources mises à disposition ont-elles été suffisantes pour la bonne réalisation de l'opération,

Efficacité = les résultats obtenus sont-ils à la hauteur de ceux espérés (indépendamment de la bonne réalisation de l'opération),

Pertinence = l'opération est-elle cohérente et/ou utile vis-à-vis des objectifs opérationnels et à long terme,

Formulation = l'intitulé et le descriptif de l'opération sont-ils en accord avec sa réalisation, mais aussi avec les objectifs liés.



**Tableau 8. Attribution de la note relative à l'efficience**

|            |                                            |                       |                    |     |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----|
| Efficience | Pas de différence entre coût prévu et réel | Résultats validés     | Action prioritaire | 3/3 |
|            |                                            |                       | Action secondaire  | 3/3 |
|            | Ou Coût réel inférieur au coût prévu       | Résultats validés non | Action prioritaire | 2/3 |
|            |                                            |                       | Action secondaire  | 2/3 |
|            | Coût réel supérieur au coût prévu          | Résultats validés     | Action prioritaire | 3/3 |
|            |                                            |                       | Action secondaire  | 2/3 |
|            |                                            | Résultats validés non | Action prioritaire | 1/3 |
|            |                                            |                       | Action secondaire  | 0/3 |

Pour des confort de lecture et pour faciliter l'évaluation, les suivis (SE) sont regroupés au sein de l'évaluation de deux objectifs à long terme (OLT B et D) seulement, pour ne pas être doublonnés et évalués en plusieurs parties distinctes.

### **B.2.2.2. Evaluation des objectifs opérationnels**

Il s'agit dans cette étape de dresser une synthèse des opérations réalisées et des résultats obtenus afin de faire le bilan de l'atteinte des objectifs opérationnels. Cette analyse se base entre autres sur les indicateurs de pression (reflet des pressions directes ou indirectes exercées sur le milieu naturel et provoquant des changements sur l'état de l'enjeu lié aux objectifs). Cette étape est construite comme ci-après.

- 1/ Récapitulatif des opérations et des suivis associés,
- 2/ Synthèse et moyenne des résultats obtenus pour les différentes opérations,
- 3/ Quatre critères d'évaluation identiques à ceux de l'évaluation des opérations : efficience, efficacité, pertinence (au regard de l'objectif à long terme) et formulation.
- 4/ Synthèse de l'analyse.

### **B.2.2.3. Evaluation des objectifs à long terme**

Il s'agit de dresser le bilan de l'ensemble des objectifs opérationnels associés à chaque OLT, afin d'étudier s'il y a une évolution vers l'atteinte de l'OLT et d'analyser ce qui a été mis en place pour y parvenir. L'étape est construite de la manière suivante :

- 1/ Récapitulatif des objectifs opérationnels,
- 2/ Rappel de la problématique associée,
- 3/ Synthèse de l'OLT.

## B.2.3- PRESENTATION ET SYNTHÈSE DE L'ÉVALUATION À MI-PARCOURS

L'évaluation à mi-parcours du plan de gestion a été rédigée en 2018 par le CEN. Elle avait pour objectif de réaliser un bilan des actions prévues et réalisées. Il s'agit aussi de vérifier l'efficacité, la pertinence et la cohérence des opérations et des objectifs du plan afin de les modifier s'ils ne permettent pas d'atteindre les objectifs à long terme. Cette évaluation permet également d'adapter le plan à l'évolution du milieu (suite à la gestion, à des catastrophes naturelles...), mais aussi à l'évolution des connaissances de la RNR (suite aux suivis et études) (Chiffaut, 2006) ou à d'autres facteurs de la vie de la RNR, notamment l'acquisition de 2,75 hectares complémentaires, attenants à la RNR, par le Conservatoire d'espaces naturels des Pays de la Loire.

L'évaluation à mi-parcours a montré un certain nombre de limites au plan de gestion ainsi que quelques difficultés rencontrées lors de sa mise en œuvre. Suite à cette évaluation, quelques modifications ont été apportées pour la période 2019-2021 :

8. La formulation de plusieurs actions a été modifiée afin de préciser au mieux le but de l'opération dès le titre ou encore de rectifier quelques erreurs au sein de la fiche action :

TE 5 : Pâturer tardivement et de manière extensive le coteau calcaire

TE 6 : Pâturer tardivement et de manière extensive les prairies humides

SE 4 : Suivre annuellement les populations de Cuivré des marais (*Lycaena dispar*)

9. Le protocole de plusieurs opérations a été modifié pour les trois dernières années du plan de gestion (2019-2021) afin d'avoir des actions plus précises et plus claires. De plus, les protocoles de toutes les actions de suivi ont été intégrés aux fiches action du document prévisionnel (2019-2021). Cela permet à l'équipe du Conservatoire d'avoir accès aux protocoles des suivis plus facilement et de mettre en lumière toutes les modifications apportées aux fiches actions dans le document prévisionnel.

TE 3 : Faucher tardivement avec exportation la prairie humide

SE 1 : Mettre en place un suivi phytosociologique des habitats naturels

SE 2 : Suivre annuellement les plantes patrimoniales

SE 4 : Suivre les populations de Cuivré des marais (*Lycaena dispar*) tous les deux ans

SE 7 : Suivre annuellement les populations de Lépidoptères

SE 9 : Suivre les populations d'Orthoptères en lien avec les communautés végétales

10. Certaines actions ont été jugées non pertinentes lors du bilan des trois premières années de plan de gestion. Elles ont été réajustées ou supprimées pour la période 2019 - 2021.

TU 4 : Elaborer de nouveaux panneaux pédagogiques

TE 4 : Poser une clôture temporaire séparant les zones fauchées des zones non fauchées

TE 8 : Entretenir les zones rudérales

TU 3 : Restaurer des bandes de sols nus par décapage

SE 8 : Suivre annuellement les populations de Reptiles

SE 10 : Rechercher les colonies de Chiroptères en parturition aux alentours de la RNR

SE 11 : Effectuer un suivi acoustique des populations de Chiroptères sur le périmètre de la RNR

11. Plusieurs fiches actions ont été fusionnées entre elles afin de diminuer le nombre de fiches, mais aussi pour plus de simplicité et de clarté lors de la lecture du plan de gestion.

|                                                                      |   |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| TE 9 : Entretenir le linéaire de haies                               | + | TE 10 : Entretenir les arbres isolés et les arbres têtards                        |
| SE 5 : Suivre annuellement les populations de Chiroptères sur la RNR | + | SE 6 : Suivre annuellement les populations de Chiroptères en périphérie de la RNR |
| AD 7 : Evaluer à échéance de 6 ans le plan de gestion                | + | AD 8 : Elaborer et rédiger le 3 <sup>ème</sup> plan de gestion                    |

L'absence de recul concernant plusieurs actions de restauration ou de suivis scientifiques n'a pas permis d'en évaluer les résultats ni d'observer de réels changements d'habitats. Cette présente évaluation qui arrive à l'issue du plan de gestion permet donc un recul plus important sur l'ensemble du plan de gestion en observant l'impact de la gestion sur cette période.

Un document prévisionnel pour les trois dernières années du plan de gestion (période 2019 – 2021) a ensuite été élaboré, afin de reprendre toutes les opérations effectuées lors de cette période à travers des fiches actions détaillées.



## C- EVALUATION FINALE DU PLAN DE GESTION 2016 – 2021

Ce chapitre présente l'évaluation finale du plan de gestion 2016 – 2021 telle que normalisée dans le guide ATEN de 2006 et mis à jour en 2017 sur le site de l'OFB.

### C.1- BILAN DE LA REALISATION DU PLAN DE GESTION 2016-2021

#### C.1.1- BILAN GLOBAL DE LA REALISATION DU PLAN DE GESTION : PAR OPERATION

Le tableau V résume l'état d'avancement de chacune des opérations sur la période 2016 - 2021. Il fournit également des informations et des remarques permettant de comprendre le report, ou la modification d'une action.

|                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Opération réalisée     |  Opération réalisée en partie |  Opération en cours |  Opération reportée |
|  Opération non réalisée |  Pas d'opération prévue       |                                                                                                      |                                                                                                        |

Tableau 9: Avancement et niveau de réalisation des opérations sur la période 2016-2021

| Avancement et niveau de réalisation des opérations sur la période 2016-2021 |                                                                                 |                                 |      |      |      |      |      |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opération                                                                   |                                                                                 | Code de l'objectif opérationnel | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Taux de réalisation | Remarques                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TU 1                                                                        | Restaurer le coteau calcaire par coupe et débroussaillage                       | A 1                             |      |      |      |      |      |      | 100%                | Suite à la découverte d'un Hémiptère patrimonial dans les parcelles 134 et 265, la surface totale de coupe a été modifiée. Le fourré des deux parcelles a été conservé. L'objectif de traiter 80% de la surface boisée est toutefois atteint (80,3%).                                                      |
| TU 2                                                                        | Abattre et exporter les noyers                                                  |                                 |      |      |      |      |      |      | 100%                | Cette opération s'est déroulée comme prévu dans le plan de gestion. Sa mise en œuvre a permis la fauche ainsi que l'exportation de la matière organique qui n'était pas encore réalisée jusqu'à présent.                                                                                                   |
| TU 3                                                                        | Restaurer des bandes de sol nu par décapage                                     |                                 |      |      |      |      |      |      | 0%                  | Opération annulée. Il n'y a pas de risque avéré d'expansion au détriment des habitats plus fonctionnels et patrimoniaux. Par ailleurs, cette végétation à Ortie dioïque peut être favorable à certains invertébrés.                                                                                        |
| TU 4                                                                        | Elaborer et poser de nouveaux panneaux pédagogiques                             | E 1                             |      |      |      |      |      |      | 32,5%               | Opération reportée en 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TE 1                                                                        | Entretenir les zones restaurées                                                 | A 1                             |      |      |      |      |      |      | 100%                | Le pâturage ovin et le débroussaillage permettent de limiter les rejets des ligneux.                                                                                                                                                                                                                       |
| TE 2                                                                        | Faucher tardivement avec exportation le coteau calcaire                         |                                 |      |      |      |      |      |      | 75%                 | Fauche réalisée systématiquement, mais évacuation de la biomasse partielle.                                                                                                                                                                                                                                |
| TE 3                                                                        | Faucher tardivement avec exportation la prairie humide                          | A 2                             |      |      |      |      |      |      | 90%                 | Compte tenu des conditions exceptionnellement pluvieuses du printemps 2016, la végétation de la prairie était trop dense pour réaliser la fauche sur l'ensemble de la zone prévue.                                                                                                                         |
| TE 4                                                                        | Poser une clôture temporaire séparant les zones fauchées des zones non fauchées |                                 |      |      |      |      |      |      | 70%                 | L'action a été annulée lors de la révision à mi-parcours, faute de pertinence.                                                                                                                                                                                                                             |
| TE 5                                                                        | Pâturer tardivement et de manière extensive le coteau calcaire                  | A 1                             |      |      |      |      |      |      | 37,5%               | En 2016, le Conservatoire a recherché un nouveau partenaire pour la mise en œuvre du pâturage ovin sur le site. A partir de 2017, Nicolas Fleurance, éleveur de brebis laitières (en agriculture biologique) a mis à l'herbe ses brebis sur le site. Une propriétaire de chevaux a pris le relais en 2020. |
| TE 6                                                                        | Pâturer tardivement et de manière extensive la prairie humide                   | A 2                             |      |      |      |      |      |      | 15%                 | Le partenariat historique avec un éleveur en place a cessé, ce dernier ayant cessé son activité en 2015. Après plusieurs années de recherches infructueuses, un partenariat a été trouvé avec un particulier propriétaire de chevaux, en 2020.                                                             |

|               |                                                                                                                |                    |  |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TE 7          | Entretien par débroussaillage manuel les zones non gérées mécaniquement.                                       | A 1                |  |  |  |  |  |  | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TE 8          | Entretien les zones rudérales                                                                                  |                    |  |  |  |  |  |  | 60%  | Malgré l'action les deux premières années, les orties sont toujours présentes sur le site sans qu'une expansion ne soit observée. L'action TU3 (étrépage) a donc été annulée. Les actions de fauche et de pâturage du coteau suffisent à entretenir les zones rudérales. L'opération TE 8 est donc annulée à mi-parcours. |
| TE 9 (+TE 10) | Entretien le linéaire de haies, les arbres isolés et les arbres têtard                                         | C 1                |  |  |  |  |  |  | 75%  | Fusion de TE 9 et TE 10 lors de l'évaluation. En 2017 et 2018, la taille des arbres est reportée.                                                                                                                                                                                                                         |
| TE 11         | Contrôler et entretenir le linéaire de clôtures                                                                | A 1, A 2           |  |  |  |  |  |  | 75%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SE 1          | Mettre en œuvre un suivi phytosociologique des habitats naturels                                               | A 1, A 2, C.1, D 1 |  |  |  |  |  |  | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SE 2          | Suivre annuellement les espèces de flore patrimoniale                                                          | A.1, A.2, D.1      |  |  |  |  |  |  | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SE 3          | Compléter voire accroître les connaissances sur les populations d'Azuré du Serpolet ( <i>Maculinea arion</i> ) | A 1, D 1           |  |  |  |  |  |  | 95%  | Action initialement prévue en 2016, 2018 et 2021. Année 2021 finalement remplacée par 2019, avec plus de moyens dédiés (stage).                                                                                                                                                                                           |
| SE 4          | Suivre annuellement les populations de Cuivré des marais ( <i>Lycaena dispar</i> )                             | A 2, D 1           |  |  |  |  |  |  | 100% | Les suivis étant réalisés tous les 2 ans, l'intitulé du suivi est rectifié dans le document prévisionnel 2019 - 2021.                                                                                                                                                                                                     |
| SE 5 (+SE 6)  | Suivre annuellement les populations de Chiroptères sur la RNR                                                  | B 1                |  |  |  |  |  |  | 100% | Fusion de SE 5 et SE 6 lors de l'évaluation à mi-parcours.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SE 7          | Suivre annuellement les populations de Lépidoptères                                                            | A.1, A.2, D.1      |  |  |  |  |  |  | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SE 8          | Suivre annuellement les populations de Reptiles                                                                | D.1                |  |  |  |  |  |  | 100% | Opération annulée à mi-parcours.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SE 9          | Suivre annuellement les populations d'Orthoptère en lien avec les communautés végétales                        | A 1, D 1           |  |  |  |  |  |  | 100% | Initialement le suivi était prévu tous les deux ans. A mi-parcours il est passé à une fréquence annuelle. Par conséquent seule l'année 2017 n'a pas fait l'objet de suivi.                                                                                                                                                |
| SE 10         | Rechercher les colonies de Chiroptères en parturition aux alentours de la RNR                                  | B 1                |  |  |  |  |  |  | 0%   | Cette opération a été d'abord reportée du fait de la perte des compétences internes en matière de connaissance des Chiroptères au sein du Conservatoire. Elle a ensuite été définitivement annulée par la révision à mi-parcours.                                                                                         |
| SE 11         | Effectuer un suivi acoustique des populations de Chiroptères sur le                                            |                    |  |  |  |  |  |  | 20%  | Cette opération a été d'abord reportée du fait de la perte des compétences internes en matière de connaissance des Chiroptères au sein du                                                                                                                                                                                 |




|      |                                                                                                                  |               |  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | périmètre de la RNR                                                                                              |               |  |  |  |  |  |      | Conservatoire. Elle a ensuite été définitivement annulée par la révision à mi-parcours.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RE 1 | Effectuer un inventaire des syrphes et déduire un diagnostic de l'état de conservation des habitats              | A.1, A.2, D 1 |  |  |  |  |  | 95%  | La deuxième session était initialement prévue en 2021, elle a finalement été avancée à 2019 pour avoir deux années consécutives.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RE 2 | Etudier le fonctionnement hydrologique et la composition pédologique de la RNR                                   | D 2           |  |  |  |  |  | 0%   | Opération annulée en 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RE 3 | Effectuer un inventaire des Coléoptères saproxyliques de la RNR                                                  | C.1, D.1      |  |  |  |  |  | 95%  | Action prévue en 2021, finalement avancée en 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PI 1 | Sensibiliser et former les publics à la biodiversité grâce à la RNR                                              | E 1           |  |  |  |  |  | 100% | Contribution plus ou moins importante en fonction des années.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PI 2 | Contribuer à l'enrichissement des connaissances naturalistes et scientifiques à l'échelle régionale ou nationale |               |  |  |  |  |  | 75%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AD 1 | Effectuer une veille foncière en périphérie de la RNR                                                            | A 3           |  |  |  |  |  | 100% | Le Conservatoire a acquis par acte notarié, en date du 5 octobre 2017, les parcelles cadastrées YP 3, 8, 70 et 84 à Luché-Pringé, auprès de M. Bourillon.<br>Le Conservatoire a par ailleurs conventionné avec la SAFER depuis 2015 pour la mise en œuvre de l'outil vigifoncier, qui permet de suivre les mutations foncières.<br>L'absence de consensus avec le Conseil régional sur la maîtrise foncière par le Conservatoire n'a pas permis de mettre en œuvre une animation foncière plus dynamique.<br>Une petite parcelle de 845m² située au-dessus de la falaise calcaire a été acquise début 2022 (cf. tome 2). |
| AD 2 | Rechercher des partenariats financiers et réaliser les suivis comptables et administratifs de la RNR             | F 2           |  |  |  |  |  | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AD 3 | Réactualiser les conventions de gestion entre les agriculteurs gestionnaires et le CEN PDL                       |               |  |  |  |  |  | 50%  | En 2017 : travail sur une nouvelle convention avec M. Nicolas Fleurance, agriculteur, qui a mis ses brebis à partir de la même année sur la RNR. Signature en 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AD 4 | Préparer et participer à l'animation des réunions du comité consultatif                                          |               |  |  |  |  |  | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AD 5 | Elaborer annuellement le rapport d'activités                                                                     | F 1           |  |  |  |  |  | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                 |                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |      |                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|-------------------------------------------|
| AD 6            | Evaluer à mi-parcours le plan de gestion                                                      |  |  |  |  |  |  |  | 100% |                                           |
| AD 7<br>(+AD 8) | Evaluer à échéance de 6 ans le plan de gestion et rédiger le 3 <sup>ème</sup> plan de gestion |  |  |  |  |  |  |  | 95%  | Action fusionnée avec AD 8 à mi-parcours. |

## C.1.2- LOCALISATION DE MISE EN ŒUVRE DES OPERATIONS DE GESTION

La carte suivante synthétise l'ensemble des opérations de gestion et de restaurations menées chaque année dans la RNR. Afin de gagner en lisibilité, les actions de pâturage (TE 5 et TE 6) ne figurent pas sur la carte. Elles portent sur l'ensemble du coteau, et sur les parcelles de la zone humide.



**Figure 8. Bilan des opérations de gestion entre 2016 et 2021.**

*NB : les secteurs 2,3 et 4 sont acquis en 2017, pour un début de gestion en 2018.*

## C.2- BILAN FINAL DES OPERATIONS DE GESTION ET DES OBJECTIFS

### C.2.1- ANALYSE DE LA STRUCTURE ET DE LA CODIFICATION DES OPERATIONS DU PLAN DE GESTION 2016-2021

#### **Analyse globale**

---

L'arborescence du plan de gestion est bien organisée. Elle est déclinée en six objectifs à long terme (OLT). La moitié des OLT (B,C,E) ne comprend qu'un seul objectif opérationnel associé. Cela reste cohérent même si de ce fait, une redondance peut s'instaurer entre l'OLT et son objectif opérationnel, en particulier pour l'OLT B « maintenir et conserver les populations de chiroptères » avec son objectif opérationnel « Assurer la conservation des populations de Chiroptères dans et hors de la RNR ».

Les codifications sont claires et permettent de discriminer rapidement les types d'action. Elles portent les acronymes suivants :

|      |                      |      |                                            |
|------|----------------------|------|--------------------------------------------|
| TU = | Travaux uniques      | AD = | Gestion administrative                     |
| TE = | Travaux d'entretien  | PI = | Pédagogie, information, animation, édition |
| SE = | Suivis scientifiques | RE = | Recherche                                  |

Au total, 43 opérations ont été programmées pour les 6 ans de mise en œuvre du plan de gestion.



## C.2.2 - EVALUATION DES OPERATIONS ACTIONS PAR ACTIONS SELON L'ARBORESCENCE

### **C.2.2.1. OLT A - Maintenir, restaurer et conserver les habitats naturels**


Objectif opérationnel A.1 – Maintenir, restaurer et favoriser l'extension des habitats de pelouses calcicoles et d'ourlet et de prairie tout en assurant la conservation d'une mosaïque d'habitats calcicoles variés.



## Indicateurs :

### ➤ **IP1 : Coupe de 80 % des surfaces boisées de la RNR**

L'indicateur de pression IP1 est évalué par la réalisation de l'opération TU1. Initialement cette opération consistait en la coupe de la végétation boisée des 4 parcelles : 1026, 716, 134 et 265. Cependant le Conservatoire a décidé *in fine* de conserver les boisements des parcelles 134 et 265. Cette décision a été prise suite à la découverte d'un Hémiptère rare en France et non mentionné en Sarthe depuis plus de 80 ans : *Elasmostethus minor* (Cherpitel & Chevreau, 2017). Il s'agit d'une espèce de sous-bois ou de haies ensoleillées sur substrat calcaire, et inféodée au Chèvrefeuille des haies (*Lonicera xylosteum*). Il était donc apparu important de ne pas mettre en œuvre une opération de coupe sur l'ensemble de la zone afin de permettre le maintien d'*Elasmostethus minor* et de ses habitats. Avec le recul 3 ans plus tard, cette coupe à 80% ne semble pas participer au maintien de cette punaise (pas ou très peu de Chèvrefeuille restant), en revanche il est intéressant de maintenir quelques arbres et arbustes pour l'entomofaune, notamment pour les coléoptères tels que *Saperda punctata*.




Graphique 1: Résultats des suivis phytosociologiques de 2014 à 2018 sur la placette n° 9

Le graphique 1 montre la composition de la végétation depuis 2014 sur les parcelles 134 et 265, mesurée dans le cadre du suivi SE1 (placette n°9). Les espèces de fourrés arbustifs et d'ourlets nitrophiles sont dominantes, et la végétation semble avoir peu évolué depuis 2014.

Concernant les deux autres parcelles (1026 et 716) elles sont passées en coupes et ont été débroussaillées en 2016 (48,4% de déboisé) et 2017 (31,9% de déboisé). Au total 80,3% de la surface boisée a été coupé entre 2016 et 2017, l'objectif concernant l'indicateur IP1 (coupe de 80% des surfaces boisées de la RNR) a donc été atteint dès 2017.

### ➤ **IE1 : Passage à une communauté d'ourlet du *Trifolio medii* - *Agrimonia eupatoria* ou une communauté de pelouse du *Mesobromion erecti***

L'indicateur d'état IE1 est évalué par les suivis phytosociologiques (SE1) et plus particulièrement par le suivi de la placette n°6 située au niveau de la zone traitée dans l'opération TU1.





La placette n° 6 est située au sein d'un bosquet en marge du coteau. La végétation herbacée en 2016 était rattachable à l'*Alliaria petiolatae* - *Chaerophylletum temuli*, une association de lisière forestière calcicole. En 2016 et 2017, cette partie du coteau a fait l'objet d'une restauration. Il s'agissait d'éclaircir le boisement tout en conservant certains arbustes.

Même si les fourrés arbustifs ont quasiment disparu depuis 2019, l'objectif visé, très ambitieux, n'est pas encore atteint. Il faudra du temps pour que l'ourlet à *Chaerophyllum temulum* disparaisse au profit de l'ourlet calcicole à *Brachypode*, car le substrat marneux et profond en place sur la réserve favorisera pendant longtemps l'installation de végétations plus riches en nutriments. Il faudrait poursuivre la fauche avec exportation pour favoriser cette transition, mais également bûcheronner les derniers arbres pour supprimer l'ombre qu'ils apportent, ainsi que leur rôle de semencier.



Figure 9. Parcelles 1026 et 716 (septembre 2021)

### **IE2 : Apparition d'espèces patrimoniales comme le Grémil bleu-pourpre dans les zones traitées**

L'indicateur d'état IE2 est évalué par le suivi des espèces patrimoniales (SE2). Une partie de la zone à restaurer a été coupée en automne 2016 et la deuxième partie en 2017.



**Tableau I : Résultats des suivis SE 2 concernant la zone d'intervention de TU 1**

| NOM SCIENTIFIQUE                    | NOM VERNACULAIRE      | LISTE ROUGE REGIONALE | OBSERVATIONS ET COMPTAGES SUR LA ZONE (NOMBRE DE PIEDS) |      |      | 2019-2021 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------|------|-----------|
|                                     |                       |                       | 2016                                                    | 2017 | 2018 |           |
| <i>Allium sphaerocephalon</i>       | Ail à tête ronde      | LC                    | -                                                       | -    | 0    | NA        |
| <i>Aegonychon purpureocaeruleum</i> | Grémil bleu-pourpre   | NT                    | -                                                       | 193  | 311  | NA        |
| <i>Dianthus caryophyllus</i>        | Œillet giroflée       | NE                    | -                                                       | -    | -    | NA        |
| <i>Echinops sphaerocephalus</i>     | Echinops à tête ronde | NE                    | -                                                       | 0    | 4    | NA        |
| <i>Ononis natrix</i>                | Bugrane jaune         | NT                    | -                                                       | -    | -    | NA        |

Les résultats sont encourageants, car deux espèces patrimoniales calcicoles apparaissent sur la zone :

12. le Grémil bleu-pourpre (*Buglossoides purpureocaerulea*) avec 193 pieds en 2017 et 311 pieds en 2018.
13. L'Echinops à tête ronde (*Echinops sphaerocephalus*) avec 4 pieds en fleur en 2018.

Cependant il n'y a pas à ce stade, d'effet significatif sur l'habitat, ni sur les espèces les plus patrimoniales. Il est à déplorer l'arrêt du dénombrement des espèces patrimoniales au niveau de la zone concernée à partir de 2019. A partir de cette date, ces espèces ont bien été comptabilisées, mais seul l'effectif total sur l'ensemble du coteau a été retenu. Il sera nécessaire de remettre en place un suivi des espèces patrimoniales au niveau de cette zone dans le prochain plan de gestion, pour mesurer les effets à plus long terme. L'arrêt du dénombrement est certainement causé par le changement de personnel au CEN, 3 naturalistes s'étant succédés pour ce suivi entre 2017 et 2019.

En 2021, ces espèces sont toujours présentes sur la zone, en particulier le Grémil.

| Formulation<br>3/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pertinence<br>3/3                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Au regard des objectifs de réouverture et des faibles surfaces de pelouse sur la RNR et à l'échelle du Port des roches, il était important de réaliser cette opération. |
| Efficacité<br>2/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Efficienne<br>3/3                                                                                                                                                       |
| L'objectif de réouverture de 80% des surfaces boisées est atteint, cependant d'un point de vue phytosociologique la végétation herbacée correspond encore à un ourlet forestier et n'a pas évolué vers une pelouse calcicole. Une station notable de Grémil bleu-pourpre s'est installée sur la zone et se maintient.               | RAS                                                                                                                                                                     |
| Synthèse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |
| Il n'y a pas à ce stade d'effet significatif sur le type de végétation, ce qui est à imputer au substrat marneux relativement profond. Cela induit une difficulté d'installation pour les espèces patrimoniales, mais il est nécessaire de continuer à suivre la flore notamment pour mesurer d'éventuels effets à plus long terme. |                                                                                                                                                                         |

## TU 2


## ABATTRE ET EXPORTER LES NOYERS

### OBJECTIFS DE L'OPERATION, RESULTATS ATTENDUS ET MODE OPERATOIRE

**Objectif :** Abattre les noyers situés en bas du coteau afin de favoriser le développement et la mise en lumière de la strate herbacée.

**Description de l'opération :** Couper, débiter puis exporter les noyers. Rogner les souches afin de faciliter la fauche mécanique dans la partie plane du coteau (cf. action TE 2).

#### Localisation




#### Légende

- Périmètre du site
- TU 2 - noyers abbatus
- Placette phytosociologique

0 10 20 30 40 m

Source : BD Ortho 2015  
Elaboration : L. Gaffé - CEN PDL - Août 2018  
Logiciel : Qgis 3.0.1



**Conservatoire  
d'espaces naturels  
Pays de la Loire**



**Figure 11 : Un des noyers sur le point d'être abattu**



**Figure 10 : Noyer abattu et stères débités**

| Périodes d'intervention |      |      | Nombre d'arbres |      |      |      | Réalisation |      |      |
|-------------------------|------|------|-----------------|------|------|------|-------------|------|------|
| 2016                    | 2017 | 2018 | Prévu           | 2016 | 2017 | 2018 | 2016        | 2017 | 2018 |
| 20 - 23 juin            | -    | -    | Prévu           | 5    | -    | -    | 100 %       | -    | -    |

|                                                                                                                                                             |         |            |      |   |             |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|---|-------------|------|------|
|                                                                                                                                                             |         | Réalisée   | 5    | - | -           |      |      |
| Opérateur                                                                                                                                                   |         |            |      |   |             |      |      |
| AISP                                                                                                                                                        |         |            |      |   |             |      |      |
| Synthèse budgétaire de l'opération (2016 - 2021)                                                                                                            |         |            |      |   |             |      |      |
|                                                                                                                                                             | 2016    |            | 2017 |   | 2018...2021 |      |      |
|                                                                                                                                                             | CEN     | Prestation |      |   |             |      |      |
| Budget prévisionnel                                                                                                                                         | 1 600 € | 190 €      | -    |   | -           |      |      |
| Budget réel                                                                                                                                                 | 1 600 € | 328,30 €   | -    |   | -           |      |      |
| Commentaire sur la mise en œuvre et les résultats                                                                                                           |         |            |      |   |             |      |      |
| L'action de coupe des Noyers s'est déroulée comme prévu dans le plan de gestion.                                                                            |         |            |      |   |             |      |      |
| Indicateurs de résultats                                                                                                                                    |         |            |      |   |             |      |      |
| Indicateurs de pression (IP)                                                                                                                                |         |            |      |   |             |      |      |
| IP2 : 5 Noyers coupés, débités, exportés                                                                                                                    |         |            |      |   |             |      |      |
| IP3 : Fauche mécanique avec exportation rendue possible                                                                                                     |         |            |      |   |             |      |      |
| Indicateurs d'état (IE)                                                                                                                                     |         |            |      |   | 2016        | 2017 | 2018 |
| IE3 : Evolution de la surface traitée avec un passage de l'ourlet nitrophile à un ourlet basophile du <i>Knautio arvensis</i> - <i>Agrimonia eupatoriae</i> |         |            |      |   |             |      |      |
|                                                                                                                                                             |         |            |      |   | 2019        | 2020 | 2021 |
|                                                                                                                                                             |         |            |      |   |             |      |      |
| Taux de réalisation : 100%                                                                                                                                  |         |            |      |   |             |      |      |


## Indicateurs

### ➤ IP2 : 5 Noyers coupés, débités et exportés / IP3 : Fauche mécanique avec exportation rendue possible

Les indicateurs de pression IP2 et IP3 sont évalués par la réalisation de l'opération TU2. L'opération a été réalisée avec succès, les 5 noyers ont été coupés, débités puis exportés et les souches ont été rognées pour faciliter la fauche mécanique. Les objectifs sont donc atteints.

### ➤ IE3 : Evolution de la surface traitée avec un passage de l'ourlet nitrophile à un ourlet basophile du *Knautio arvensis* - *Agrimonia eupatoria*

L'indicateur d'état IE3 est évalué par le suivi phytosociologique (SE1) et plus particulièrement par le suivi de la placette n°7 (anc. Placette n°8 jusqu'en 2018) qui est située en bas du coteau, au niveau de l'ancienne rangée de noyers. En 2016, la placette était le support d'une végétation ourléifiée caractérisée notamment par la présence d'espèces végétales telles que : l'Eupatoire chanvrine (*Eupatorium cannabinum*) et l'Angélique des bois (*Angelica sylvestris*).





L'objectif de gestion de cet habitat est le maintien voire l'extension des habitats de milieux ouverts au détriment des ourlets eutrophes. Au printemps 2016, les noyers situés au niveau de la placette n° 7 ont été abattus. La végétation herbacée a donc été plus exposée à la lumière directe du soleil et s'est appauvrie en espèces eutrophiles.

Suite à l'abattage de ces arbres, une fauche tardive a été mise en place. L'action de coupe et d'exportation des noyers semble avoir limité et ralenti le phénomène d'eutrophisation et d'ourlification.

La végétation n'est pas encore stabilisée sur cette station (cf. graphique précédent) :

En effet, en 2017, cette placette était rattachable au *Centaureo nemoralis* - *Origanetum vulgaris*, une association d'ourlet basophile appartenant à l'alliance du *Knautio arvensis* - *Agrimonia eupatoria*. Et en 2018 elle est toujours rattachée à cette alliance sans être dans un état de conservation optimal, du fait de la rémanence de quelques arbustes et d'espèces nitrophiles. En 2018, les espèces majoritaires sont celles de l'ourlet nitrophile et l'objectif n'est donc pas atteint. En 2020 et contrairement à 2019, le cortège de friches semble s'être réduit et celui des prairies avoir augmenté. Il sera nécessaire d'attendre quelques années pour voir si la tendance se confirme.

Globalement l'objectif initial semble difficilement atteignable, car la station s'inscrit au sein d'une végétation rudérale très marquée par les orties et les bromes stériles notamment à cause de la pente qui recueille les ruissèlements et enrichit sans cesse ce bas de coteau. Le cortège lié aux friches eutrophes reste fortement présent en 2021, et le cortège calcicole ne parvient pas à percer. Le phénomène est particulièrement visible en cette saison pluvieuse où les prairies et ourlets eutrophes prennent le pas sur l'ourlet maigre.

L'impact de la coupe des noyers peut également être évalué par les résultats du suivi des Lépidoptères (SE 7). En effet l'un des transects (transect 2) est situé sous les noyers, cela permet de comparer les espèces de Lépidoptères présentes avant et après la coupe. Cependant, ce transect n'a été mis en place qu'à partir d'avril 2016 et la coupe des noyers a été effectuée entre le 20 et le 23 juin 2016. Les résultats étudiés, pour cette opération de gestion, sont donc compris entre avril et juin pour les années 2016, 2017 et 2018 afin de pouvoir comparer les résultats obtenus avant et ceux obtenus après la coupe des noyers.

Depuis 2016, une tendance à la hausse est constatée pour le nombre d'individus sur le secteur. Sans statistiques appliquées, ce constat est cependant à prendre avec précaution, d'autant que le transect ne traverse pas uniquement cette zone, mais aussi le bas de coteau plus à l'est. Même si les Lépidoptères Rhopalocères se rencontrent dans un grand nombre de milieux, une plus grande diversité de papillons se trouve dans les milieux ouverts et ensoleillés tels que les prairies, talus, tourbières...etc. (KARAS & BECAN, 2009). Cette augmentation du nombre d'individus pourrait s'expliquer par l'abattage des noyers et le recépage de la haie (action TE 9) qui ont permis d'augmenter l'exposition lumineuse.

Les résultats du suivi des Lépidoptères indiquent également que le nombre d'espèces rencontrées est en augmentation entre 2016 et 2020. Cependant, notons qu'il y a tout de même des disparitions comme des apparitions d'espèces dans les relevés entre ces trois années. Les espèces non revues sont plutôt des espèces de lisières comme le Tristan, la Carte géographique ou encore le Citron. A l'inverse, sont apparues des espèces de prairies telles que des Zygènes, la Petite violette, la Grisette ou encore le Flambé. Ces observations suggèrent que les



RNR « Coteau et Prairies des Cafort » Figure 12. Transect 2 au niveau du bas de coteau, désormais ouvert




conditions stationnelles ont évolué : station plus chaude et plus ouverte/exposée.

L'action de coupe des noyers, couplée à celle du recépage de la haie, ont contribué à l'évolution de la zone en un habitat de « milieu ouvert » et l'objectif fixé par l'indicateur IE 3 est atteint.

| <b>Formulation<br/>3/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Pertinence<br/>3/3</b>                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cet objectif est tout à fait cohérent avec l'objectif d'extension des habitats de pelouses, d'ourlet et de prairie de la RNR. |
| <b>Efficacité<br/>2/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Effizienz<br/>3/3</b>                                                                                                      |
| Action dans l'ensemble réussie avec les indicateurs de pression atteints. L'indicateur d'état n'est que partiellement atteint ce qui est finalement logique, le remplacement des espèces nitrophiles mettra du temps à se réaliser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Le coût réel dépasse le prévisionnel, mais les résultats sont validés et l'action est prioritaire.                            |
| <b>Synthèse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |
| <p>Après la coupe des noyers en 2015, le milieu n'est toujours pas stabilisé, mais les espèces de friche xérophile, de prairie mésophile et d'ourlet basophile remplacent petit à petit les espèces nitrophiles.</p> <p>Un ensoleillement accru ainsi qu'une plus grande diversité de plantes mellifères a certainement permis une augmentation de l'abondance et de la richesse spécifique en papillons de jour.</p> <p>L'action de coupe des noyers, couplée à celle du recépage de la haie, a contribué à l'évolution de la zone en un habitat de « milieu ouvert », en témoigne le cortège de rhopalocères présent.</p> <p>Poursuivre cette gestion semble être la meilleure solution, mais avec une révision de l'objectif. La création d'une pelouse au niveau de la pente pourrait cependant être envisagée.</p> |                                                                                                                               |


| <b>TU 3</b>                                                                                                     | <b>RESTAURER DES ZONES DE SOLS NUS PAR DECAPAGE (ACTION ANNULÉE)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJECTIFS DE L'OPERATION, RESULTATS ATTENDUS ET MODE OPERATOIRE</b>                                          |                                                                      |
| <u>Objectif</u> : Favoriser le développement d'espèces plus oligotrophes et à plus fort intérêt patrimonial.    |                                                                      |
| <u>Description de l'opération</u> : Raclage du sol (mécanique ou manuel) et évacuation des résidus de décapage. |                                                                      |
| <b>Localisation</b>                                                                                             |                                                                      |



Carte 3 : Restauration des zones de sols nus par décapage

| Périodes d'intervention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         | Surface (m <sup>2</sup> ) |            |      | Réalisation |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------------|------------|------|-------------|------|------|------|
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2017 | 2018    | 2016                      | 2017       | 2018 | 2016        | 2017 | 2018 |      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -    | Annulée | Prévue                    | -          | 212  | -           | -    | 0 %  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         | Réalisée                  | -          | 0    | -           | -    |      |      |
| Opérateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |                           |            |      |             |      |      |      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |                           |            |      |             |      |      |      |
| Synthèse budgétaire de l'opération (2016 - 2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |                           |            |      |             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2016 | 2017    | 2018                      |            |      |             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         | CEN                       | Prestation |      |             |      |      |      |
| Budget prévisionnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -    | -       | 1 800 €                   | 3 000 €    |      |             |      |      |      |
| Budget réel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -    | -       | 1 800 €                   | 0 €        |      |             |      |      |      |
| Commentaire sur la mise en œuvre et les résultats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |                           |            |      |             |      |      |      |
| L'opération d'étrépage (TU 3) a été annulée. En effet, la station à Ortie dioïque ne s'étend pas depuis 2016, notamment grâce au débroussaillage effectué sur le coteau tous les ans. Il n'y a pas de risque avéré d'expansion au détriment des habitats plus fonctionnels et patrimoniaux. Par ailleurs, cette végétation à Ortie est favorable à certains invertébrés pour certaines plantes-hôtes et plantes nectarifères. |      |         |                           |            |      |             |      |      |      |
| Indicateurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |                           |            |      |             |      |      |      |
| Indicateurs de pression (IP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |                           |            |      |             |      |      |      |
| IP4 : Diminution des interventions dans l'opération TE 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |                           |            |      |             | -    |      |      |
| Indicateurs d'état (IE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |                           |            |      |             | 2016 | 2017 | 2018 |
| IE4 : Limitation, voire régression du cortège d'ourlets eutrophes (et donc de la végétation à Ortie dioïque), au profit des communautés d'ourlets basophiles ou de pelouses calcaires                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |                           |            |      |             |      |      |      |
| IE5 : Apparition d'espèces annuelles pionnières inféodées aux dalles calcaires nues (ex : <i>Thymus sp.</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |                           |            |      |             |      |      |      |
| Taux de réalisation : 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |                           |            |      |             |      |      |      |

La surface de la station à Ortie dioïque est stabilisée, elle ne s'étend plus. En revanche le suivi phytosociologique de cette zone (2015-2018) montre une densification en Ortie dioïque qui fait évoluer de plus en plus la végétation vers un ourlet nitrophile.



**Figure 14. Suivi phytosociologique de la zone concernée**

Il n'y a aucune chance de voir apparaître une végétation de dalle calcaire (indicateur IE 5) sur cette zone eutrophe et en présence de sol.

| Formulation<br>2/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pertinence<br>3/3                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un indicateur d'état relatif à la surface de la zone rudérale eut été pertinent.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>L'action était peu pertinente si l'on veut augmenter le nombre d'habitats (quels qu'ils soient) sur la RNR, mais il ne s'agissait pas des objectifs du plan de gestion.</p> <p>L'action répondait à l'objectif opérationnel d'extension des zones calcicoles et de la mosaïque d'habitats calcicoles.</p> |
| Efficacité<br>1/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Efficiéce<br>1/3                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Indépendamment de la réalisation ou non de l'opération, les indicateurs d'état sont négatifs, même si l'indicateur IE 5 était, au-delà d'ambitieux, non réalisable au regard du contexte pédologique.</p> <p>En revanche l'opération a tout de même été annulée du fait de la stabilité de la station en termes de surface.</p>                                    | Action initialement considérée prioritaire non réalisée avec tout de même une dépense effectuée par le CEN (temps salarié).                                                                                                                                                                                  |
| Synthèse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>L'action était pertinente pour répondre à l'objectif opérationnel relatif à la mosaïque d'habitats calcicoles.</p> <p>En outre, avoir décidé de ne pas effectuer l'action afin de maintenir l'ourlet nitrophile est un raisonnement recevable dans la mesure où la station rudérale est stabilisée et qu'elle offre un habitat intéressant pour l'entomofaune.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## TE 1

## ENTREtenir LES ZONES RESTAURÉES


### OBJECTIFS DE L'OPERATION, RESULTATS ATTENDUS ET MODE OPERATOIRE

**Objectif :** Limiter la reprise des ligneux et favoriser une végétation de type *Mesobromion*.

**Description de l'opération :** Pâturage ovin accompagné d'un débroussaillage avec exportation, au moins deux fois par an.

En complément de ces opérations, le Conservatoire propose une coupe des rejets de ligneux avant et/ou après le pâturage pendant les premières années qui suivent l'action d'ouverture du milieu (TU 1).

### Localisation



**Carte 4 : Localisation, phasage et superficie de l'action TU1 et TE 1**

|                                         |          | 2016 | 2017                 | 2018                                | 2019                | 2020                | 2021                |
|-----------------------------------------|----------|------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Périodes d'intervention</b>          |          | -    | Août et sept.        | 1 <sup>er</sup> août et 3 septembre | Septembre           | 09 novembre         | 07 décembre         |
| <b>Surface</b>                          | prévue   | -    | 1 023 m <sup>2</sup> | 1 150 m <sup>2</sup>                | 1150 m <sup>2</sup> | 1150 m <sup>2</sup> | 1150 m <sup>2</sup> |
|                                         | réalisée | -    | 1 023 m <sup>2</sup> | 1 150 m <sup>2</sup>                | 1150 m <sup>2</sup> | 1150 m <sup>2</sup> | 1150 m <sup>2</sup> |
| <b>Réalisation</b>                      |          |      | 100 %                | 100 %                               | 100 %               | 100 %               | 100 %               |
| <b>Opérateur</b>                        |          |      |                      |                                     |                     |                     |                     |
| AISP (2016-2020), MFR les forges (2021) |          |      |                      |                                     |                     |                     |                     |

| Synthèse budgétaire de l'opération |            |      |         |          |       |          |        |
|------------------------------------|------------|------|---------|----------|-------|----------|--------|
|                                    |            | 2016 | 2017    | 2018     | 2019  | 2020     | 2021   |
| Budget prévisionnel                | CEN        | -    | 1 600 € | 675 €    | 940 € | 940 €    | 940 €  |
|                                    | Prestation | -    | 615 €   | 615 €    | 650 € | 650 €    | 650 €  |
| Budget réel                        | CEN        | -    | 1 600 € | 675 €    | 940 € | 1 000 €  | 1000 € |
|                                    | Prestation | -    | 475 €   | 630,50 € | 792 € | 649,50 € | -      |

### Commentaire sur la mise en œuvre et les résultats



Le pâturage et le débroussaillage permettent de limiter les rejets des ligneux. Cette opération a été modifiée dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours. Elle est réalisée trois fois par an, et en partie internalisée (usage d'une débroussailleuse forestière). Il est précisé que l'entreprise chargée du débroussaillage est également en charge de l'export de la matière. Ajout d'une coupe annuelle à partir de 2018 pour renforcer l'action. En complément du débroussaillage, un pâturage est mis en place. A terme, ce pâturage pourra se substituer complètement au débroussaillage.

| Indicateurs                                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicateurs de pression (IP)                                                                                                | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| IP5 : Limitation durable des rejets sur au moins 70% de la surface restaurée                                                | -    |      |      |      |      |      |
| Indicateurs d'état (IE)                                                                                                     | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| IE6 : Au moins 50% de la surface traitée en <i>Mesobromion erecti</i> ou végétation approchante en 2021                     |      |      |      |      |      |      |
| IE7 : Apparition de nouvelles stations d'Orchidées, Origan ou encore de plantes patrimoniales comme le Grémil bleu-pourpre. |      |      |      |      |      |      |
| Taux de réalisation : 100%                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |



Figure 15. Zone concernée par TE 1, avant débroussaillage (septembre 2021)

## **Indicateurs**

### **➤ IP5 : Limitation durable des rejets sur au moins 70% de la surface restaurée**

L'indicateur de pression IP5 est évalué par la réalisation de l'opération TE1. En 2017, les brebis de M. Fleurance ont pâturé la zone et un débroussaillage a été mis en place. Les années suivantes, le pâturage n'a pas été systématique malgré les préconisations, cependant le débroussaillage a toujours pu s'effectuer. En complément du débroussaillage, une coupe des rejets chaque année depuis 2018 a permis un meilleur contrôle et ainsi de répondre à l'objectif. Cependant, le maintien de quelques ormes de haut jet au milieu de la parcelle favorise vraisemblablement la vitesse d'embroussaillage de la zone ainsi que l'eutrophisation. L'option d'éliminer ces semenciers permettrait de répondre complètement à l'objectif qui est une limitation durable des rejets.

### **IE6 : Au moins 50% de la surface traitée en *Mesobromion erecti* ou végétation approchante en 2021**

L'indicateur d'état IE6 est évalué par les suivis phytosociologiques SE1 et particulièrement par les suivis réalisés sur la placette n° 6. Les résultats de ces suivis ont déjà été détaillés à la suite de la fiche opération TU1 (cf. page 19). L'opération date d'il y a 5 ans et pour le moment l'objectif n'est pas atteint, cependant cela ne signifie pas que la gestion est inappropriée, car il faut du temps et des interventions répétées avant de pouvoir observer les effets de la gestion sur le milieu. Le sol marneux et relativement profond, ainsi que la présence résiduelle de grands ligneux, peut expliquer en partie la difficulté d'une végétation de type *Mesobromion erecti* à s'implanter.


### **➤ IE7 : Apparition de nouvelles stations d'Orchidées, Origan ou encore de plantes patrimoniales comme le Grémil bleu-pourpre**

L'indicateur d'état IE7 est évalué par le suivi SE3 (compléter voire accroître les connaissances sur les populations d'Azuré du Serpolet). Ce suivi repose sur 4 protocoles et l'indicateur IE7 est concerné par le protocole 3 qui consiste à cibler les stations favorables au développement larvaire de l'Azuré du Serpolet, c'est-à-dire les zones à Origan commun (*Origanum vulgare*), la plante hôte de ce papillon. En 2016, une estimation de l'abondance de la plante, sur le site, a été mise en place en se basant sur l'échelle d'abondance-dominance de Braun-Blanquet, telle que :

- 14. + : Individus rares (ou très rares) - Recouvrement très faible ;
- 15. 1 : Individus assez abondants - Recouvrement faible ;
- 16. 2 : Individus très abondants - Recouvrement au moins 1/20 ;
- 17. 3 : Nombre d'individus quelconque - Recouvrement 1/4 à 1/2 ;
- 18. 4 : Nombre d'individus quelconque - Recouvrement 1/2 à 3/4 ;
- 19. 5 : Nombre d'individus quelconque - Recouvrement > 3/4.



La carte suivante situe les différentes stations d'Origan en 2016 ainsi que les zones se situant à proximité de la zone traitée par l'action TE1.



**Carte 5 : Répartition de l'Origan commun sur le coteau de la RNR "Prairies et coteau des Caforts" en 2016. En rouge sont représentées les stations à Origan commun proches de la zone concernée par l'action TE 1**

En 2016, il n'y a pas de stations à Origan sur les parcelles ouvertes par l'action TE1. Cependant, l'espèce est présente sur l'ensemble des parties ouvertes du site. A cette date, l'attendu est que dans les années suivantes, les deux stations à Origan (classe + et 1/2 - entourées en rouge sur la carte) situées en bordure ouest de la zone s'étendent et améliorent l'habitat de l'Azuré du Serpolet.

Dans le cadre de SE 3, il a été décidé de ne pas renouveler ce protocole en 2018. En effet, l'évolution de la répartition n'aurait pas été significative sur un pas de temps aussi court. Depuis la réouverture du milieu et jusqu'en 2021, les stations semblent restées relativement stables, sans extension apparente.

L'indicateur IE7 est également évalué par le suivi des plantes patrimoniales (SE2). Cette opération est effectuée sur la même zone que l'opération TU1. Le résultat du suivi SE2 pour cet indicateur est donc le même que celui décrit dans la fiche TU1 pour l'indicateur IE2. Il n'y a pas de nouvelles espèces patrimoniales sur cette zone mis à part le Grémil bleu-pourpre sur la parcelle 716 (au nord-ouest de la Réserve) depuis 2017. Le sol est relativement profond sur cette zone et cette dernière a été enrichie par l'apport d'une litière forestière jusqu'en 2016. Il est donc logique de ne pas avoir de résultats probants sur un pas de temps de 5 ans. Il sera intéressant de suivre l'évolution de la végétation dans les prochaines années afin de voir si d'autres espèces patrimoniales apparaissent sur cette zone.

Pour les Orchidées, des observations sont réalisées tous les ans notamment dans le cadre des suivis phytosociologiques (SE1).

**Tableau II : Nombre d'Orchidées observées sur la RNR entre 2016 et 2021**

| NOM SCIENTIFIQUE               | NOM VERNACULAIRE | INDICES ABONDANCE-DOMINANCE (PLACETTE N°6) |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                |                  | 2016                                       | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| <i>Orchis simia</i>            | Orchis singe     | +                                          |      |      | 1    | +    | +    |
| <i>Himantoglossum hircinum</i> | Orchis bouc      | +                                          | +    |      |      |      |      |

Deux espèces d'Orchidées ont été observées et comptées sur la zone concernée par l'opération TE1 : l'Orchis singe (*Orchis simia*) et l'Orchis bouc (*Himantoglossum hircinum*). En 2015, ces deux espèces avaient déjà été observées, elles ne sont donc pas apparues suite aux travaux.

L'Orchis bouc est l'une des Orchidées les plus fréquentes en Sarthe, elle est largement présente dans tous les secteurs calcaires et sur les habitats de type pelouses (bermes des routes et talus), prairies maigres ou encore les friches. Il s'agit donc d'une espèce assez peu exigeante en termes d'habitat (Hunault & Moret, 2009). Elle a été observée en 2016 et en 2017 sur ce secteur.

L'Orchis singe est une espèce plus exigeante, elle est surtout retrouvée sur les secteurs calcaires du Jurassique et tuffeau turonien et elle est absente de la zone armoricaine. On la retrouve surtout sur les habitats de types pelouses (bermes des routes et talus) (Hunault & Moret, 2009). Elle a été observée en 2016, 2019 et 2020 sur le secteur concerné par l'action. Cette espèce étant plutôt exigeante en termes d'habitat, il serait intéressant de continuer de suivre son évolution afin d'évaluer l'impact de la gestion et des travaux, sur une échelle de temps plus large. Elle est relativement abondante sur les secteurs plus à l'Est de la Réserve, comme par exemple devant la porte principale de la cavité.




Figure 16. Orchis singe à l'entrée de la cavité (avril 2020)

| Formulation<br>1/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pertinence<br>3/3                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les indicateurs d'état auraient dû être plus en adéquation avec ceux proposés pour l'action TU 1 relative à l'ouverture de cette zone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cette action permet de répondre à l'objectif opérationnel de maintenir et développer les habitats calcicoles. |
| Efficacité<br>2/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Efficienne<br>3/3                                                                                             |
| Les rejets ligneux sont contrôlés et limités de manière durable grâce à cette action.<br><br>En revanche, l'objectif de 50% de la surface en <i>Mesobromion erecti</i> est loin d'être atteint. Cet objectif était trop ambitieux au regard du type de sol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Action efficiente, réalisée dans le budget alloué et avec des résultats satisfaisants.                        |
| Synthèse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |
| Le sol relativement profond, l'enrichissement historique dû à la présence des ligneux et la présence résiduelle d'ormes n'a pas permis d'atteindre les objectifs fixés par les indicateurs d'état, à savoir l'apparition de stations de plantes patrimoniales/origan/orchidées (sauf Orchis singe) et le développement sur plus de 50% de la surface d'une végétation du <i>Mesobromion erecti</i> . En outre, il n'y a désormais plus de nouveau rejet ligneux sur cette zone et la végétation présente offre un habitat potentiellement intéressant pour l'entomofaune. La végétation de friche devrait permettre à l'origan de se développer. |                                                                                                               |



## TE 2


## FAUCHER TARDIVEMENT AVEC EXPORTATION LE COTEAU CALCAIRE

### OBJECTIFS DE L'OPERATION, RESULTATS ATTENDUS ET MODE OPERATOIRE

Objectif : Eviter l'embroussaillage des milieux ouverts du coteau calcaire.

Description de l'opération : Fauche mécanique à l'aide d'une broyeuse-ensileuse.

### Localisation



Carte 6 : Fauche tardive avec exportation du coteau calcaire

|                         |          | 2016                | 2017                | 2018                        | 2019               | 2020                     | 2021               |
|-------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Périodes d'intervention |          | 15 sept             | 14 août             | 28 août                     | 5 septembre        | 16 décembre              | 07 décembre        |
| Surface                 | prévue   | 1700m <sup>2</sup>  | 1700m <sup>2</sup>  | 1700m <sup>2</sup>          | 1700m <sup>2</sup> | 1700m <sup>2</sup>       | 1700m <sup>2</sup> |
|                         | réalisée | 1700m <sup>2</sup>  | 1700m <sup>2</sup>  | 1700m <sup>2</sup>          | 1700m <sup>2</sup> | 1700m <sup>2</sup>       | 1700m <sup>2</sup> |
| Réalisation             |          | 100%                | 100%                | 75%                         | 50%                | 75%                      | 100 %              |
| Opérateurs              |          |                     |                     |                             |                    |                          |                    |
| Année                   |          | 2016                | 2017                | 2018                        | 2019               | 2020                     | 2021               |
| Opérateur               |          | AUBEL Environnement | AUBEL Environnement | Chantier d'insertion (AISP) | CEN                | AISP - MFR Ferté-Bernard | MFR                |

| Synthèse budgétaire de l'opération |            |       |       |         |       |         |        |
|------------------------------------|------------|-------|-------|---------|-------|---------|--------|
|                                    |            | 2016  | 2017  | 2018    | 2019  | 2020    | 2021   |
| Budget prévisionnel                | CEN        | 800 € | 800 € | 675 €   | 940 € | 940 €   | 940 €  |
|                                    | Prestation | 700 € | 700 € | 700 €   | -     | -       | -      |
| Budget réel                        | CEN        | 800 € | 800 € | 675 €   | 940 € | 1 000 € | 1000 € |
|                                    | Prestation | 600 € | 840 € | 620,80€ | -     | -       | -      |

| Commentaire sur la mise en œuvre et les résultats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Différents opérateurs se sont succédés pour la réalisation de cette action. La fauche a été effectuée chaque année sur toute la surface prévue. L'achat en interne d'une tondeuse-débroussailleuse forestière permet au CEN de s'affranchir des coûts de prestation depuis 2019.<br>La biomasse est évacuée en 2016 et 2017. En 2018, 2020 et 2021, l'évacuation est partiellement réalisée puisque la biomasse est stockée hors du coteau, mais toujours sur la RNR (sous les noyers au sud-est, ainsi qu'au niveau de l'entrée Est de la cavité). En 2019 la biomasse n'est pas évacuée, elle est exportée l'année suivante par la MFR. |      |      |      |      |      |      |
| Indicateurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
| Indicateurs de pression (IP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| IP6 : Mise en œuvre annuelle de la fauche mécanique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| IP7 : Evacuation de la biomasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |      |
| Indicateurs d'état (IE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| IE8 a : Maintien des habitats de pelouses calcaires semi-aride (du <i>Blackstonia perfoliata</i> - <i>Caricetum flacca</i> ), pelouse à Origan ( <i>Centaureo nemoralis</i> - <i>Origanetum vulgaris</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| IE8 b : Maintien des habitats d'ourlet mésophile à Aigremoine et Knautie des champs (du <i>Agrimonia eupatoria</i> - <i>Knautia arvensis</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |      |      |      |      |
| IE9 : Evolution de l'ourlet à Ortie dioïque et Gaillet croisettes vers l'ourlet mésophile à Aigremoine et Knautie des champs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| Taux de réalisation : 75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |

## Indicateurs

### ➤ IP6 : Passage annuel de la fauche mécanique / IP7 : Evacuation de la biomasse


Les indicateurs de pression IP6 et IP7 sont évalués par la réalisation de l'opération TE2. La fauche annuelle (IP6) est effectuée avec succès chaque année. En revanche l'évacuation de la biomasse (IP7) n'est pas réalisée en 2019. Par ailleurs, en 2018, 2020 et 2021, la biomasse est évacuée de l'habitat concerné, mais pas de la RNR. Elle est ainsi stockée sous les noyers au sud-est, ainsi qu'au niveau de l'entrée Est de la cavité. Pour ce second indicateur, l'objectif est donc partiellement atteint. Il est important de repréciser l'objectif à partir de 2022 avec la réécriture du plan de gestion ; un export de la biomasse hors de la RNR est à préconiser, de même qu'un export de la biomasse actuellement stockée.



Figure 17. Biomasse stockée à l'entrée Est (septembre 2021)

- **IE8a : Maintien des habitats de pelouses calcaires semi-arides (du *Blackstonia perfoliatae* - *Caricetum flacca*), pelouse à Origan (*Centaureo nemoralis* - *Origanetum vulgaris*) / IE8b : Maintien des habitats d'ourlet mésophile à Aigremoine et Knautie des champs (du *Agrimonia eupatoria* - *Knautia arvensis*)**

Les indicateurs d'état IE8a et IE8b sont évalués par les suivis phytosociologiques (SE1) et plus particulièrement par le suivi de la placette n°2, car celle-ci est placée sur la zone concernée par l'opération TE 2.



**Graphique 3 : Résultats des suivis phytosociologiques de 2010 à 2021 sur la placette n° 2**

La placette n°2 est située sur la partie est du coteau calcaire, sur un replat calcaire, entre le pied de la falaise et un fourré arbustif. Elle semble rattachable au syntaxon *Centaureo nemoralis* - *Origanetum vulgaris*, une association d'ourlets calcaires dérivant des pelouses ouvertes et qui est sous l'influence d'un boisement proche. L'évolution de cet habitat reflète la dynamique de végétation qui affecte la placette n°2. Malgré la fauche annuelle pratiquée sur cette partie du coteau, le bosquet situé à quelques mètres impacte le cortège végétal : sa dynamique d'expansion favorise le développement d'une végétation d'ourlet ou de prairie mésophile au détriment d'une végétation plus typique des pelouses calcaires. De plus, le milieu étant plus frais et plus ombragé (car situé en pied de falaise), il restera plus eutrophe et sera donc favorable à des espèces plus nitrophiles et propice à ce phénomène d'ourléification.

Pour IE8a, l'objectif de conservation n'est donc pas entièrement atteint, mais un ourlet calcaire à origan du type *Centaureo nemoralis* – *Origanetum vulgaris* est bien présent et compte tenu du contexte, cet habitat n'évoluera pas vers un stade de pelouse. Pour IE8b, l'objectif est atteint avec le maintien d'une végétation prairiale et d'ourlet mésophile.

L'objectif de gestion pour le prochain plan de gestion semble à revoir afin de viser uniquement le maintien de l'ourlet calcaire actuel, également intéressant en termes d'habitat. Il est important de poursuivre la gestion afin d'éviter que le phénomène d'ourléification ne prenne de l'ampleur et ne fasse disparaître totalement la communauté de pelouses calcaires. Il est également important de suivre l'évolution de cet habitat en continuant les suivis phytosociologiques.

➤ **IE9 : Evolution de l'ourlet à Ortie dioïque et Gaillet croisettes vers l'ourlet mésophile à Aigremoine et Knautie des champs**

L'indicateur d'état IE9 est évalué par les suivis phytosociologiques (SE1) est plus particulièrement par la placette n°7 (anc. 8). Les résultats de ces suivis ont déjà été détaillés à la suite de la fiche opération TU2 (cf. page 22).

En résumé, il en ressort que l'évolution du bas de coteau (placette n°7) vers un ourlet mésophile est peu probable au regard des conditions abiotiques et de la végétation actuelle. L'objectif fixé par l'indicateur n'est donc pas atteint, cependant il est à revoir et a vraisemblablement été mal choisi lors de la réalisation du plan de gestion.

| <b>Formulation<br/>2/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Pertinence<br/>3/3</b>                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il aurait été important de préciser que la biomasse doit être exportée hors de la RNR pour l'indicateur IP7.<br>Les indicateurs IE8a et IE9 ont été mal choisis. Ces objectifs d'atteinte d'habitat ne sont pas réalistes au regard des conditions abiotiques et de la végétation actuelle.                                                                | L'action est pertinente pour le maintien ouvert du coteau calcaire.                                                      |
| <b>Efficacité<br/>2/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Efficience<br/>3/3</b>                                                                                                |
| Si l'on s'en tient aux indicateurs de résultat, les résultats obtenus sont mitigés. Cependant ces indicateurs ont été mal définis au départ et n'étaient pas réalisables.<br>Il est donc considéré que l'action a été efficace, même si un effort est à réaliser sur l'export de la biomasse hors RNR.                                                     | L'efficience est élevée, en particulier depuis 2019 où le CEN se passe d'un budget prestation en internalisant l'action. |
| <b>Synthèse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
| L'action est importante à maintenir tant que le pâturage ne suffira pas à maintenir le coteau ouvert. Les indicateurs de résultat concernant les cortèges de végétation seront cependant à revoir afin de gagner en cohérence. Par ailleurs, la biomasse doit être exportée hors de la RNR, la solution actuelle de stockage sur site n'étant pas pérenne. |                                                                                                                          |



## TE 5

## FAIRE PÂTURER TARDIVEMENT ET DE MANIÈRE EXTENSIVE LE COTEAU CALCAIRE

### OBJECTIFS DE L'OPERATION, RESULTATS ATTENDUS ET MODE OPERATOIRE

**Objectif :** Réduire le développement des rejets de Prunelier, Aubépine monogyne...etc.

**Description de l'opération :** Faire pâturer un troupeau d'ovins sur tout le coteau, après la fauche.

L'opération est mise en œuvre dans le cadre d'un partenariat entre le Conservatoire et un agriculteur possédant des ovins (cf. opération AD3 page 82).



### Localisation



Carte 7 – Zone d'intervention pour l'action de pâturage du coteau TE 5

|                                                                                            |          | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Périodes d'intervention</b>                                                             |          | Recherche          | Mi-septembre       | -                  | -                  | Du 18/06 au 18/08  | 07/11 au 19/11     |
| <b>Surface</b>                                                                             | prévue   | 4100m <sup>2</sup> | 4100m <sup>2</sup> | 4100m <sup>2</sup> | 4100m <sup>2</sup> | 4100m <sup>2</sup> | 4100m <sup>2</sup> |
|                                                                                            | réalisée | -                  | 4100m <sup>2</sup> | -                  | -                  | 4100m <sup>2</sup> | 4100m <sup>2</sup> |
| <b>Type de pâturage</b>                                                                    |          | -                  | 11 brebis          | -                  | -                  | 11 brebis          | 3 chevaux          |
| <b>Réalisation</b>                                                                         |          | 0%                 | 100%               | 0 %                | 0 %                | 100%               | 50%                |
| <b>Opérateurs</b>                                                                          |          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nicolas Fleurance (agriculteur GAEC des Deux-Eves) en 2017 et 2020 – Marie Thuleau en 2021 |          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

### Synthèse budgétaire de l'opération

|                     |            | 2016   | 2017   | 2018   | 2019  | 2020  | 2021  |
|---------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| Budget prévisionnel | CEN        | 1600 € | 1600 € | 1600 € | 705 € | 705 € | 705 € |
|                     | Prestation | -      | -      | -      | -     | -     | -     |
| Budget réel         | CEN        | 1600 € | 1600 € | 900 €  | 705 € | 750 € | 705 € |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prestation | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Commentaire sur la mise en œuvre et les résultats</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |      |      |      |      |      |      |
| En 2016, le Conservatoire a recherché un nouveau partenaire pour la mise en œuvre du pâturage ovin sur le site. En 2017 et 2020, Nicolas Fleurance, éleveur de brebis laitières (en agriculture biologique) a mis à l'herbe ses brebis sur le site dans le cadre d'un prêt à usage. Deux années consécutives (2018-2019), le pâturage n'a pas été effectué. En 2021 un pâturage équin a été mis en place pendant 2 semaines, en novembre. |            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Indicateurs</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Indicateurs de pression (IP)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| <b>IP12</b> : Respect des périodes de pâturage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |      |      |      |      |      |      |
| <b>IP13</b> : Respect du chargement (0,2-0,3 UGB/ha/an)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |      |      |      |      |      |      |
| <b>IP14</b> : Mise en place du pâturage tous les ans, obligatoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Indicateurs d'état (IE)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| <b>IE12</b> : Réduction du développement des rejets de Prunelier, Aubépine monogyne, ...etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |      |      |      |      |      |      |
| <b>Taux de réalisation : 37,5%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |      |      |      |      |      |      |

## Indicateurs

### ➤ **IP12 : Respect des périodes de pâturage / IP13 : Respect du chargement / IP14 : Mise en place du pâturage tous les ans**

Les indicateurs de pression IP12, IP13 et IP14 sont évalués par la réalisation de l'opération TE5. L'ancien agriculteur partenaire ayant cessé son activité, il a fallu chercher un nouveau partenaire pour le pâturage. En 2016, le CEN a effectué des recherches, mais n'a pas trouvé de nouvel agriculteur ; le pâturage n'a pas pu être mis en œuvre. Les objectifs en termes de mise en œuvre du pâturage n'ont donc pas été atteints. En 2017, un nouvel agriculteur/éleveur (N. Fleurance) a été identifié et le pâturage a pu être mis en œuvre (11 brebis de réforme de race Basco béarnaise). Les brebis sont restées durant un mois en 2017 et le chargement a été respecté puisqu'il n'a pas dépassé 0,3 UGB/Ha/an. Les objectifs des indicateurs IP13 et IP14 ont donc été atteints en 2017.

En 2018 et 2019, l'action de pâturage n'a pas pu être réalisée en raison d'un retard de mise à l'herbe de l'éleveur au printemps, et due à la sécheresse à partir de mi-juin qui a rendu la végétation du coteau beaucoup moins appétente. L'objectif de l'indicateur IP14 relatif à la mise en pâturage n'a donc pas été atteint, et *de facto* IP12 et IP13 également.

En 2020 le pâturage a été mis en place pendant 2 mois au cours de l'été, période favorable pour parvenir aux objectifs fixés de réduction des rejets de ligneux. 11 brebis sont présentes, générant un chargement de 0,37 UGB/ha/an, soit un taux supérieur au seuil fixé par IP13. Aucun effet négatif ou signe de surpâturage n'a cependant été remarqué.

Concernant l'indicateur IP 12, la durée de pâturage varie en fonction de la date de mise à l'herbe des animaux et de l'objectif du pâturage. Par exemple un pâturage de printemps a pour objectif de gérer les Poacées, un pâturage d'été permet de lutter contre la repousse des ligneux et un pâturage d'automne correspond à un pâturage d'entretien. Sur la RNR, l'idéal est un pâturage d'été afin de lutter au mieux contre la repousse des ligneux coupés en 2016 et 2017. Cependant, le cycle de développement des espèces d'intérêt, tel que l'Azuré du serpolet, est à prendre en compte. La période de pâturage dépend donc de plusieurs facteurs et se définit chaque année en fonction de la mise à l'herbe des animaux. En 2017, les animaux ont pâturé tout le mois de septembre comme cela avait été décidé au préalable, et l'objectif concernant IP 12 est atteint pour cette année. En 2020, le pâturage devient estival afin de répondre à l'objectif de réduction du développement des ligneux.

En 2021, l'éleveur Nicolas Fleurance ne souhaite plus mettre son troupeau sur le coteau, par manque d'appétence et de surface. Cependant 3 chevaux de Mme Thuleau (particulier) ont pu pâturer le site en novembre. A ce jour il est difficile d'évaluer l'effet de ce nouveau type de pâturage sur les végétations, au regard du manque de recul et du couplage avec l'action de fauche.

➤ **IE12 : Réduction du développement des rejets de Prunelier, Aubépine monogyne...etc.**

L'indicateur d'état IE12 est évalué par le suivi phytosociologique et plus particulièrement par les résultats de la placette n°6.

**Tableau III : Indices d'abondance-dominance pour la placette n°6 du suivi SE 1 entre 2016 et 2021**

| NOM SCIENTIFIQUE          | NOM VERNACULAIRE  | INDICES ABONDANCE-DOMINANCE (PLACETTE N°6) |      |      |      |      |      |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                           |                   | 2016                                       | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| <i>Prunus spinosa</i>     | Prunelier         | 1                                          |      |      | +    | -    | +    |
| <i>Crataegus monogyna</i> | Aubépine monogyne |                                            |      |      |      |      |      |
| <i>Euonymus europaeus</i> | Fusain            | 2                                          |      |      |      |      |      |
| <i>Ulmus minor</i>        | Orme champêtre    | 2                                          | 4    | 5    | 1    | 1    | 1    |


Les résultats des suivis phytosociologiques au niveau de la placette n°6 indiquent une réduction du développement des principales espèces de fourrés, telles que le Prunelier, l'Aubépine monogyne ainsi que le Fusain. Concernant l'Orme champêtre, une augmentation du nombre de rejets a lieu entre 2016 et 2018. Depuis 2019, leur indice d'abondance-dominance a drastiquement diminué, passant de 5 à 1. L'action de pâturage de fin 2017 a certainement contribué à ralentir la progression des jeunes pousses en 2018, suivi d'une fauche fin 2018 et d'actions de pâturage à partir de 2019 pour éviter la reprise. L'objectif de l'indicateur d'état IE 12 est donc atteint à partir de 2019.

| <b>Formulation<br/>3/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Pertinence<br/>3/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L'opération est utile pour l'atteinte des objectifs opérationnels et à long terme. Elle prime par rapport à la fauche, la coupe plus hétérogène favorisant la végétation et l'entomofaune.                                                                                                                         |
| <b>Efficacité<br/>1/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Efficiencia<br/>2/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Les repousses de petits ligneux sont maîtrisées et réduites grâce à l'action TE1. L'action de pâturage TE5 a pu contribuer uniquement en 2020 lors du pâturage estival. Le maintien ouvert est assuré.</p> <p>En revanche le pâturage n'a pu être mis en place que 3 années sur 6, ce qui est insuffisant. Les années de mise en œuvre, les indicateurs de pression ne sont pas toujours atteints.</p>                                                                                                                                                   | <p>Action plus ou moins efficiente. Le budget CEN annuel pour l'action est prévu pour un suivi et accompagnement de l'éleveur.</p> <p>Il était en revanche trop faible pour les années où il a été utilisé pour la recherche d'un nouveau partenaire/éleveur.</p> <p>Les résultats sont partiellement validés.</p> |
| <b>Synthèse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>L'action est pertinente pour répondre aux objectifs fixés, cependant elle peine à être mise en œuvre chaque année, principalement dû à la difficulté de trouver un partenariat pérenne avec un éleveur local. Le manque d'attractivité de la parcelle pour un troupeau est en cause, ainsi que le manque d'éleveurs locaux.</p> <p>Les actions de fauche et de débroussaillage (TE1 et TE2) permettent de compenser le manque d'efficacité de cette action, même si les effets sur la végétation sont différents (coupe homogène contre hétérogène).</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TE 7 ENTREtenir PAR débroussaillage MANUEL LES ZONES NON GERÉES MECANIQUEMENT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OBJECTIFS DE L'OPERATION, RESULTATS ATTENDUS ET MODE OPERATOIRE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Objectif : Maintenir le milieu ouvert, y compris là où la fauche mécanique traditionnelle ne peut être mise en œuvre (pente).

Description de l'opération : Fauche manuelle des parties pentues du coteau, à l'aide de débroussailluses.

#### Localisation



Carte 8 : Entretien par débroussaillage manuel des zones non traitées gérées mécaniquement

|                                                                                                                                     |            | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Périodes d'intervention</b>                                                                                                      |            | 6 décembre          | 14 décembre         | 19 décembre         | 10 décembre         | 16 décembre         | 7 décembre          |
| <b>Surface</b>                                                                                                                      | prévue     | 2400 m <sup>2</sup> | 2400 m <sup>2</sup> | 2400 m <sup>2</sup> | 2400 m <sup>2</sup> | 2400 m <sup>2</sup> | 2400 m <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                     | réalisée   | 2400 m <sup>2</sup> | 2400 m <sup>2</sup> | 2400 m <sup>2</sup> | 2400 m <sup>2</sup> | 2400 m <sup>2</sup> | 2400 m <sup>2</sup> |
| <b>Réalisation</b>                                                                                                                  |            | 100%                | 100%                | 100%                | 100%                | 100%                | 100%                |
| <b>Opérateur</b>                                                                                                                    |            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| MFR des Forges                                                                                                                      |            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Synthèse budgétaire de l'opération</b>                                                                                           |            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|                                                                                                                                     |            | <b>2016</b>         | <b>2017</b>         | <b>2018</b>         | <b>2019</b>         | <b>2020</b>         | <b>2021</b>         |
| Budget prévisionnel                                                                                                                 | CEN        | 800 €               | 800 €               | 450 €               | 705 €               | 705 €               | 705 €               |
|                                                                                                                                     | Prestation | 600 €               | 600 €               | 600 €               | 700 €               | 700 €               | 700 €               |
| Budget réel                                                                                                                         | CEN        | 800 €               | 800 €               | 450 €               | 705 €               | 750 €               | 750 €               |
|                                                                                                                                     | Prestation | 650 €               | 650 €               | 650 €               | 700 €               | 700 €               | 700 €               |
| <b>Commentaire sur la mise en œuvre et les résultats</b>                                                                            |            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Elle a été réalisée tous les ans par une classe de BTS GPN de la Maison familiale rurale (MFR) des Forges située à la Ferté-Bernard |            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Indicateurs</b>                                                                                                                  |            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Indicateurs de pression (IP)</b>                                                                                                 |            | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                |
| <b>IP17</b> : Respect du cahier des charges et suivi du chantier par le gestionnaire                                                |            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Indicateurs d'état (IE)</b>                                                                                                      |            | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                |
| <b>IE14</b> : Maintien des habitats pelouses semi-arides et pelouses à Origan                                                       |            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>IE15</b> : Maintien des zones favorables à <i>Phengaris arion</i> (Zones à Origan)                                               |            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Taux de réalisation : 100%</b>                                                                                                   |            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |



## Indicateurs

### ➤ **IP17 : Respect du cahier des charges et suivi du chantier par le gestionnaire**

L'indicateur de pression IP17 est évalué par la réalisation de l'opération TE7 et le contrôle du chantier par le gestionnaire. Cette opération a été réalisée avec succès (débroussaillage de la totalité de la surface prévue) durant toute la période, l'objectif est donc atteint.

### ➤ **IE14 : Maintien des habitats pelouses semi-arides et pelouses à Origan / IE15 : Maintien des zones favorables à *Phengaris arion***




Figure 18. Résultats des suivis phytosociologiques de 2010 à 2020 sur la placette n°1

L'indicateur d'état IE14 est évalué par les suivis phytosociologiques SE1 et plus particulièrement par le suivi de la placette n°1.

La placette est située sur la partie ouest du coteau calcaire. Elle correspond au syntaxon *Blackstonia perfoliatae* - *Caricetum flacca*. Cet habitat est en bon état de conservation. L'entité de pelouse calcaire qu'il constitue est le plus représenté de la RNR (même s'il est de petite taille). Cela permet une bonne expression du cortège floristique des pelouses. L'opération de débroussaillage a donc un impact positif sur la conservation de cette partie du coteau. L'objectif de gestion est par conséquent atteint en ce qui concerne cet habitat.

Pour les pelouses à Origan, les indicateurs IE14 et IE15 peuvent être évalués par le suivi SE3 (Compléter voire accroître les connaissances sur les populations d'Azuré du Serpolet (*Phengaris arion*)) (2016 et 2018). La carte ci-après indique les stations à Origan sur le coteau calcaire qui correspondent à des zones favorables à l'Azuré du Serpolet (*Phengaris arion*), espèce patrimoniale. Il est donc intéressant de suivre cette espèce ainsi que les espèces végétales qui lui sont associées.



Il y a de nombreuses zones à Origan sur la zone concernée par l'opération TE7, en 2016. L'Origan est réparti sur une grande partie du coteau à différentes classes d'abondance. En effet il y a une zone de classe +, deux zones de classe +/1, deux zones de classe 1, une zone de classe 1/2 et enfin deux zones de classe 2. Le fait de retrouver des pelouses semi-arides ainsi que des pelouses à Origan sur cette zone du coteau confirme que les objectifs de gestion sont atteints.

**Carte 9 : Répartition de l'Origan commun sur le coteau de la RNR "Prairies et coteau des Caforts" en 2016. En rouge sont représentées les stations à Origan commun proches de la zone concernée par l'action TE 7**

| <b>Formulation<br/>3/3</b>                                                                                                                       | <b>Pertinence<br/>3/3</b>                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| RAS.                                                                                                                                             | Action pertinente à maintenir en complément du pâturage.                     |
| <b>Efficacité<br/>3/3</b>                                                                                                                        | <b>Efficiace<br/>3/3</b>                                                     |
| Action efficace qui donne lieu à un maintien des habitats de pelouses et d'ourlet ainsi qu'aux stations d'origan.                                | Le coût est tout à fait cohérent par rapport aux résultats et à sa priorité. |
| <b>Synthèse</b>                                                                                                                                  |                                                                              |
| L'action a systématiquement été réalisée chaque année, avec des résultats satisfaisants. Elle est à reconduire pour le prochain plan de gestion. |                                                                              |

| <b>TE 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ENTRETIEN DES ZONES RUDERALES</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>OBJECTIFS DE L'OPERATION, RESULTATS ATTENDUS ET MODE OPERATOIRE</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |
| <b>Objectif :</b> Contenir les espèces eutrophiles, qui dans le cas présent, tendent à coloniser les habitats oligotrophes au détriment des espèces les plus patrimoniales du site.<br><b>Description de l'opération :</b> Débroussaillage manuel des zones rudérales identifiées avec exportation de la matière. |                                      |
| <b>Localisation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |



**Carte 10 : Localisation des zones de fauche - en noir les zones à clématite et en blanc les zones à Ortie**

|                              |          | 2016                                  | 2017                                           | 2018                   | 2019                                                    | 2020 | 2021 |
|------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|
| Périodes d'intervention      |          | 16 juin ; 20 juil ; 21 août ; 26 sept | 16 juin ;<br>20 juil ;<br>21 août ;<br>26 sept | 12 juil.<br>et 28 août | Action annulée lors<br>de la révision à mi-<br>parcours |      |      |
| Surface                      | prévue   | 850 m²                                | 850 m²                                         | 850 m²                 |                                                         |      |      |
|                              | réalisée | 850 m²                                | 850 m²                                         | 850 m²                 |                                                         |      |      |
| Réalisation                  |          | 100%                                  | 100%                                           | 50%                    |                                                         |      |      |
| Opérateurs                   |          |                                       |                                                |                        |                                                         |      |      |
| CEN Pays de la Loire et AISP |          |                                       |                                                |                        |                                                         |      |      |

| Synthèse budgétaire de l'opération |            |           |           |        |      |      |      |
|------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------|------|------|------|
|                                    |            | 2016      | 2017      | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| Budget prévisionnel                | CEN        | 2000 €    | 2000 €    | 2250 € | -    | -    | -    |
|                                    | Prestation | 1230 €    | 1230 €    | -      | -    | -    | -    |
| Budget réel                        | CEN        | 2000 €    | 2000 €    | 2250 € | -    | -    | -    |
|                                    | Prestation | 1219,40 € | 1249,25 € | -      | -    | -    | -    |

#### Commentaire sur la mise en œuvre et les résultats

Les orties et les clématites restent présentes sur le site. Toutefois les zones où ces deux espèces sont présentes sont de petite taille et elles ne s'étendent pas. De plus, la zone à Orties dioïque est conservée à partir de 2019. Les actions de débroussaillage et de pâturage sont donc suffisantes pour lutter contre l'expansion de ces zones. Il est donc décidé de diminuer le nombre de passages en 2018 et de mettre fin à l'opération à partir de 2019. Cette opération est à relier à l'action TU 3 relative au décapage de cette zone, action annulée pour les mêmes raisons.

Le CEN a pris en charge l'opération (sans prestation) en 2018. L'action est réalisée en même temps que TE 2.

#### Indicateurs

| Indicateurs de pression (IP)                |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|
| <b>IP18 : Respect du nombre de passages</b> |  |      |      |      |      |      |      |


| Indicateurs d'état (IE)                                                       | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| IE16 : Disparition progressive des zones d'orties (en lien avec l'action TU3) |      |      |      |      |      |      |
| IE17 : Diminution de 50% des zones de clématites                              |      |      |      |      |      |      |
| Taux de réalisation : 60%                                                     |      |      |      |      |      |      |

➤ **IP18 : Respect du nombre de passages**

L'indicateur de pression IP18 est évalué par la réalisation de l'opération TE8. Initialement, cette opération était prévue pour 5 jours/an, pour 5 passages. Le Conservatoire a finalement réduit le temps d'opération à 4 jours/an, car la surface à traiter est suffisamment petite pour être entretenue dans ce délai. L'opération de débroussaillage a été réalisée avec succès, l'objectif est donc atteint pour les années 2016 et 2017. Le but majeur de cette action est la limitation de la zone à orties. Toutefois, à partir de 2018 cette zone est conservée et l'action TE8 est donc réduite à 2 passages. L'action est finalement abandonnée au moment de la révision à mi-parcours.

➤ **IE16 : Disparition progressive des zones d'orties**

L'indicateur d'état IE16 peut être évalué par les suivis phytosociologiques SE1 et plus particulièrement par l'ancienne placette n°7 qui est située dans une zone très marquée par les orties. L'action ayant été supprimée en 2018, cet indicateur n'a plus été évalué à partir de 2019.



Graphique 4 : Résultats des suivis phytosociologiques de 2015 à 2018 sur la placette n°7 (anc.)

Elle fait l'objet d'une fauche avec ramassage intensif, afin d'appauvrir le milieu. En 2017, elle correspond à une communauté de friche mésoxérophile et mésoeutrophile du *Cirsietum eriophori*. Le passage à cette communauté de friche depuis l'ourlet nitrophile à Ortie dioïque décrit dans le plan de gestion reflète les résultats de la gestion conduite.

Tableau IV : Résultats du suivi SE 1 (ancienne placette 7) concernant l'Ortie dioïque

| NOM SCIENTIFIQUE     | NOM VERNACULAIRE | INDICES ABONDANCE-DOMINANCE 2016 - 2018 |      |      |
|----------------------|------------------|-----------------------------------------|------|------|
|                      |                  | PLACETTE 7                              |      |      |
|                      |                  | 2016                                    | 2017 | 2018 |
| <i>Urtica dioica</i> | Ortie dioïque    | 3                                       | 3    | 4    |

➤ **IE17 : Diminution de 50% des zones de Clématites**

L'indicateur IE17 est évalué par les suivis phytosociologiques (SE 1). Cet indicateur a été mal défini lors de l'écriture du précédent plan de gestion puisqu'il se base sur un objectif de diminution de 50%



de l'espèce sans en préciser s'il s'agit d'une surface, du nombre de stations, du nombre de pieds ou d'un coefficient d'abondance-dominance. Seul ce dernier paramètre a été relevé lors du dernier suivi ayant précédé le plan de gestion 2016-2021, en 2014. La Clématite des haies (*Clematis vitalba*) a été retrouvée sur le site au niveau des placettes n°1, 2, et 7 des suivis SE1. Ces placettes ont été choisies pour évaluer l'indicateur IE17. Le tableau suivant indique le taux d'abondance de la clématite par placette (Suivi SE1) entre 2016 et 2021. Il est constaté une absence de résultats probants, le recouvrement en clématites ne diminuant pas malgré l'action jusqu'en 2018. Les résultats du suivi pour les années suivantes ne montrent pas de changement significatif, preuve que l'action n'était pas efficace.

**Tableau V : Indices d'abondance-dominance pour les placettes 1, 2 et 7 concernant la Clématite des haies**

|                          | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Placette 1               |      | +    |      |      |      |      |      |
| Placette 2               | 1    | 1    | 2    | 1    |      | 1    | 1    |
| Placette 7<br>(ancienne) |      | 2    | 2    |      | NA   | NA   | NA   |

| <b>Formulation<br/>2/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Pertinence<br/>1/3</b>                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manque de précision sur les indicateurs IE16 et IE17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opération jugée non pertinente à mi-parcours du fait de la stabilité de la zone rudérale, de sa taille restreinte, et pour l'habitat qu'elle offre finalement pour l'entomofaune. |
| <b>Efficacité<br/>1/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Efficiace<br/>1/3</b>                                                                                                                                                          |
| Les indicateurs IE16 et IE17 montrent que l'action est peu efficace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Le coût de l'opération est élevé par rapport au résultat obtenu.                                                                                                                  |
| <b>Synthèse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |
| <p>La zone rudérale reste à surveiller, mais paraît aujourd'hui stabilisée. Cette zone semble être apparue notamment à cause d'un feu réalisé avant 2015, qui a enrichi le milieu. Le risque d'extension de cette zone est faible puisque les cortèges de végétation voisins sont bien implantés et les sols plus pauvres.</p> <p>Il semble pertinent de continuer à entretenir cette zone, mais à la même fréquence que le reste du coteau, dans le cadre de l'action TE2.</p> |                                                                                                                                                                                   |

## TE 11

## CONTROLLER ET ENTREtenir LE LINEAIRE DE CLOTURES

### OBJECTIFS DE L'OPERATION, RESULTATS ATTENDUS ET MODE OPERATOIRE

**Objectif :** Maintenir en bon état les clôtures


**Description de l'opération :** La gestion par pâturage des différents habitats de la RNR est dépendante en partie de la présence d'une clôture en bon état. Une partie de ce linéaire est constituée d'un réseau de fil électrique. Un entretien annuel est indispensable en pied de clôture. Sur le coteau, les piquets sont à remplacer du fait de leur état de vieillissement.



20. Entretien des clôtures de la prairie permettant de lutter contre l'envahissement de la végétation,
21. Suppression de la clôture dans le bas du coteau afin de faciliter l'opération TE 9, puis sa réinstallation.
22. Remplacement de la barrière de l'entrée
23. Remplacement de clôture endommagée

Cette action est analysée en deux temps ; dans le cadre de l'objectif opérationnel A.1, relatif au coteau, et dans le cadre de l'objectif opérationnel A.2., relatif à la zone humide.

### Localisation



#### Légende

- Périmètre du site
- Clôtures à entretenir et contrôler

0 50 100 150 200 m

Source : BD Ortho 2015  
Elaboration : L. Gaffé - CEN PDL - Juin 2018  
Logiciel : Qgis 3.0.1



Conservatoire  
d'espaces naturels  
Pays de la Loire

**Carte 11 : TE 11 – Contrôler et entretenir le linéaire de clôtures**

|                         |         | 2016                                  | 2017                          | 2018                          | 2019                                  | 2020                                  | 2021                          |
|-------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Périodes d'intervention |         | Septembre                             | Septembre                     | Septembre                     | Mai et septembre                      | Novembre                              | Avril                         |
| Linéaire                | prévu   | Pourtour de la prairie humide         | Pourtour de la prairie humide | Pourtour de la prairie humide | Pourtour de la prairie humide         | Pourtour de la prairie humide         | Pourtour de la prairie humide |
|                         | réalisé | Pourtour de la prairie humide, coteau | Pourtour de la prairie humide | Pourtour de la prairie humide | Pourtour de la prairie humide, coteau | Pourtour de la prairie humide, coteau | Pourtour de la prairie humide |
| Réalisation             |         | 100%                                  | 100%                          | 100%                          | 100%                                  | 100%                                  | 100%                          |
| Opérateur               |         |                                       |                               |                               |                                       |                                       |                               |
| CEN et l'AISP           |         |                                       |                               |                               |                                       |                                       |                               |

### Synthèse budgétaire de l'opération

|                     |            | 2016     | 2017       | 2018    | 2019       | 2020    | 2021    |
|---------------------|------------|----------|------------|---------|------------|---------|---------|
| Budget prévisionnel | CEN        | 940 €    | 940 €      | 900 €   | 940 €      | 940 €   | 1 000 € |
|                     | Prestation | 800 €    | 800 €      | 940 €   | 4 200 €    | 4 200 € | 4 200 € |
| Budget réel         | CEN        | 800 €    | 800 €      | 900 €   | 900 €      | 1 000 € | 1 000 € |
|                     | Prestation | 928,62 € | 1 016,50 € | 1 164 € | 2 351,40 € | 2 765 € | 3 600 € |



Figure 20. Linéaire de 60m restauré en 2020



Figure 19. Clôture non restaurée (nord-est de la parcelle, 2021)

| Commentaire sur la mise en œuvre et les résultats liés au coteau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Récapitulatif des actions effectuées au niveau des clôtures du coteau :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- 2016 : enlèvement de la clôture en bas de coteau (pour faciliter l'action sur la haie) puis remplacement des piquets et changement du grillage sur un linéaire de 160m.</li><li>- 2017 et 2018 : réparations ponctuelles des clôtures, au besoin.</li><li>- 2019 : changement de la barrière d'entrée du coteau</li><li>- 2020 : remplacement d'un linéaire de 60m au nord-ouest.</li></ul> |      |      |      |      |      |      |
| Indicateurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |
| Indicateurs de pression (IP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| IP23 : Remplacement d'au moins 80% de la clôture du coteau calcaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| Taux de réalisation : 75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |      |



➤ **IP23 : Remplacement d'au moins 80% de la clôture du coteau calcaire**

A l'issue des 6 ans du plan de gestion, 220m du linéaire de clôtures du coteau est remplacé, soit environ 63% du linéaire total. L'objectif de remplacement d'au moins 80% de la clôture du coteau n'est donc pas atteint. La clôture nord-est (nord de la parcelle 0044) sera à remplacer rapidement, même si elle est moins prioritaire que d'autres linéaires car donnant sur un fourré situé entre la clôture et la falaise.

➤ **IP24 : Entretien chaque année de 100% du linéaire de clôture en prairie humide (en lien avec TE6)**

Indicateur évalué dans le cadre de l'OLT B relatif à la zone humide.



| <b>Formulation*</b><br><b>2/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Pertinence*</b><br><b>3/3</b>                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il aurait pu être précisé plus explicitement que l'entretien visait notamment l'entretien de la végétation de pied de clôture.                                                                                                                                                                                                                 | Action en adéquation avec les objectifs opérationnels et à long terme puisqu'elle permet la mise en œuvre des actions de pâturage. |
| <b>Efficacité*</b><br><b>2/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Effizienz*</b><br><b>3/3</b>                                                                                                    |
| <p>Le linéaire nord-est du coteau n'a pas été changé et mériterait d'être remplacé. Les résultats restent dans l'ensemble satisfaisants, mais perfectibles.</p> <p>Pour la partie zone humide, les résultats sont satisfaisants même si des problèmes de coupe accidentelle de clôtures électriques sont apparus lors de la mise en œuvre.</p> | Les objectifs sont quasiment atteints, pour un budget réel inférieur au prévisionnel.                                              |
| <b>Synthèse*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |
| <p>Pour la partie coteau, les résultats sont globalement satisfaisants même s'il reste encore du linéaire de clôture à changer.</p> <p>Pour la partie zone humide, l'action d'entretien du pied de clôture est réalisée avec succès chaque année, et les clôtures sont en bon état.</p>                                                        |                                                                                                                                    |

\*Evaluation prenant en compte l'ensemble de l'action TE 11 (issue de l'OLT A + OLT B).




## Synthèse de l'objectif opérationnel A.1

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |            |            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Objectif opérationnel A.1     | Maintenir, restaurer et favoriser l'extension des habitats de pelouses calcicoles et d'ourlet et de prairie tout en assurant la conservation d'une mosaïque d'habitats calcicoles variés.                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                 |            |            |
| Opérations associées          | TU1, TU2, TU3, TE1, TE2, TE5, TE7, TE8, TE11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                 |            |            |
| Suivis                        | RE1, SE1, SE2, SE3, SE7, SE9 (évalués dans l'objectif opérationnel D.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 |            |            |
| Résultats                     | Extension de la surface des pelouses calcicoles d'au moins 3000m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                 |            |            |
|                               | Maintien voire augmentation des effectifs d'espèces de la flore patrimoniales                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                 |            |            |
|                               | Traitement de 80% des rejets d'Orme, Erable champêtre, Aubépine monogyne, Prunelier                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                 |            |            |
|                               | Maintien de 90% au moins des espèces et habitats (en nombre) du coteau calcaire identifiés dans le diagnostic                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                 |            |            |
|                               | Maintien voire augmentation des populations d'Azuré du Serpolet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |            |            |
| Analyse de l'objectif du plan | Diminution des surfaces occupées par les communautés rudérales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                 |            |            |
|                               | <b>Analyse au regard des enjeux du plan de gestion en cours</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | <b>Analyse au regard des objectifs et actions mis en place dans le plan de gestion en cours</b> |            |            |
|                               | Formulation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pertinence | Résultats                                                                                       | Efficacité | Efficience |
|                               | 3/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2/3        | 2/3                                                                                             | 2/3        | 3/3        |
|                               | <b>Synthèse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |            |            |
|                               | L'objectif opérationnel A.1 porte sur la gestion du coteau calcaire. La majorité des indicateurs est validée.                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                 |            |            |
|                               | L'objectif d'extension de la surface de pelouse calcicole n'est en aucun cas atteint : une réouverture d'habitat s'est opérée sans pour autant gagner en pelouse, la partie concernée étant plutôt dotée d'une végétation d'ourlet forestier. Cet indicateur était cependant trop ambitieux et peu réaliste. C'est donc plus le choix de l'indicateur que le résultat qui est à blâmer. |            |                                                                                                 |            |            |
|                               | Concernant la diminution de la surface de la zone rudérale, l'indicateur était pertinent au moment de la rédaction, mais un changement d'objectif s'est opéré au moment de la révision à mi-parcours : au regard de l'évolution stable de l'habitat, il a été décidé de le maintenir (enjeu entomofaune) et d'arrêter l'action dédiée.                                                  |            |                                                                                                 |            |            |

## Objectif opérationnel A.2 – Conserver et entretenir la diversité des milieux humides

| TE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FAUCHER TARDIVEMENT AVEC EXPORTATION LA PRAIRIE HUMIDE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| OBJECTIFS DE L'OPERATION, RESULTATS ATTENDUS ET MODE OPERATOIRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
| <p><u>Objectif</u> : La mise en place de zones de défens chaque année permet de diminuer l'impact de la fauche sur la faune présente dans les prairies de la Réserve.</p> <p><u>Description de l'opération</u> : Fauche mécanique (tracteur muni d'une faucheuse et bottelage de l'herbe fauchée). Les prairies ne sont pas toutes fauchées en même temps, une rotation et des zones en défens sont mises en place comme l'illustrent les cartes ci-après.</p> |                                                        |
| Localisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |



**Figure 21. Localisation de l'action TE 3.**

*NB : les secteurs 2,3 et 4 sont acquis en 2017, pour un début de gestion en 2018.*

|                                                                                        |          | 2016                 | 2017                 | 2018                       | 2019                                                | 2020                                                | 2021                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Périodes d'intervention</b>                                                         |          | 30 août              | 21, 22 août          | 20 novembre et 10 décembre | 3 <sup>ème</sup> et 4 <sup>ème</sup> semaine d'août | 3 <sup>ème</sup> et 4 <sup>ème</sup> semaine d'août | 3 <sup>ème</sup> et 4 <sup>ème</sup> semaine d'août |
| <b>Surface</b>                                                                         | prévue   | 6 600 m <sup>2</sup> | 6 600 m <sup>2</sup> | 25 000 m <sup>2</sup>      | 36 200 m <sup>2</sup>                               | 24 500 m <sup>2</sup>                               | 36 200 m <sup>2</sup>                               |
|                                                                                        | réalisée | 4 300 m <sup>2</sup> | 6 600 m <sup>2</sup> | 25 000 m <sup>2</sup>      | 36 200 m <sup>2</sup>                               | 24 500 m <sup>2</sup>                               | 36 200 m <sup>2</sup>                               |
| <b>Réalisation</b>                                                                     |          | 65%                  | 100%                 | 100%                       | <b>100%</b>                                         | <b>100%</b>                                         | <b>100%</b>                                         |
| <b>Opérateurs</b>                                                                      |          |                      |                      |                            |                                                     |                                                     |                                                     |
| ETIVAL (2016), Aubel Environnement (2017, 2018) et Dorian Delasalle (2019, 2020, 2021) |          |                      |                      |                            |                                                     |                                                     |                                                     |

| Synthèse budgétaire de l'opération |            |       |        |        |          |            |            |
|------------------------------------|------------|-------|--------|--------|----------|------------|------------|
|                                    |            | 2016  | 2017   | 2018   | 2019     | 2020       | 2021       |
| Budget prévisionnel                | CEN        | 800 € | 800 €  | 675 €  | 705 €    | 705 €      | 705 €      |
|                                    | Prestation | 700 € | 700 €  | 700 €  | 2500 €   | 2500 €     | 2500 €     |
| Budget réel                        | CEN        | 800 € | 800 €  | 675 €  | 705 €    | 705 €      | 705 €      |
|                                    | Prestation | 760 € | 1050 € | 1175 € | 2180,50€ | 1 192,17 € | 2 037,66 € |

#### Commentaire sur la mise en œuvre et les résultats

A noter : les secteurs 2, 3 et 4 acquis en 2017 sont ajoutés aux unités de gestion existantes à la faveur de l'évaluation à mi-parcours de 2018. La fiche TE 3 y est révisée. Est inscrite également l'alternance de fauche entre les secteurs 1 et 2, permettant de conserver chaque année une zone conséquente en défens pour la faune. Cette alternance a bien été respectée à partir de 2018.

Compte tenu des conditions exceptionnellement pluvieuses du printemps 2016, la végétation de la mégaphorbiaie était trop dense pour réaliser la fauche sur l'ensemble de la zone prévue.

Une nouvelle entreprise a été choisie pour effectuer cette fauche en 2017. L'opération a été réalisée avec succès sur la parcelle centrale (secteur 1B), elle n'a en revanche pas été exécutée sur la parcelle 1C à l'est.

En 2018, la période d'intervention n'a pas été respectée, avec une opération exécutée en novembre. Cette date tardive n'a à priori pas d'impact important sur la biodiversité, mais peut compromettre le passage en cas de météo défavorable, la zone étant inondable. Un meilleur suivi de l'entreprise ou de l'agriculteur est à tirer de cette expérience.

A partir de 2019, un agriculteur riverain, M. Dorian Delasalle, est choisi pour la fauche tardive.

| Indicateurs                                                |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicateurs de pression (IP)                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| IP8 : Respect du zonage                                    |      |      |      |      |      |      |
| IP9 : Evacuation obligatoire de la biomasse                |      |      |      |      |      |      |
| Indicateurs d'état (IE)                                    | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| IE10 : Présence du Cuivré des marais (chenilles et imagos) |      |      |      |      |      |      |
| IE11 : Maintien des habitats en place                      |      |      |      |      |      |      |
| Taux de réalisation : 90%                                  |      |      |      |      |      |      |

### **Formulation :**

Les sous-sections du secteur 1 n'ont pas été nommées dans le plan de gestion. Elles sont de plus mal formulées/nommées dans les rapports d'activités, pouvant porter à confusion (notation par chiffres arabes, identique aux numéros de secteurs définis à la même période (post-écriture du plan de gestion)).

Suite à l'acquisition des parcelles attenantes à la RNR à l'est en 2017, celles-ci ont été ajoutées à la présente analyse. Elles correspondent aux secteurs 2, 3 et 4 qui ne sont à fortiori pas mentionnées dans le plan de gestion rédigé en 2015, mais dans l'évaluation à mi-parcours de 2018.

L'indicateur IP8 : « Respect du zonage » est incomplet, la notion de périodicité aurait dû être ajoutée (ou faire l'objet d'un autre indicateur).

### **Indicateurs de suivi :**

#### **➤ IP8 : Respect du zonage**

Les indicateurs de pression IP8 et IP9 sont évalués par la réalisation de l'opération TE3. Le zonage n'a pas pu être respecté en 2016 compte tenu des conditions exceptionnellement pluvieuses (sud-est du secteur 1 trop dense au cœur de la parcelle et près de l'Organne). Pour compenser, la fauche a été effectuée sur une bande d'environ 15m de large le long de la route, ainsi que le long de la haie à l'est du secteur 1, sur une largeur d'environ 30m.

En 2017, seule la fauche de la partie centrale du secteur 1 (1B) a été réalisée. La zone 1C aurait également dû être fauchée afin de respecter la périodicité bisannuelle établie par le plan de gestion. Mis à part ce manque, les secteurs 1B et 1C ont été fauchés de manière bisannuelle comme convenu.



Par ailleurs, le secteur 1A a subi une révision de sa gestion lors de l'évaluation à mi-parcours. Il a été décidé de passer d'une fauche trisannuelle à une fauche bisannuelle. A partir de 2018, l'ensemble du secteur 1 constitue donc une unique unité de gestion. Avec des opérations de fauche en 2019 et en 2021, la nouvelle périodicité est respectée.

Le secteur 2 est fauché tous les 2 ans, les secteurs 3 et 4 chaque année. La périodicité décidée lors de l'acquisition en 2017 est respectée.

➤ **IP9 : Evacuation obligatoire de la biomasse**

Chaque année, la biomasse a systématiquement été exportée après chaque fauche. L'indicateur IP9 est donc respecté.

➤ **IE10 : Présence du Cuivré des marais**

L'indicateur IE10 est officiellement évalué par le suivi bisannuel SE 4 (suivi de la population de Cuivré des marais). Il a été effectué tous les deux ans, en 2017, 2019 et 2021, avec deux passages à chaque fois (pour contacter potentiellement la 1<sup>ère</sup> et la 2<sup>ème</sup> génération).

Durant ces trois saisons, l'espèce a systématiquement été contactée à l'état de ponte, de chenille et d'imago.

Se référer à l'objectif opérationnel D.1, suivi SE 4 pour les détails de l'étude.

En marge de ce suivi (hors protocole SE 4) et notamment dans le cadre de l'action SE 7 relative au suivi annuel des populations de Lépidoptères, la présence du Cuivré des marais a systématiquement été détectée chaque année entre 2016 et 2021. L'espèce a systématiquement été contactée à l'état d'imago, notamment pour les années non concernées par le suivi SE 4 (2016, 2018, 2020).

➤ **IE 11 : Maintien des habitats en place**

L'indicateur IE11 concerne tous les habitats de la partie prairie. Cet indicateur est évalué par les suivis phytosociologiques SE1 et par les placettes situées sur les coteaux : placettes n°3, 4 et 5.



- Placettes obsolètes (2016-2018)     Périmètre RNR
- Placettes actuelles (2019-2021)     parcelles CEN



0 25 50 m

 **Conservatoire  
d'espaces naturels  
Pays de la Loire**

Sources : Google maps 2021, CEN  
Production : CEN PDL - 2021.

**Figure 22. Localisation des placettes phytosociologiques**






Figure 23. Placette n°3 située secteur 1C (2010-2021)

| Objectif de gestion pour 2021                                                | Gestion précédente      | Indicateur estimatif de réussite en 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Maintien en magnocariçaie du <i>Cypero longi</i> — <i>Caricetum cuprinae</i> | Fauche tardive fin 2020 |                                          |

La placette n° 3 est localisée au sein de la partie « prairie » de la RNR. Il s'agit en fait d'une magnocariçaie rattachable au *Caricion gracilis*. La plupart des espèces caractéristiques de l'alliance sont présentes, ce qui indique le bon état de conservation du milieu.

Toutefois, ce milieu n'est pas caractéristique du *Cypero longi* — *Caricetum cuprinae* qui est un faciès des prairies amphibies des *Eleocharitetalia palustris*. Cette végétation était celle identifiée en 2018 dans les inventaires, et représentait l'objectif de gestion à atteindre. Or en 2019 et 2020, le relevé indique clairement une dominance des cortèges d'ourlets.

Le passage en 2016 d'une fauche annuelle à une fauche trisannuelle a permis aux espèces de mégaphorbiaies et surtout à *Cyperus longus* de représenter l'habitat. Il est donc clair que le milieu a évolué depuis, vers la Cariçaie.

Malgré la fauche réalisée fin 2019, une cariçaie est toujours présente en 2020. En effet, les conditions écologiques (forte hygrophilie et sols alluviaux riches et profonds) favorisent le maintien d'un ourlet malgré une gestion annuelle comme cela peut être le cas en cortège alluvial, ou lorsque les populations d'espèces rhizomateuses sont très dynamiques. Il faudrait retourner vers une fauche annuelle pour favoriser peu à peu les cortèges prairiaux et retrouver le faciès de prairie ourléifiée des *Eleocharitetalia*.




Figure 24. Résultats des suivis phytosociologiques de 2010 à 2018 sur l'ancienne placette n°4 (secteur 1C)

L'ancienne placette n°4 était située au cœur de la partie « prairie » de la RNR. En 2017, elle est rattachable à une mégaphorbiaie du *Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae*. L'année 2017 semble avoir favorisé le développement du cortège des mégaphorbiaies sur la RNR, le phénomène étant visible sur les 3 placettes situées dans la partie « prairie ». Ce phénomène est donc très certainement lié à la saisonnalité, et non à la gestion. L'année 2018 met en évidence le phénomène inverse, avec un retour de la placette à sa magnocariçaie initiale. Tout comme pour la placette n°3, le passage à une fauche bisannuelle devrait permettre de stabiliser le cortège, sans pour autant laisser le temps aux arbustes de se développer.




Figure 25. Placette n°4 située secteur 2 (2019-2021)

| Objectif de gestion pour 2021                            | Gestion précédente      | Indicateur estimatif de réussite en 2021 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Maintien en prairie de fauche du <i>Bromion racemosi</i> | Fauche tardive fin 2020 |                                          |

La placette n°4 est située en bordure sud-est de la zone humide. Les relevés démarrent en 2019 sur cette parcelle acquise en 2017. Depuis 3 ans, la parcelle présente une prairie correspondant à un faciès appauvri de *Bromion racemosi*. On remarque que la gestion récemment mise en place porte ces fruits puisque les ourlets régressent au profit des prairies. On constate toutefois que le caractère hygrophile se traduit moins dans le cortège prairial que dans les ourlets, ce qui peut signifier que les assecs sont importants en été. Malgré une gestion favorable, la richesse spécifique n'augmente pas pour l'instant. La végétation actuelle a probablement fait l'objet d'amendements qui ont appauvri le cortège surtout en ce qui concerne les dicotylédones.

L'objectif fixé auparavant correspondait à l'ancienne placette n°4. Le nouvel objectif correspond au maintien de la prairie hygrophile de fauche.

La placette n°5 se situe à l'extrémité est de la prairie de la RNR. Elle correspond à 2 communautés végétales en introgression :

- Une mégaphorbiaie du *Thalictro flavi - Filipenduletum ulmariae* ;
- Une roselière du *Phalaridetum arundinaceae*.




Figure 26. Résultats des suivis phytosociologiques de 2010 à 2021 sur la placette n°5

| Objectif de gestion pour 2021                          | Gestion précédente      | Indicateur estimatif de réussite en 2021 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Maintien en mégaphorbiaie, avec un faciès à Baldingère | Fauche tardive fin 2020 |                                          |

Dans cette partie de la RNR, la mégaphorbiaie correspond à un faciès haut, dû à la présence importante de Baldingère (*Phalaris arundinacea*). Cette espèce apprécie les alternances de périodes d'inondation et d'exondation, ici liées à sa situation en berge du cours d'eau, et surtout à la proximité immédiate avec le Loir. Le graphique ci-dessus montre toutefois que le pourcentage d'espèces de mégaphorbiaie a fortement diminué entre 2017 et 2018 et que celui des espèces de roselière a fortement augmenté. L'objectif de maintenir les habitats en place n'est donc pas atteint en 2018.

Des espèces végétales d'intérêt patrimonial sont également suivies, notamment la Valériane dioïque (*Valeriana dioica*) suivie dans le cadre du suivi SE 2 (Suivre annuellement les espèces de flore patrimoniale). Ces suivis sont en l'état pertinents pour suivre l'action. Cependant, les données relatives à la Valériane de 2017 et 2018 sont douteuses. Les données plus anciennes paraissent plus fiables car acquises par des botanistes de métier, en revanche l'habitat ne correspond pas au type de milieu affectionnant la Valériane dioïque.

| Formulation<br>2/3                       | Pertinence<br>2/3                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les objectifs d'atteinte d'habitat fixés | La pertinence de l'action est réelle pour le maintien ouvert de la zone humide. Dans les détails et en termes de cortèges de végétations et entomologiques, les objectifs doivent être réfléchis à nouveau et les enjeux doivent être hiérarchisés. |
| Efficacité<br>3/3                        | Efficienne<br>3/3                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'action est efficace pour le maintien ouvert des habitats et de la présence du Cuivré des marais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Le bilan de l'opération est satisfaisant et le budget réel est inférieur au prévisionnel pour les 3 dernières années. |
| <b>Synthèse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |
| <p>Cette action a été dans l'ensemble bien réalisée chaque année. Elle est à pérenniser, mais les objectifs doivent être réfléchis à nouveau, en lien notamment avec les enjeux floristiques et entomologiques. L'orientation vers une fauche tous les deux à trois ans générera une litière plus conséquente et un développement accru des plantes nectarifères de mégaphorbiaie, ce qui favorisera l'entomofaune. A l'inverse, une fauche annuelle permettra une meilleure oligotrophie et favorisera plutôt la flore. Une gestion différenciée entre les unités de gestion pourrait également être envisagée. Les autres enjeux tels que les micromammifères ou l'avifaune seront également à considérer.</p> |                                                                                                                       |



## TE 4

## POSER UNE CLOTURE TEMPORAIRE SEPARANT LES ZONES FAUCHEES DES ZONES NON FAUCHEES

### OBJECTIFS DE L'OPERATION, RESULTATS ATTENDUS ET MODE OPERATOIRE

Objectif : Distinguer les zones fauchées des zones non fauchées afin de faciliter le travail du prestataire responsable de la fauche.


Description de l'opération : Pose de piquets et de rubalise permettant de délimiter temporairement les zones à ne pas faucher. Cette délimitation est à retirer une fois la fauche réalisée.



### Localisation



— Clôture temporaire  
 □ Limites de la RNR



Conservatoire  
d'espaces naturels  
Pays de la Loire  
Sources : Google maps 2022, CEN  
Production : CEN PDL - 2022.

Figure 27. Localisation de l'action TE 4

|                          |  | 2016   | 2017    | 2018 | 2019           | 2020 | 2021 |
|--------------------------|--|--------|---------|------|----------------|------|------|
| Périodes d'intervention  |  | 3 août | 10 août | -    | Action annulée |      |      |
| Réalisation              |  | 100%   | 100%    | 0%   |                |      |      |
| Opérateur                |  |        |         |      |                |      |      |
| CEN des Pays de la Loire |  |        |         |      |                |      |      |

| Synthèse budgétaire de l'opération |     |       |        |       |                       |      |      |
|------------------------------------|-----|-------|--------|-------|-----------------------|------|------|
|                                    |     | 2016  | 2017   | 2018  | 2019                  | 2020 | 2021 |
| Budget prévisionnel                | CEN | 400 € | 400 €  | 450 € | <b>Action annulée</b> |      |      |
| Budget réel                        |     | 400 € | 400, € | 450 € |                       |      |      |

### Commentaire sur la mise en œuvre et les résultats

En 2018, suite au nouveau plan de pâturage et de fauche avec l'acquisition de nouvelles parcelles, il n'a pas été jugé pertinent de maintenir cette action : les lots correspondent désormais aux différentes parcelles. Cette action n'a officiellement plus été mise en œuvre à partir de 2019, suite à la révision du plan de gestion à mi-parcours.

| Indicateurs                  |  |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|
| Indicateurs de pression (IP) |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

|                                                 |  |  |  |   |   |   |
|-------------------------------------------------|--|--|--|---|---|---|
| IP10 : Respect des zones de fauche              |  |  |  | - | - | - |
| IP11 : Pose de la clôture en amont de la fauche |  |  |  | - | - | - |
| Taux de réalisation : 70%                       |  |  |  |   |   |   |

## **Indicateurs :**

### ➤ **IP10 : Respect des zones de fauche / IP11 : Pose de la clôture en amont de la fauche**

Les indicateurs de pression IP10 et IP11 sont évalués par la réalisation de l'opération TE4. La clôture a bien été posée en amont de la fauche et les zones de fauche ont été respectées. Les objectifs sont donc atteints. Cependant,

| Formulation<br>3/3                                                                                                                                                                                                                                                      | Pertinence<br>2/3                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAS                                                                                                                                                                                                                                                                     | D'abord cohérente, l'action s'est ensuite avérée inutile à partir de 2018, lorsque les unités de gestion ont changé. |
| Efficacité<br>2/3                                                                                                                                                                                                                                                       | Efficienne<br>2/3                                                                                                    |
| L'action a été efficace uniquement en 2017 ; en 2016 la fauche a été limitée par la portance du sol humide (cf TE3), et l'action n'a plus été mise en œuvre à partir de 2018.                                                                                           | Opération plus ou moins efficiente et finalement supprimée. Dépenses en 2018 malgré une absence d'action.            |
| Synthèse                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |
| L'action est pertinente à partir du moment où le secteur 1 est découpé en plusieurs unités de gestion, ce qui n'est plus le cas depuis 2018. Une réflexion est à mener sur le découpage à effectuer pour le prochain plan de gestion, au regard des enjeux écologiques. |                                                                                                                      |

## TE 6

## Faire pâturer tardivement et de manière extensive la prairie humide

## OBJECTIFS DE L'OPERATION, RESULTATS ATTENDUS ET MODE OPERATOIRE

**Objectif :** Permettre la conservation de la végétation de prairie humide et de mégaphorbiaies. De plus le piétinement des animaux pourrait façonner de micro-dépressions de sol nu favorables à la germination de certaines espèces végétales patrimoniales.

**Description de l'opération :** Mettre en place un pâturage sur les prairies humides. Pour cela une convention doit être établie entre le Conservatoire et un agriculteur.


## Localisation



Actions de pâturage de la zone humide entre 2016 et 2021

■ 2020  
■ 2020-2021  
■ 2021

□ Limites de la RNR



Conservatoire  
d'espaces naturels  
Pays de la Loire

Sources : Google maps 2022, CEN  
Production : CEN PDL - 2022.

|                                                                  |          | 2016                | 2017                | 2018                  | 2019                  | 2020                                        | 2021                                        |
|------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Périodes d'intervention                                          |          | Recherche           | Recherche           | Recherche             | Recherche             | Juillet puis octobre                        | 7 novembre – 17 décembre                    |
| Surface                                                          | prévue   | 7054 m <sup>2</sup> | 5970 m <sup>2</sup> | 13 811 m <sup>2</sup> | 13 811 m <sup>2</sup> | 24 500 m <sup>2</sup><br>(secteurs 2, 3, 4) | 36 200 m <sup>2</sup><br>(secteurs 1, 3, 4) |
|                                                                  | réalisée | 0 m <sup>2</sup>    | 0 m <sup>2</sup>    | 0 m <sup>2</sup>      | 0 m <sup>2</sup>      | 24 500 m <sup>2</sup><br>(secteurs 2, 3, 4) | Secteurs 1 et 3                             |
| Réalisation                                                      |          | 0%                  | 0%                  | 0%                    | 0%                    | 50%                                         | 50%                                         |
| Opérateur                                                        |          |                     |                     |                       |                       |                                             |                                             |
| Particulier propriétaire de chevaux : Marie Thuleau (2020, 2021) |          |                     |                     |                       |                       |                                             |                                             |

## Synthèse budgétaire de l'opération

|                     |            | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|---------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Budget prévisionnel | CEN        | 800 € | 800 € | 450 € | 470 € | 470 € | 470 € |
|                     | Prestation | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Budget réel         | CEN        | 800 € | 800 € | 450 € | 470 € | 500 € | 500 € |
|                     | Prestation | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

## Commentaire sur la mise en œuvre et les résultats

Le partenariat historique avec un éleveur en place s'est arrêté au moment de la mise en place du plan de gestion, pour cause de cessation d'activité. Des difficultés ont été rencontrées pour trouver un autre éleveur local intéressé ; des recherches ont été effectuées entre 2016 et 2019, années pendant lesquelles le pâturage n'a pas pu être mis en œuvre. Depuis 2020, un prêt à usage a été signé avec Madame Marie Thuleau, propriétaire de chevaux.

|                                       |   | Indicateurs |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------|---|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicateurs de pression (IP)          |   | 2016        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |      |
| IP15 : Respect des dates de pâturage  |   |             |      |      |      |      |      |      |
| IP16 : Respect du chargement          |   |             |      |      |      |      |      |      |
| Indicateurs d'état (IE)               |   | Placette    | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| IE13 : Maintien des habitats en place | 3 |             |      |      |      |      |      |      |
|                                       | 4 |             |      |      |      |      |      |      |
|                                       | 5 |             |      |      |      |      |      |      |
| Taux de réalisation : 15%             |   |             |      |      |      |      |      |      |

## Indicateurs :

### ➤ IP15 : Respect des dates de pâturage / IP16 : Respect du chargement

Les indicateurs de pression IP15 et IP16 sont évalués par la réalisation de l'opération TE6. La prairie n'a pas été pâturée entre 2016 et 2019, car le CEN n'a pas trouvé d'éleveur partenaire intéressé. Des chevaux ont pâture en 2020 et 2021, ils appartiennent à un particulier local. En 2020, les dates de pâturage n'ont été que partiellement respectées avec une mise au pré en juillet. Un pâturage en automne/hiver était prévu dans le plan de gestion. Du fait du faible chargement, ce pâturage estival n'a, à notre connaissance, pas porté atteinte à la biodiversité.

Les objectifs pour ces indicateurs ne sont donc globalement pas atteints du fait de l'absence de pâturage pendant les 4 premières années. On notera cependant une évolution positive avec le début d'un partenariat en local depuis 2020.

### ➤ IE13 : Maintien des habitats en place

Comme pour l'indicateur d'état IE11, l'indicateur IE13 concerne tous les habitats de la partie humide. Cet indicateur est donc également évalué par les suivis phytosociologiques SE1 et par les placettes situées sur la partie prairie : placettes n°3, 4 et 5. Les résultats de ces suivis sont détaillés dans la fiche opération TE 3 de l'objectif opérationnel A.2. Le pâturage a pu être mis en œuvre à partir de 2020 seulement, et avec très peu de pression. Toutefois, les prairies sont gérées par une fauche alternée (cf. fiche de l'opération TE 3). L'objectif de maintien des habitats est donc atteint, mais quasi exclusivement grâce à l'opération TE 3.

| Formulation<br>3/3 | Pertinence<br>3/3                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAS                | Le pâturage permet une gestion différente de la fauche. Le piétinement génère des micro-dépressions et les préférences alimentaires donnent lieu à une coupe hétérogène. |
| Efficacité<br>1/3  | Efficienne<br>2/3                                                                                                                                                        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <p>Difficultés de mise en œuvre du fait du manque d'éleveurs locaux intéressés.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effort prospectif plus conséquent à mettre en œuvre lorsqu'il n'y a pas de partenariat.</li> <li>- Besoin d'une pression de pâturage plus importante.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>L'action n'est que très partiellement réalisée. Le budget est insu</p> |
| <p><b>Synthèse</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |
| <p>Le pâturage n'a pas pu être mis en place pendant les quatre premières années et reste perfectible en 2020 et 2021. Il s'agit d'une action très pertinente, mais qui présente des difficultés de mise œuvre, du fait du manque d'éleveurs locaux intéressés par cette zone. Il est considéré que seule l'action de fauche TE 3 a permis réellement de répondre au besoin de l'objectif de maintien ouvert de la zone humide.</p> <p>Pour le prochain plan de gestion, le maintien de cette action de pâturage reste tout de même souhaitable, puisque bien exécutée elle pourrait apporter de meilleurs résultats que la fauche pour la biodiversité.</p> |                                                                           |

Afin d'évaluer l'impact de la gestion sur les prairies humides, et donc valider l'objectif opérationnel A.2, des suivis sont réalisés sur des populations d'espèces indicatrices telles que les populations de Cuivré des marais (SE 4) ou encore les Lépidoptères (toutes espèces confondues) (SE 7) ainsi que les Orthoptères (SE 9). Les résultats de ces suivis sont détaillés dans l'évaluation de l'objectif opérationnel D1.

## TE 11

## CONTROLLER ET ENTREtenir LE LINEAIRE DE CLOTURES

### OBJECTIFS DE L'OPERATION, RESULTATS ATTENDUS ET MODE OPERATOIRE

**Objectif :** Maintenir en bon état les clôtures

**Description de l'opération :** La gestion par pâturage des différents habitats de la RNR est dépendante en partie de la présence d'une clôture en bon état. Une partie de ce linéaire est constituée d'un réseau de fil électrique. Un entretien annuel est indispensable en pied de clôture. Sur le coteau, les piquets sont à remplacer du fait de leur état de vieillissement.



24. Entretien des clôtures de la prairie permettant de lutter contre l'envahissement de la végétation,
25. Suppression de la clôture dans le bas du coteau afin de faciliter l'opération TE 9, puis sa réinstallation.
26. Remplacement de la barrière de l'entrée
27. Remplacement de clôture endommagée

Cette action est analysée en deux temps ; dans le cadre de l'objectif à long terme A, relatif au coteau, et dans le cadre de l'objectif à long terme B, relatif à la zone humide.

### Localisation




#### Légende

□ Périmètre du site

■ Clôtures à entretenir et contrôler

0 50 100 150 200 m

Source : BD Ortho 2015  
Elaboration : L. Gaffé - CEN PDL - Juin 2018  
Logiciel : Qgis 3.0.1



Conservatoire  
d'espaces naturels  
Pays de la Loire

Carte 12 : TE 11 – Contrôler et entretenir le linéaire de clôtures

|                         |         | 2016                                  | 2017                          | 2018                          | 2019                                  | 2020                                  | 2021                          |
|-------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Périodes d'intervention |         | Septembre                             | Septembre                     | Septembre                     | Mai et septembre                      | Novembre                              | Avril                         |
| Linéaire                | prévu   | Pourtour de la prairie humide         | Pourtour de la prairie humide | Pourtour de la prairie humide | Pourtour de la prairie humide         | Pourtour de la prairie humide         | Pourtour de la prairie humide |
|                         | réalisé | Pourtour de la prairie humide, coteau | Pourtour de la prairie humide | Pourtour de la prairie humide | Pourtour de la prairie humide, coteau | Pourtour de la prairie humide, coteau | Pourtour de la prairie humide |
| Réalisation             |         | 100%                                  | 100%                          | 100%                          | 100%                                  | 100%                                  | 100%                          |
| Opérateur               |         | CEN et l'AISP                         |                               |                               |                                       |                                       |                               |

| Synthèse budgétaire de l'opération |            |          |            |         |            |         |         |
|------------------------------------|------------|----------|------------|---------|------------|---------|---------|
|                                    |            | 2016     | 2017       | 2018    | 2019       | 2020    | 2021    |
| Budget prévisionnel                | CEN        | 940 €    | 940 €      | 900 €   | 940 €      | 940 €   | 1 000 € |
|                                    | Prestation | 800 €    | 800 €      | 940 €   | 4 200 €    | 4 200 € | 4 200 € |
| Budget réel                        | CEN        | 800 €    | 800 €      | 900 €   | 900 €      | 1 000 € | 1 000 € |
|                                    | Prestation | 928,62 € | 1 016,50 € | 1 164 € | 2 351,40 € | 2 765 € | 3 600 € |



Figure 29. Photos présentant l'état du pied de clôture de la prairie humide avant et après l'entretien

| Commentaire sur la mise en œuvre et les résultats liés à la zone humide                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| En 2016 et 2017, l'entretien des clôtures de la prairie a entraîné la casse du ruban de fil électrique à plusieurs endroits, conséquence fréquente du débroussaillage dans ce genre de contexte. Chaque année le débroussaillage s'effectue en deux phases, par le CEN et par l'AISP. |      |      |      |      |      |      |
| Indicateurs                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |      |
| Indicateurs de pression (IP)                                                                                                                                                                                                                                                          | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| IP24 : Entretien chaque année de 100% du linéaire de clôture en prairie humide (en lien avec TE6)                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| Taux de réalisation : 100%                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |      |      |      |      |

➤ **IP23 : Remplacement d'au moins 80% de la clôture du coteau calcaire**

Indicateur évalué dans le cadre de l'OLT A relatif au coteau.

➤ **IP24 : Entretien chaque année de 100% du linéaire de clôture en prairie humide (en lien avec TE6)**

| Formulation*<br>2/3                                                                                                            | Pertinence*<br>3/3                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il aurait pu être précisé plus explicitement que l'entretien visait notamment l'entretien de la végétation de pied de clôture. | Action en adéquation avec les objectifs opérationnels et à long terme puisqu'elle permet la mise en œuvre des actions de pâturage. |
| Efficacité*                                                                                                                    | Efficience*                                                                                                                        |

| 2/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3/3                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Le linéaire nord-est du coteau n'a pas été changé et mériterait d'être remplacé. Les résultats restent dans l'ensemble satisfaisants, mais perfectibles.</p> <p>Pour la partie zone humide, les résultats sont satisfaisants même si des problèmes de coupe accidentelle de clôtures électriques sont apparus lors de la mise en œuvre.</p> | <p>Les objectifs sont quasiment atteints, pour un budget réel inférieur au prévisionnel.</p> |
| Synthèse*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |
| <p>Pour la partie coteau, les résultats sont globalement satisfaisants même s'il reste encore du linéaire de clôture à changer.</p> <p>Pour la partie zone humide, l'action d'entretien du pied de clôture est réalisée avec succès chaque année, et les clôtures sont en bon état.</p>                                                        |                                                                                              |

\*Evaluation prenant en compte l'ensemble de l'action TE 11 (issue de l'OLT A + OLT B).

## Synthèse de l'objectif opérationnel A.2

| OBJECTIFS ET OPERATIONS ASSOCIEES |  |                                                                         |  |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
| OLT A                             |  | MAINTENIR, RESTAURER ET CONSERVER LES HABITATS NATURELS                 |  |  |
| Objectif opérationnel A.2         |  | Conserver et entretenir la diversité des milieux humides.               |  |  |
| Opérations associées              |  | TE3, TE4, TE6, TE11                                                     |  |  |
| Suivis                            |  | SE1, SE2, SE4, SE7, SE9, RE1 (évalués dans l'objectif opérationnel D.1) |  |  |
|                                   |  | Maintien voire augmentation des surfaces de mégaphorbiaies              |  |  |
| Résultats                         |  | Maintien de la diversité floristique                                    |  |  |
|                                   |  | Maintien voire augmentation des effectifs de Cuivré des marais          |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |
|                                   |  | <div></div>                                                             |  |  |



## Objectif opérationnel A.3 – Augmenter la superficie bénéficiant d'une gestion conservatoire

AD 1

EFFECTUER UNE VEILLE EN PERIPHERIE DE LA RNR


### OBJECTIFS DE L'OPERATION, RESULTATS ATTENDUS ET MODE OPERATOIRE

**Objectif :** Etendre la maîtrise foncière et la protection du patrimoine naturel et engager des discussions pour d'éventuelles conventions de gestion avec des propriétaires riverains.

**Description de l'opération :** Réaliser un suivi annuel des actions de vente sur le territoire proche de la RNR.

### Localisation

Carte 13 : Situation foncière du CEN



|                        | 2016      | 2017                  | 2018      | 2019      | 2020     | 2021      |
|------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Période d'intervention | 1 jour/an | 1 jour/an             | 1 jour/an | 1 jour/an | 10 jours | 1 jour/an |
| Surface acquise        | -         | 24 621 m <sup>2</sup> | -         | -         | -        | -         |
| Réalisation            | 100%      | 100%                  | 100%      | 100%      | 100%     | 100%      |

### Opérateur

CEN Pays de la Loire

### Synthèse budgétaire de l'opération (2016 - 2021)

|                     | 2016  | 2017    | 2018  | 2019  | 2020   | 2021  |
|---------------------|-------|---------|-------|-------|--------|-------|
| Budget prévisionnel | 700 € | 6 000 € | 450 € | 710 € | 4700 € | 740 € |
| Budget réel         | 400 € | 400 €   | 450 € | 710 € | 5000 € | 740 € |

### Budget pour les parcelles acquises en 2017

Vendeur : 11 000 €

SAFER : 1 044 €

Frais de notaire : 1 507 €

Financement : AELB (80 %)

FEDER (20 %)

### Commentaire sur la mise en œuvre et les résultats

Le Conservatoire conventionne avec la SAFER depuis 2015 pour la mise en œuvre de l'outil vigifoncier, qui permet de suivre les mutations foncières.

Le Conservatoire a acquis par acte notarié du 5 octobre 2017 les parcelles cadastrées YP 3, 8, 70 et 84 à Luché-Pringé, auprès de M. Bourillon.

En 2020, une opération d'animation foncière a été réalisée autour de la RNR. Les 36 propriétaires concernés par le périmètre d'intervention du CEN ont été contactés. De plus, un second travail a été mené pour identifier deux secteurs à forte valeur patrimoniale, en s'éloignant cette fois-ci du périmètre immédiat de la RNR. Les réponses

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ont toutes été négatives et n'ont pas permis d'aboutir à une maîtrise foncière ou d'usage.</p> <p>A l'écriture de cette évaluation fin 2021, le Conservatoire est en cours d'acquisition d'une nouvelle parcelle, la parcelle YB 48 correspondant au début du plateau boisé surplombant la falaise du coteau. Il s'agit d'une parcelle de petite taille (845m<sup>2</sup>) et directement voisine de 3 parcelles labellisées en RNR.</p> <p>L'absence de consensus avec le Conseil régional sur la maîtrise foncière par le Conservatoire n'a pas permis au Conservatoire de mettre en œuvre une animation foncière plus dynamique.</p> |
| <b>Taux de réalisation : 100%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| <b>Formulation<br/>3/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Pertinence<br/>3/3</b>                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Action pertinente pour augmenter la maîtrise foncière et /ou d'usage aux abords de la RNR et ainsi augmenter la superficie labellisée.                                  |
| <b>Efficacité<br/>3/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Efficience<br/>2/3</b>                                                                                                                                               |
| En 6 ans, le périmètre sous maîtrise foncière du CEN au niveau de la RNR a quasiment doublé. Le résultat est donc satisfaisant. Une labellisation des nouvelles parcelles serait un plus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Action peu efficiente en 2020 où la campagne d'animation foncière n'a pas été fructueuse malgré un nombre relativement conséquent de jours attribués à cette opération. |
| <b>Synthèse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |
| <p>Cette opération a permis en 2017 (et très certainement début 2022) l'extension des territoires acquis et gérés par le CEN dans un périmètre proche de la RNR. Cela devrait permettre d'étendre par la suite le périmètre labellisé RNR.</p> <p>Bien que l'opération d'animation foncière de 2020 n'ait pas été fructueuse sur le plan de l'acquisition (action peu efficiente sur 2020), elle aura permis de faire connaître le Conservatoire, ses actions et intentions, ainsi que la RNR au niveau des propriétaires du secteur.</p> <p>La parcelle YB 48 de 845m<sup>2</sup> est en cours d'acquisition (fin 2021).</p> |                                                                                                                                                                         |

## Synthèse de l'objectif opérationnel A.3

| OLT A - MAINTENIR, RESTAURER ET CONSERVER LES HABITATS NATURELS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                          |            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| OBJECTIFS ET OPERATIONS ASSOCIEES                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                          |            |
| <b>Objectif opérationnel A.3</b>                                | <b>Augmenter la superficie bénéficiant d'une gestion conservatoire</b>                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                          |            |
| Opérations associées                                            | AD 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                          |            |
| Résultats                                                       | Au moins 0,5ha acquis ou sous maîtrise d'usage en périphérie de la RNR d'ici 2021                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                          |            |
| Analyse de l'objectif du plan                                   | Analyse au regard des enjeux du plan de gestion en cours                                                                                                                                                                                                                                           |            | Analyse au regard des objectifs et actions mis en place dans le plan de gestion en cours |            |
|                                                                 | Formulation                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pertinence | Résultats                                                                                | Efficacité |
|                                                                 | 3/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3/3        | 3/3                                                                                      | 2/3        |
|                                                                 | Synthèse                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                          |            |
|                                                                 | 5 parcelles sont acquises en 2017, attenantes à la parcelle humide à l'est, le long de l'Organne. Avec une superficie d'environ 2,5 ha, l'objectif fixé de 0,5ha est donc atteint. Une nouvelle parcelle de 845m <sup>2</sup> correspondant à une partie de la falaise est en cours d'acquisition. |            |                                                                                          |            |

## Synthèse de l'objectif à long terme A

### OLT A - Maintenir, restaurer et conserver les habitats naturels

#### OBJECTIFS ET OPERATIONS ASSOCIEES

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objectifs opérationnels            | <p><b>A.1 – Maintenir, restaurer et favoriser l'extension des habitats de pelouses calcicoles et d'ourlet et de prairie tout en assurant la conservation d'une mosaïque d'habitats calcicoles variés.</b></p> <p><b>A.2 - Conserver et entretenir la diversité des milieux humides</b></p> <p><b>A.3 - Augmenter la superficie bénéficiant d'une gestion conservatoire</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Problématique<br>(PdG 2016 - 2021) | <p>L'objectif à long terme vise le maintien, la conservation voire la restauration des habitats naturels de la RNR. Il porte prioritairement sur les habitats identifiés dans la synthèse des enjeux : les pelouses calcicoles et les mégaphorbiaies, en égard à la valeur patrimoniale intrinsèque de ces habitats, mais aussi à leur rôle d'habitats d'espèces, notamment pour l'Azuré du serpolet et le Cuivré des marais.</p> <p>La restauration de ces habitats prioritaires peut toutefois impliquer la régression d'autres habitats jugés moins patrimoniaux et présentant des enjeux de conservation moins déterminants.</p> |
| Synthèse de l'OLT                  | <p>Le cap indiqué par l'objectif à long terme a été respecté, avec le maintien des habitats prioritaires et de la mosaïque d'habitats. Des opérations de restauration ont également été menées avec succès. La superficie sous maîtrise foncière a été augmentée. Seul le pâturage est à perfectionner, tant en zone humide que sur le coteau.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### C.2.2.2. OLT B - Maintenir et conserver les populations de Chiroptères

Objectif opérationnel B.1 – Assurer la conservation des populations de Chiroptères dans et hors de la RNR





## OBJECTIFS DE L'OPERATION, RESULTATS ATTENDUS ET MODE OPERATOIRE

Objectif : Assurer la conservation des populations de chiroptères sur la RNR et hors RNR.

Description de l'opération : La cavité des Caforts fait partie intégrante d'un réseau de galeries nécessaires au maintien de nombreuses espèces de Chiroptères en période d'hibernation sur le site du Port des Roches.

Chaque site est complémentaire, vis-à-vis de l'hibernation de certaines espèces.

## Localisation





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2016               | 2017               | 2018             | 2019          | 2020          | 2021          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Période d'intervention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | début février      | début février      | début février    | début février | début février | début février |
| Réalisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100%               | 100%               | 100%             | 100%          | 100%          | 100%          |
| <b>Opérateurs</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                  |               |               |               |
| CEN Pays de la Loire (2 salariés + bénévoles)<br>Appui du CPIE Vallées de la Sarthe et du loir pour certaines cavités voisines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                    |                  |               |               |               |
| <b>Méthodologie/protocole</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |                  |               |               |               |
| <p>Comptage des individus dans les cavités (LPO ANJOU – 2009) :</p> <p>Sur la RNR : Passage sans dérangement et une seule fois dans l'hiver à deux personnes. Les chiroptérologues parcourent un circuit identique tous les ans afin de suivre les différentes fissures intéressantes pour les <i>Myotis</i>.</p> <p>Suivi de la température et de l'hygrométrie dans les secteurs de forte concentration.</p> <p>Hors RNR : du temps est consacré à la recherche ou au comptage de cavités supplémentaires dans le coteau du Port des Roches. Le même protocole que sur la RNR est appliqué.</p> <p>Les passages sont effectués entre mi-janvier et fin février selon les conditions climatiques.</p> |                    |                    |                  |               |               |               |
| <b>Indicateurs de résultat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                    |                  |               |               |               |
| 28. Maintien voire augmentation des individus dans la cavité des Caforts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                    |                  |               |               |               |
| 29. Maintien voire augmentation des effectifs sur le Port des Roches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                    |                  |               |               |               |
| <b>Synthèse budgétaire de l'opération (2016 - 2021)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                    |                  |               |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2016               | 2017               | 2018             | 2019          | 2020          | 2021          |
| Budget prévisionnel (SE5+SE6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1600 € +<br>1600 € | 1600 € +<br>1600 € | 900 € + 900<br>€ | 1 880 €       | 1 880 €       | 1 880 €       |
| Budget réel (SE5+SE6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1600 € +<br>1600 € | 1600 € +<br>1600 € | 900 € + 900<br>€ | 1 880 €       | 2 000 €       | 2 000 €       |
| <b>Taux de réalisation : 100%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                    |                  |               |               |               |

## Mise œuvre et synthèse de l'action

Sur le site, les premiers suivis des Chiroptères hivernants dans la cavité souterraine remontent à 1983. Le CEN Pays de la Loire possède donc une connaissance historique du site, et les chiffres permettent de dresser les graphiques suivants afin de tenter d'analyser l'évolution des populations hivernantes.




Figure 30. Evolution du nombre de chiroptères hivernants entre 1983 et 2021 dans la cavité des caforts

De manière globale, les effectifs de Chiroptères hivernants dans la cavité des Caforts sont en moyenne en augmentation depuis 2003, pour atteindre 402 individus lors du dernier comptage (février 2021). Toutefois, une baisse de 40 individus est observée par rapport à 2020. Les espèces concernées par cette baisse sont les Murins à oreilles échancrées, le Murin de Daubenton et le Murin à moustaches. En outre, parmi les facteurs positifs, nous pouvons noter qu'au travers de sa protection et sa mise en réserve, l'absence quasi-totale de perturbation dans cette cavité (exception faite de ce suivi) est peut-être l'une des raisons de ces effectifs globalement croissants.

| Genre espèce                    | Nom vernaculaire     | Protection | Directive Habitats | Liste Rouge Française | Liste Rouge Pays de la Loire 2020 | Dét. ZNIEFF | Dernière observation |
|---------------------------------|----------------------|------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|
| <i>Barbastella barbastellus</i> | Barbastelle d'Europe | PN         | Annexe II & IV     | Non menacé            | Non menacé                        | X           | 2018                 |
| <i>Eptesicus serotinus</i>      | Sérotine commune     | PN         | Annexe IV          | Non menacé            | Vulnérable                        | X           | 2021                 |
| <i>Myotis alcathoe</i>          | Murin d'Alcathoe     | PN         | Annexe IV          | Non menacé            | Données insuffisantes             |             | 2012                 |

|                                  |                                    |    |                |              | es           |   |      |
|----------------------------------|------------------------------------|----|----------------|--------------|--------------|---|------|
| <i>Myotis bechsteinii</i>        | Murin de Bechstein                 | PN | Annexe II & IV | Quasi-menacé | Quasi-menacé | X | 2021 |
| <i>Myotis daubentonii</i>        | Murin de Daubenton                 | PN | Annexe IV      | Non menacé   | Quasi-menacé | X | 2021 |
| <i>Myotis emarginatus</i>        | Vespertilion à oreilles échancrées | PN | Annexe II & IV | Non menacé   | Non menacé   | X | 2021 |
| <i>Myotis myotis</i>             | Grand Murin                        | PN | Annexe II & IV | Non menacé   | Quasi-menacé | X | 2021 |
| <i>Myotis mystacinus</i>         | Murin à moustaches                 | PN | Annexe IV      | Non menacé   | Non menacé   |   | 2021 |
| <i>Myotis nattereri</i>          | Murin de Natterer                  | PN | Annexe IV      | Non menacé   | Non menacé   | X | 2021 |
| <i>Pipistrellus sp.</i>          |                                    | PN |                |              |              |   | 2020 |
| <i>Pipistrellus pipistrellus</i> | Pipistrelle commune                | PN | Annexe IV      | Non menacé   | Quasi-menacé | X | 2009 |
| <i>Plecotus auritus</i>          | Oreillard septentrional            | PN | Annexe IV      | Non menacé   | Quasi-menacé |   | 2021 |
| <i>Plecotus austriacus</i>       | Oreillard gris                     | PN | Annexe IV      | Non menacé   | Non menacé   |   | 2009 |
| <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> | Grand Rhinolophe                   | PN | Annexe II & IV | Quasi-menacé | Non menacé   | X | 2021 |
| <i>Rhinolophus hipposideros</i>  | Petit Rhinolophe                   | PN | Annexe II & IV | Non menacé   | Quasi-menacé | X | 2021 |





Figure 31. Evolution des effectifs des espèces de Chiroptères de 1983 à 2017 - RNR "Coteau et prairies des Caforts"

De la même manière, les effectifs des trois espèces dominantes entre 1983 et 2021 peuvent être comparés :



Depuis 1999 (mais avec une véritable augmentation à partir de 2004), les effectifs de Murin à oreilles échancrées sont dans une dynamique positive. En 2021 pour la dernière année de mise en œuvre du plan de gestion, les effectifs sont en légère baisse par rapport à l'année record de 2020 (367 individus contre 343 cette année). En Sarthe, c'est actuellement l'espèce la plus couramment observée lors des suivis hivernaux et à l'échelle régionale, les effectifs tendent à croître depuis une vingtaine d'années. La croissance de cette espèce n'a donc rien de surprenant au sein de la RNR des Caforts.

A l'échelle des Pays de la Loire, les effectifs de l'espèce tendent à croître depuis une vingtaine d'années comme nous le montre le graphique 12. La croissance de cette espèce n'a donc rien de surprenant au sein de la RNR des Caforts.




Figure 33. Evolution des effectifs de Murin à oreilles échancrées en Pays de la Loire au cours de ces 20 dernières années (Source : Marchadour, 2016)



A l'inverse, la grande majorité de la colonie de grands rhinolophes est partie depuis le début des années 2000, et il ne reste aujourd'hui qu'une petite dizaine d'individus observés chaque hiver. Ceux-ci passent désormais l'hiver dans la cavité des Piliers, située à côté.

Enfin, la population de Grand Murin semble être en hausse faible, mais constante depuis le milieu des années 2000, avec 19 individus observés en 2021. L'ensemble des autres espèces est relativement peu représenté, avec quelques individus contactés chaque année. On notera la présence un peu plus prononcée que les autres du Murin de Daubenton, fluctuant entre 10 et 20 individus par an.

Ces phénomènes de diminution et d'augmentation des effectifs pourraient être expliqués par différents facteurs comme un changement dans la disponibilité en proies, des modifications de températures ou d'hygrométrie au sein des cavités.

### **Suivi annuel des cavités voisines de la RNR**

Le site du Port des Roches, avec son réseau très dense de galeries, offre la possibilité aux populations de changer de site d'hibernation d'une année à l'autre. Afin de mieux évaluer l'intérêt de ce site, de mettre en évidence les mouvements de populations et de comprendre les apparitions/disparitions éventuelles de groupes d'individus, l'ensemble des cavités du site bénéficie d'un suivi annuel.



Figure 34. Essaim de Grands rhinolophes (*Rhinolophus ferrumequinum*), en hibernation dans la champignonnière des Piliers

Tableau 10. Nombre d'individus cumulé dans les cavités voisines des Caforts, entre 2016 et 2021

| Espèce                              | Nom vernaculaire            | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Barbastella barbastellus</i>     | Barbastelle commune         | 1           | 2           | 1           | 3           | 0           | 0           |
| <i>Eptesicus serotinus</i>          | Sérotine commune            |             | 7           |             | 5           | 0           | 0           |
| <i>Myotis bechsteinii</i>           | Murin de Bechstein          | 2           | 7           | 3           | 0           | 1           | 3           |
| <i>Myotis daubentonii</i>           | Murin de Daubenton          | 17          | 13          | 30          | 24          | 16          | 8           |
| <i>Myotis emarginatus</i>           | Murin à oreilles échancrées | 251         | 319         | 291         | 325         | 265         | 245         |
| <i>Myotis myotis</i>                | Grand Murin                 | 61          | 50          | 34          | 47          | 29          | 41          |
| <i>Myotis mystacinus</i>            | Murin à moustaches          | 196         | 153         | 179         | 195         | 199         | 164         |
| <i>Myotis nattereri</i>             | Murin de Natterer           | 4           | 6           | 3           | 6           | 3           | 3           |
| <i>Myotis sp.</i>                   |                             |             | 1           | 3           | 2           | 1           | 3           |
| <i>Nyctalus sp.</i>                 |                             |             |             |             | 1           | 0           | 0           |
| <i>Pipistrellus pipistrellus</i>    | Pipistrelle commune         |             |             |             |             | 0           | 0           |
| <i>Pipistrellus sp.</i>             |                             |             | 6           | 12          | 2           | 5           | 4           |
| <i>Plecotus auritus</i>             | Oreillard roux              | 9           | 1           |             | 11          | 5           | 1           |
| <i>Plecotus austriacus</i>          | Oreillard gris              | 2           | 2           |             |             | 0           | 0           |
| <i>Plecotus sp.</i>                 |                             |             | 9           | 4           | 4           | 0           | 0           |
| <i>Rhinolophus ferrumequinum</i>    | Grand rhinolophe            | 560         | 548         | 488         | 472         | 460         | 637         |
| <i>Rhinolophus hipposideros</i>     | Petit rhinolophe            | 49          | 87          | 110         | 59          | 75          | 129         |
| <b>TOTAL (sans RNR des Caforts)</b> |                             | <b>1152</b> | <b>1211</b> | <b>1158</b> | <b>1156</b> | <b>1059</b> | <b>1238</b> |
| <b>TOTAL (avec RNR des Caforts)</b> |                             | <b>1502</b> | <b>1573</b> | <b>1491</b> | <b>1566</b> | <b>1502</b> | <b>1640</b> |

Les effectifs de Chiroptères hivernants affichent un record pour la dernière année de mise en œuvre du plan de gestion 2016-2021, avec 1640 individus contactés sur l'ensemble des cavités prospectées du Port des Roches. Ce chiffre est principalement conditionné par la hausse importante du nombre de Grands Rhinolophes (+28% par rapport à 2020) aux Piliers. En 2021, les Murins à oreilles échancrées semblent avoir préféré la cavité des Caforts (effectifs en hausse) au détriment des autres abris.

A noter par ailleurs une baisse chez le Murin de Daubenton qui est également à souligner (2021 étant l'année la moins bonne depuis la mise en place du suivi). Le Petit Rhinolophe qui avait des effectifs déjà en hausse l'an dernier, continue d'augmenter de manière significative (135 individus en 2021 contre 79 en 2020).

N.B : Le coteau du Port des Roches est considéré comme l'un des 6 sites majeurs d'hivernation du Grand Rhinolophe (*Rhinolophus ferrumequinum*) à l'échelle des Pays de la Loire (Marchadour 2016).

| <b>Formulation<br/>2/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Pertinence<br/>3/3</b>                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formulation de l'opération : les fiches SE 5 et SE 6 ont été fusionnées lors de l'évaluation à mi-parcours. Les objectifs sont imprécis, cette action de suivi ne permettant pas de manière directe d'assurer la conservation des chiroptères. Les indicateurs de résultat sont à revoir ; la pertinence d'un suivi d'espèces n'étant pas conditionnée aux chiffres obtenus. Pour le prochain plan de gestion, d'autres indicateurs seront proposés.                                                                                                                                                                      | Suivis pertinents pour surveiller l'évolution des effectifs de chiroptères dans et hors RNR. |
| <b>Efficacité<br/>3/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Efficienne<br/>3/3</b>                                                                    |
| Un rapport a été produit chaque année avec une analyse de l'évolution des effectifs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Action efficiente avec un coût ajusté et cohérent par rapport à l'action et aux objectifs.   |
| <b>Synthèse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |
| <p>Le suivi a été réalisé chaque année, dans des conditions optimales et aux bonnes périodes. Les effectifs sont toujours dans une tendance à la hausse depuis 2016, expliqués par la hausse du nombre de murins à oreilles échancrées. Les autres espèces ont des effectifs beaucoup plus faibles sur la RNR, notamment le Grand rhinolophe qui hiverne principalement aux Piliers et non sur la RNR. Globalement sur l'ensemble du réseau de cavités, le Grand rhinolophe est cependant en hausse.</p> <p>Le suivi est pertinent et doit être maintenu dans le prochain plan de gestion sur l'ensemble des cavités.</p> |                                                                                              |

## OBJECTIFS DE L'OPERATION, RESULTATS ATTENDUS ET MODE OPERATOIRE

Ce suivi a pour objectif la conservation des populations de Chiroptères en cherchant des gîtes de parturition à proximité du coteau du Port des roches. Cela permet de préserver la reproduction des colonies d'espèces anthropophiles comme le Grand Rhinolophe (*Rhinolophus ferrumequinum*) ou le Murin à oreilles échancrées (*Myotis emarginatus*).

## Localisation

Emprise de la commune de Luché-Pringé

|                                                                                                                                                                                                 | 2016 | 2017     | 2018    | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|------|------|------|
| Période d'intervention                                                                                                                                                                          | -    | Reportée | Annulée |      |      |      |
| Réalisation                                                                                                                                                                                     | 0%   | 0%       |         |      |      |      |
| Opérateurs                                                                                                                                                                                      |      |          |         |      |      |      |
| CEN Pays de la Loire, CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir, Chambre d'agriculture                                                                                                               |      |          |         |      |      |      |
| Méthodologie/protocole                                                                                                                                                                          |      |          |         |      |      |      |
| Prendre contact avec l'ensemble des agriculteurs et propriétaires de bâtiments susceptible d'accueillir des colonies de parturition en période estivale.                                        |      |          |         |      |      |      |
| Indicateurs de résultat                                                                                                                                                                         |      |          |         |      |      |      |
| - Localisation de colonies de parturition à proximité de la RNR, protection des sites par conventionnement avec les propriétaires ou rédaction d'Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope. |      |          |         |      |      |      |
| Evaluation de l'opération                                                                                                                                                                       |      |          |         |      |      |      |
| Synthèse budgétaire de l'opération (2016 - 2021)                                                                                                                                                |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                 | 2016 | 2017     | 2018    | 2019 | 2020 | 2021 |
| Nombre de jours                                                                                                                                                                                 |      | 10       | Annulée |      |      |      |
| Budget prévisionnel                                                                                                                                                                             | -    | 2 000 €  |         |      |      |      |
| Budget réel                                                                                                                                                                                     | -    | 0 €      |         |      |      |      |
| Taux de réalisation : 0%                                                                                                                                                                        |      |          |         |      |      |      |

## Mise en œuvre et synthèse de l'action

Après réflexion, rechercher des colonies de mise-bas sur un territoire aussi restreint que celui de la RNR, ne semble pas pertinent. En effet, cette recherche de colonies doit s'effectuer sur l'ensemble de la vallée du Loir, les colonies de mise-bas ne sont pas forcément à proximité immédiate des colonies d'hivernage, c'est la ressource trophique qui importe aux Chiroptères (Marek Banasiak, Com. pers.). De plus, le suivi a été reporté en 2017 du fait de la perte de compétences internes au Conservatoire. L'opération a été définitivement annulée ensuite. Des études sur les chiroptères sont effectuées par le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir dans le secteur, à l'échelle de la vallée du Loir. Une concertation doit être faite afin de coordonner les actions et d'échanger les informations, comme c'est déjà le cas pour les sites d'hivernage.

| Formulation<br>3/3 | Pertinence<br>1/3                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Opération annulée car jugée non pertinente en raison de l'échelle géographique retenue. Une opération au niveau de toute la vallée du loir eut été plus pertinente. |



| Effacité<br>1/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Efficiency<br>2 /3                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Action non réalisée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Action non prioritaire et non réalisée, sans budget dépensé. |
| Synthèse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |
| Jugée non pertinente, l'opération a été reportée en 2017 puis définitivement annulée. Une réflexion plus globale à l'échelle de la vallée du Loir est à mener, notamment en lien avec le CPIE vallées de la Sarthe et du Loir qui effectue des actions sur ce taxon et qui est animateur du site Natura 2000 concerné (vallée du Loir de Vaas à Bazouges). |                                                              |


|                                                                        |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SE 11</b>                                                           | <b>EFFECTUER UN SUIVI ACOUSTIQUE DES POPULATIONS DE CHIROPTERES DANS LE PERIMETRE DE LA RNR</b> |
| <b>OBJECTIFS DE L'OPERATION, RESULTATS ATTENDUS ET MODE OPERATOIRE</b> |                                                                                                 |

Ce suivi a pour objectif d'apporter des éléments de réponse quant à l'activité estivale des Chiroptères de la Réserve. Il consiste en la pose d'un enregistreur passif SM3BAT sur la falaise du coteau. L'enregistrement des ondes émises par les Chiroptères permet d'étudier leurs passages durant l'été et d'identifier les différentes espèces

#### Localisation



 Emplacement de l'enregistreur SM3  
 Limites de la RNR




**Conservatoire  
d'espaces naturels  
Pays de la Loire**

Sources : Google maps 2022, CEN  
Production : A. Avrilla, 2022

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2016                                                                                                                                                                                                                                  | 2017     | 2018     | 2019    | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|------|------|
| Période d'intervention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Printemps et été                                                                                                                                                                                                                      | Reportée | Reportée | Annulée |      |      |
| Réalisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100%                                                                                                                                                                                                                                  | 0%       | 0%       |         |      |      |
| Opérateurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |         |      |      |
| CEN Pays de la Loire, CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir, ONF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |         |      |      |
| Méthodologie/protocole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |         |      |      |
| <p>Suivi acoustique temporel des chiroptères de la RNR :</p> <p>Des enregistreurs (SM3) seront disposés à trois périodes de l'année sur des secteurs favorables de la RNR, une semaine au printemps, une semaine en juillet et une semaine en septembre. Les enregistrements seront traités avec le logiciel Batsound et les données collectées devront être transmises à des experts pour authentifier les déterminations sonores.</p> |                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |         |      |      |
| Indicateurs de résultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |         |      |      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Maintenir le protocole standardisé sur les 6 ans du plan, détecter de nouveaux potentiels pour la réserve (couloir de migration) et de nouvelles espèces indétectables en hiver comme certaines espèces de pipistrelles ou de murins. |          |          |         |      |      |
| Synthèse budgétaire de l'opération (2016 - 2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2016                                                                                                                                                                                                                                  | 2017     | 2018     | 2019    | 2020 | 2021 |
| Nombre de jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,5                                                                                                                                                                                                                                   | 2,5      | 2,5      | Annulée |      |      |
| Budget prévisionnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000 €                                                                                                                                                                                                                               | 1 000 €  | 1 000 €  |         |      |      |
| Budget réel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000 €                                                                                                                                                                                                                               | 0 €      | 0 €      |         |      |      |
| Taux de réalisation : 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |         |      |      |

### Mise en œuvre et synthèse de l'action

Le suivi acoustique des populations de Chiroptères a été réalisé uniquement en 2016. Il avait pour objectif d'apporter des éléments de réponse quant à l'activité estivale des chiroptères au sein de la Réserve. Une synthèse de l'analyse est présentée à suivre.

**Tableau 11. Résultats de l'action (2016)**

| Espèces                                          | Nombre de séquences | Espèces                                                   | Nombre de séquences |
|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| <i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774) | 350,2               | <i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1817)                   | 492,2               |
| <i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)      | 1696,4              | <i>Pipistrellus kuhlii/nathusii</i>                       | 71,4                |
| <i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)           | 22,1                | <i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839) | 2,5                 |
| <i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)           | 833                 | <i>Pipistrellus</i> (Schreber, 1774)                      | 5494,6              |
| <i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806)    | 462,4               | <i>Plecotus sp.</i>                                       | 1,4                 |
| <i>Myotis</i> (Borkhausen, 1797)                 | 241,4               | <i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758)                  | 26,3                |
| <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)             | 40,8                | <i>Rhinolophus euryale/hipposideros</i>                   | 15                  |
| <i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)            | 382,57              | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)         | 252,5               |
| <i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)         | 654,6               | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)         | 180                 |
| <i>Nyctalus noctula/leisleri</i>                 | 8,25                |                                                           |                     |
| <b>Total du nombre de séquences</b>              |                     | <b>11 227,62</b>                                          |                     |

Le coteau est caractérisé par une richesse spécifique diversifiée, avec 15 espèces identifiées en l'espace de 12 nuits.

Parmi les indices utilisés, on note une forte activité des noctules, espèces peu communes en Sarthe. Les contacts ayant lieu très tôt en soirée ainsi qu'en fin de nuit. Cela suggère la présence d'une ou plusieurs colonies à proximité de la Réserve.

Enfin, aucune séquence ne permet de certifier le passage du Rhinolophe euryale (*Rhinolophus euryale*) dans la Réserve. En effet, plusieurs séquences (15 au total) auraient pu s'apparenter à cette espèce, mais ces dernières restent trop semblables de celles du Petit Rhinolophe (*Rhinolophus hipposideros*) pour permettre une confirmation. De même, malgré quelques espoirs lors des premières analyses, aucune séquence ne certifie la présence de la Pipistrelle pygmée (*Pipistrellus pygmaeus*) sur le coteau des Caforts.

| <b>Formulation<br/>2/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Pertinence<br/>3/3</b>                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A noter une erreur de projection au sujet de la cartographie de la cavité, celle-ci avait été orientée au nord-est lors des précédents plans de gestion, alors qu'elle est en réalité orientée sur un axe nord-sud entre le puits d'aération et l'entrée principale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cette action est pertinente pour mieux connaître l'utilisation du site par les chiroptères en été. |
| <b>Efficacité<br/>2/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Efficienne<br/>2/3</b>                                                                          |
| Action efficace en 2016, mais malheureusement reportée puis définitivement annulée ensuite. Il aurait été pertinent de faire appel à une structure extérieure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Action relativement efficiente au regard des résultats et du faible budget consacré.               |
| <b>Synthèse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |
| 15 espèces différentes sont contactées en 2016. Les contacts au crépuscule et peu avant l'aube suggèrent la présence de colonies de reproduction à proximité de la RNR. Le suivi n'a pas été reconduit les années suivantes, faute de compétence en interne. Même si la RNR n'a pu bénéficier que d'une année d'inventaire acoustique, cette action fut pertinente et efficiente au regard du nombre d'espèces détectées et du budget alloué. Il est cependant regrettable de ne pas avoir pu reconduire cette action, afin de lever des doutes sur l'identification de certaines espèces, d'obtenir plus d'informations sur l'utilisation du site pour s'alimenter et ses potentiels en tant que couloir de migration. |                                                                                                    |

## Synthèse de l'objectif opérationnel B.1

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                 |            |             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Objectif opérationnel B.1     | Assurer la conservation des populations de Chiroptères dans et hors de la RNR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                 |            |             |
| Suivis                        | SE 5 ; SE 10 ; SE 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                 |            |             |
| Résultats                     | Maintien voire augmentation des populations de Chiroptères                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                 |            |             |
|                               | Augmentation des connaissances sur les Chiroptères hors de la RNR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |            |             |
|                               | Découverte de site de parturition à proximité de la RNR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                 |            |             |
| Analyse de l'objectif du plan | <b>Analyse au regard des enjeux du plan de gestion en cours</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | <b>Analyse au regard des objectifs et actions mis en place dans le plan de gestion en cours</b> |            |             |
|                               | Formulation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pertinence | Résultats                                                                                       | Efficacité | Efficiences |
|                               | 2/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2/3        | 2/3                                                                                             | 2/3        | 2/3         |
|                               | <b>Synthèse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                 |            |             |
|                               | <p>Il paraît difficile d'assurer la conservation des populations de Chiroptères sur les sites hors RNR, sans maîtrise d'usage. L'objectif opérationnel aurait pu être formulé différemment, avec une approche de conservation uniquement pour la RNR, et une approche connaissance voire sensibilisation auprès des propriétaires de cavités avoisinantes.</p> <p>L'objectif de maintien des chiroptères de la cavité est atteint, sans nécessiter d'action de gestion particulière pour y parvenir. La connaissance hors RNR est actualisée chaque année pour les sites connus, mais des prospections pourraient être menées pour en découvrir de nouveaux. Les sites de reproduction n'ont pas été prospectés, l'échelle de recherche initialement prévue n'étant pas adaptée. Les données concernant l'utilisation de la RNR comme site de chasse sont encore lacunaires.</p> |            |                                                                                                 |            |             |

## Synthèse de l'objectif à long terme B

### OLT B - Maintenir et conserver les populations de Chiroptères

#### OBJECTIFS ET OPERATIONS ASSOCIEES

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objectifs opérationnels         | <p><b>B.1 – Assurer la conservation des populations de Chiroptères dans et hors de la RNR</b></p> <p><b>Afin de conserver les populations de Chiroptères, l'action du CEN Pays de la Loire, outre le maintien d'une vigilance régulière visant à s'assurer du maintien de la quiétude de la cavité, visera principalement l'amélioration des connaissances.</b></p>                                                                                                                                                                  |
| Problématique (PdG 2016 - 2021) | <p><b>Il s'agit en particulier de poursuivre les dénombrements hivernaux, mais aussi d'améliorer les connaissances sur la présence d'éventuelles colonies de reproduction dans ou à proximité de la RNR et sur le rôle de la RNR et de ses abords comme territoire de chasse pour ces espèces.</b></p>                                                                                                                                                                                                                               |
| Synthèse de l'OLT               | <p><b>Les études et prospections menées à cette fin seront par ailleurs l'occasion de sensibiliser élus et riverains à l'enjeu de préservation des Chiroptères</b></p> <p>L'objectif à long terme est considéré rempli pour la RNR. Le maintien des populations de Chiroptères est dépendant du choix de la cavité d'hivernage pour ces espèces et des conditions abiotiques de la cavité (hygrométrie, température, aération), lesquelles n'ont pas changé. Hors RNR, des efforts sont à effectuer pour tendre vers l'objectif.</p> |



### **C.2.2.3. OLT C - Maintenir une mosaïque paysagère riche et diversifiée**

Objectif opérationnel C.1 - Conserver le patrimoine bocager et les éléments qui lui sont liés (arbres isolés, arbres têtards...)

## TE 9

## ENTREtenir LE LINEAIRE DE HAIES, LES ARBRES ISOLEs ET LES ARBRES TETARDS

### OBJECTIFS DE L'OPERATION, RESULTATS ATTENDUS ET MODE OPERATOIRE

**Objectif :** Recéper la haie située au bord de la route, car elle commence à dépérir et à apporter de l'ombre aux parties basses du coteau. Cela permettra aussi d'éviter qu'elle n'impacte la voirie (chute de branche) ou la ligne téléphonique. Entretenir les arbres têtards et les arbres isolés pour augmenter le potentiel d'accueil pour les insectes et les chiroptères.

**Description de l'opération :** Recépage de la haie, coupe des arbres ou branches susceptibles de tomber sur la ligne téléphonique ou sur la route, évacuation des produits de coupe et travail avec la Commune et les entreprises spécialisées pour la dépose de la ligne téléphonique en pied de coteau.


Dans le but de maintenir et de recréer un linéaire de haies (ripisylves à Frêne têtard), des arbres ont été plantés dans la prairie humide de la RNR en 2009-2010.

Ces arbres sont susceptibles de présenter un fort potentiel d'accueil pour les insectes saproxyliques et les Chiroptères. Il est nécessaire de les entretenir par une taille de formation.

De plus, une coupe d'entretien sera effectuée sur les rejets de la partie coteau. De plus, il est prévu la création de nouveaux arbres têtards ainsi qu'un suivi de la présence ou non d'insectes saproxyliques et de Chiroptères.

NB : suite à la révision à mi-parcours du plan de gestion, les actions TE 9 et TE 10 ont été fusionnées en cette unique action TE 9 (entretien des haies et taille des arbres).

### Localisation




#### Légende

- Périmètre du site
- Linéaire de haie à entretenir
- Arbres isolés
- Arbres têtards

0 50 100 150 200 m

Source : BD Ortho 2015  
Elaboration : L. Gaffé - CEN PDL - Juin 2018  
Logiciel : Qgis 3.0.1



 Conservatoire  
d'espaces naturels  
Pays de la Loire

Carte 14. TE 9 : entretien des arbres isolés et des haies

|                                |         | 2016        | 2017                                                                    | 2018 | 2019     | 2020 | 2021     |
|--------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|
| <b>Périodes d'intervention</b> |         | 7 - 11 nov. | Action de taille des arbres reportée.<br>Entretien des haies non prévu. |      | Décembre | -    | Décembre |
| <b>linéaire</b>                | prévu   | 170 m       |                                                                         |      | 240 m    | -    |          |
|                                | réalisé | 170 m       |                                                                         |      | 240 m    | -    |          |
| <b>Réalisation</b>             |         | 100 %       | 0 %                                                                     | 0 %  | 100 %    | -    | 100 %    |
| <b>Opérateur</b>               |         |             |                                                                         |      |          |      |          |
| AISP                           |         |             |                                                                         |      |          |      |          |

### Synthèse budgétaire de l'opération

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 2016   | 2017  | 2018 | 2019     | 2020 | 2021    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|------|----------|------|---------|
| Budget prévisionnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CEN        | 800 €  | 800 € | -    | 940 €    | -    | 940 €   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prestation | 5000 € | 380 € | -    | 680 €    | -    | 2 500 € |
| Budget réel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CEN        | 800 €  | 0 €   | -    | 1 000 €  | -    | 1 000 € |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prestation | 4900 € | 0 €   | -    | 702,90 € | -    | 2 472 € |
| <b>Commentaire sur la mise en œuvre et les résultats</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |        |       |      |          |      |         |
| <p>En 2016, un recépage complet de la haie du bas du coteau a eu lieu. Le chantier a duré une semaine avec une équipe de 12 salariés du chantier d'insertion (AISP). Pour cette opération, une réunion préparatoire avec le gestionnaire du réseau téléphonique (Orange), le Conseil départemental de la Sarthe et le Conservatoire a eu lieu le 18 octobre 2016.</p> <p>En 2017 et 2018, aucune action d'entretien des haies n'était prévue. L'action de taille des arbres est reportée.</p> <p>En 2019, l'opération est orientée sur la gestion de la ripisylve le long du ruisseau l'Organne qui traverse la RNR, ainsi que sur la taille de la haie du coteau.</p> <p>En 2021, l'opération s'est portée sur la taille des arbres isolés et/ou têtards présents le long de l'Organne. L'action s'est terminée en février 2022.</p> |            |        |       |      |          |      |         |
| <b>Indicateurs</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |       |      |          |      |         |
| <b>Indicateurs de pression (IP)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 2016   | 2017  | 2018 | 2019     | 2020 | 2021    |
| IP19 : Conservation et rajeunissement des linéaires de haies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |       |      |          |      |         |
| IP20 : Traitement d'au moins 80% du linéaire de haies en six ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |       |      |          |      |         |
| IP21 : Taille en têtard présentant les caractéristiques de ce type d'entretien et évacuation de la biomasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |        |       |      |          |      |         |
| IP22 : Entretien des jeunes arbres plantés lors du premier plan de gestion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |       |      |          |      |         |
| <b>Indicateurs d'état (IE)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 2016   | 2017  | 2018 | 2019     | 2020 | 2021    |
| IE18 : Régression de 50% au moins des surfaces fortement colonisées par l'Ortie dioïque et la Clématite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |        |       |      |          |      |         |
| IE 19 : Présence d'insectes saproxyliques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |        |       |      |          |      |         |
| <b>Taux de réalisation : 75%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |       |      |          |      |         |

## **Indicateurs :**

### ➤ **IP19 : Conservation et rajeunissement des linéaires de haies / IP 20 : traitement d'au moins 80% du linéaire de haies en 6 ans**

Les indicateurs de pression IP19 et IP20 évaluent l'entretien des haies. Cette opération était prévue en 2016 et en 2019, elle a été réalisée avec succès. 170m de haie ont été recépés en 2016, et 240m en 2019 (le long de l'Organne et en bas de coteau). L'objectif est donc atteint.

### ➤ **IP21 : Taille en têtard présentant les caractéristiques de ce type d'entretien et évacuation de la biomasse / IP22 : Entretien des jeunes arbres plantés lors du premier plan de gestion**

L'action n'est pas annuelle, mais nécessite tout de même d'être effectuée de manière régulière. Elle a été reportée en 2017 et 2018, mais a pu être mise en œuvre à l'hiver 2021-2022. Les jeunes arbres plantés, certaines branches de taille imposante au niveau de la ripisylve de l'Organne et les têtards ont pu être taillés avec succès. L'action a été finie en février 2022.

➤ **IE18 : Régression de 50% au moins des surfaces colonisées par l'Ortie dioïque et la Clématite.**

L'indicateur IE18 est évalué par le suivi phytosociologique SE 1 et plus particulièrement par la placette n° 7 (ancienne placette n°8). Pour cette analyse, on considère l'année 2016 comme le point de référence concernant l'objectif de régression.

**Tableau VI : résultats du suivi phytosociologique (placette 7) concernant la Clématite et l'ortie dioïque entre 2016 et 2021**

| Indice d'abondance-dominance<br>Placette N° 7 (anc. 8) |                    |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Noms latins                                            | Noms vernaculaires | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| <i>Urtica dioica</i>                                   | Ortie dioïque      | 2    |      |      | 1    | 1    |      |
| <i>Clematis vitalba</i>                                | Clématite          | 3    | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    |

En 2016, le pourcentage de recouvrement de l'Ortie dioïque était compris entre 5 et 25% en 2016 (indice 2). Depuis 2017 le taux de recouvrement est très faible, soit nul (2017, 2018, 2021) soit inférieur à 5% (2019-2020).

Concernant la Clématite, son pourcentage de recouvrement était de 25 et 50 % (indice 3) en 2016. Le recouvrement a ensuite diminué progressivement pour se stabiliser à un indice de 1 ou moins, cela correspond à un pourcentage de recouvrement inférieur à 5%.

L'objectif de réduire les surfaces colonisées par l'Ortie et la clématite d'au moins 50 % est donc atteint, en prenant pour points de comparaison la première et la dernière année du plan de gestion.

➤ **IE19 : Présence d'insectes saproxyliques**

La présence d'un cortège intéressant d'insectes saproxyliques est avérée sur les haies et les arbres isolés de la RNR. L'action RE3 donne les détails de l'étude.

| Formulation<br>2/3                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pertinence<br>3/3                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TE 9 et TE 10 ont été fusionnés pour des questions pratiques.<br>L'indicateur IE18 ne précise pas l'année de référence (pas de suivi en 2015).                                                                                                                                           | Les haies et les têtards représentent des enjeux importants, identifiés notamment grâce à l'inventaire des saproxyliques (RE3,IE19). Gérer les haies permet également de ne pas empiéter sur les surfaces ouvertes ou au niveau du câblage du réseau téléphonique. L'action est donc pertinente. |
| Efficacité<br>2/3                                                                                                                                                                                                                                                                        | Efficiace<br>3/3                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Action relativement efficace même si un report à eu lieu sur 2 années consécutives.<br>En 2021 tous les indicateurs de pression et d'état sont au vert.                                                                                                                                  | Coût cohérent par rapport aux résultats.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Synthèse                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Action prioritaire, pertinente et à maintenir. Le report de la taille des têtards et des jeunes arbres en 2017 et 2018 est regrettable. En 2021 et au terme de ce plan de gestion, le bilan est globalement positif avec des voyants au vert pour les indicateurs de pression et d'état. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



Objectif C1 : Conserver le patrimoine bocager et les éléments qui lui sont liés (arbres isolés, arbres têtards,...)

La RNR possède un patrimoine naturel et bocager indéniable. Les boisements humides et les haies sont connus pour être des habitats favorables aux Coléoptères, particulièrement aux espèces saproxylophages. N'ayant en 2015 qu'une faible connaissance de ce groupe taxonomique sur le site, nous proposons de mener un inventaire. Celui-ci a lieu en 2020, afin que la stratégie de gestion puisse être adaptée en fonction des résultats lors de l'élaboration du 3ème plan de gestion en 2021/2022.

#### Localisation




Figure 35. Carte de localisation des pièges (réalisation GRECIA, 2020)

| Fréquence d'intervention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ponctuelle, en 2020 : 15 avril, 9 juin et 17 juillet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opérateurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRECIA, CEN Pays de la Loire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Méthodologie/protocole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><i>Méthodologie tirée du rapport correspondant du GRECIA (Herbrecht et al., 2021) :</i></p> <p>La méthode consacrée à l'étude des coléoptères saproxyliques forestiers mise au point par H. Brustel et déployée, en particulier, par le réseau entomologique de l'ONF, qui intègre un échantillonnage par piégeage étalé sur 3 années consécutives, n'était pas envisageable dans le cas présent. Nous avons donc œuvré sur une seule saison, en 2020, en mixant des moyens de piégeage d'interception passive et de piégeage attractif, complétés par quelques chasses actives lors de nos passages sur le terrain.</p> <p>Protocoles :</p> |

#### Pièges d'interception passive :

Trois pièges Polytrap™ ont été disposés sur le site le 15 avril 2020 et relevés tous les 15 jours par le gestionnaire ou par le GRETIA. Deux pièges ont été disposés sur le coteau, un autre dans la partie basse (alluviale) du site.

#### Pièges attractifs :

Trois pièges aériens attractifs (amorcés à la banane en fermentation) ont de plus été disposés dans le même temps, avec relevés aux mêmes échéances, à raison également de deux unités sur le coteau et une dans la partie alluviale, placées en lisières ensoleillées.

Tri et identifications en laboratoire.

#### Chasses actives :

Trois courtes sessions d'observations directes sur le terrain et de chasses actives ont été réalisées par le GRETIA en complément, selon le temps disponible en dehors de la pose et de la relève des pièges, les 15 avril, 9 juin et 17 juillet 2020. Elles ont eu pour objectifs, notamment, de se faire une idée des ressources trophiques disponibles sur le site à l'égard des espèces anthophiles à l'état adulte, d'inspecter les quelques vieux arbres creux présents et de compléter les captures par des chasses à vue et du battage (utilisation d'une nappe de battage). Quelques photographies ont pu également être réalisées à ces occasions.

| Indicateurs de résultat                                          |      |      |      |      |         |      |
|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---------|------|
| - Production d'une liste des Coléoptères saproxyliques de la RNR |      |      |      |      |         |      |
| Synthèse budgétaire de l'opération (2016 - 2021)                 |      |      |      |      |         |      |
|                                                                  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020    | 2021 |
| Budget prévisionnel CEN                                          | -    | -    | -    | -    | 2 000 € | -    |
| Budget prévisionnel GRETIA                                       | -    | -    | -    | -    | 8 000 € | -    |
| Budget réel CEN                                                  | -    | -    | -    | -    | 2 000 € | -    |
| Budget réel GRETIA                                               | -    | -    | -    | -    | 8 100 € | -    |
| Taux de réalisation : 95%                                        |      |      |      |      |         |      |

### Mise en œuvre et synthèse de l'action

#### **Bref récapitulatif des résultats (Herbrecht et al., 2021) :**

Parmi l'ensemble des insectes capturés ou observés et identifiés dans le cadre de cette étude, 368 individus se rapportent à 85 taxons de coléoptères considérés comme saproxyliques. Parmi ces espèces, 23 sont considérées patrimoniales.

En marge de cette étude, 104 autres insectes sont contactés dont 49 font l'objet d'une première mention pour le site.



Le coteau, plus riche, compte 45 taxons exclusifs (soit 69 % de la richesse qui y a été mise en évidence), alors que la partie basse n'en compte que 21 soit 51 %. Seuls 20 taxons sur 86 ont été observés aussi bien sur le coteau que dans la zone alluviale, en 2020.

Il est par ailleurs tout à fait notable que les taux d'espèces remarquables parmi les espèces exclusives atteignent 38 % dans le cas de la partie alluviale, mais seulement 22 % dans le cas du coteau. Quant aux espèces communes aux deux parties du site, seules, 2 sur 20 sont jugées remarquables. Ainsi, si le coteau apporte nettement plus de richesse et plus d'originalités, la valeur patrimoniale est plus équilibrée entre les deux entités, la partie alluviale en apportant indéniablement une part significative.




Figure 36. Représentativité des espèces observées dans les deux entités du site. Source : rapport GRECIA

Bien que ne présentant pas de limites, la réserve des Caforts recèle d'incontestables enjeux en matière de coléoptères saproxyliques reposant sur :

- une richesse désormais avérée, certes encore limitée, mais relativement significative,
- la présence d'espèces remarquables, voire très intéressantes, en particulier *Anthaxia candens*, *Saperda punctata*, *Elatér ferrugineus*, *Procræus tibialis*, *Liocola marmorata* et *Scaphisoma balcanicum*,
- des ressources florales abondantes et diversifiées disponibles pour les taxons anthophiles sur la presque totalité du site (au sein des prairies, ourlets, haies, lisières...),
- des habitats de développement larvaire en l'état actuel assez diversifiés (bien que limités en nombre et en volume comparativement à des milieux forestiers) et quelques essences et conformations très porteuses en ce qui concerne les arbres : omniprésence de l'orme sur le coteau (en pourtour), présence de quelques vieux fruitiers favorables comme des cerisiers sénescents, présence de très gros frênes têtards plus ou moins creux dans la partie basse ainsi que de saules et quelques peupliers sénescents,
- l'insertion du site dans une trame : continuité du coteau, plus ou moins boisé, surplombant une assez vaste zone alluviale accompagnant le ruisseau de l'Organne et s'inscrivant, au-delà, dans le complexe bocager et alluvial de la Vallée du Loir.



Commentaires :

Cette opération était initialement prévue en 2021. Elle a été avancée en 2020 afin d'être réalisée avant la gestion des arbres en 2021.

| <b>Formulation<br/>2/3</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>Pertinence<br/>3/3</b>                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il aurait pu être implémenté un 2 <sup>ème</sup> indicateur de résultat, sur la bio-indication ou du moins les préconisations de gestion (en lien avec l'objectif opérationnel relatif à la conservation du patrimoine bocager). | L'action est cohérente par rapport à l'objectif opérationnel de préservation des éléments du bocage. La gestion pourra s'appuyer sur cette première étude. |
| <b>Efficacité<br/>3/3</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>Efficience<br/>3/3</b>                                                                                                                                  |
| Les résultats sont à la hauteur de ceux espérés, à savoir une amélioration de la connaissance du cortège des coléoptères saproxyliques ainsi que des préconisations de gestion et des orientations d'actions futures.            | Pas de différence de coût significative et résultats validés.                                                                                              |
| <b>Synthèse</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |
| L'action est réussie et s'est avérée pertinente : elle amène une amélioration de la connaissance sur la RNR et des orientations de gestion concrètes pour le prochain plan de gestion.                                           |                                                                                                                                                            |

## Synthèse de l'objectif opérationnel C.1

|                                                                                                    |                                                                                                       |            |                                                                                          |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Objectif opérationnel C.1                                                                          | Conserver le patrimoine bocager et les éléments qui lui sont liés (arbres isolés, arbres têtards,...) |            |                                                                                          |            |            |
| Opérations associées                                                                               | TE9                                                                                                   |            |                                                                                          |            |            |
| Suivis                                                                                             | SE1 (évalué OLT D), RE3                                                                               |            |                                                                                          |            |            |
| Résultats                                                                                          | Maintien des haies (longueur, état de conservation)                                                   |            |                                                                                          |            |            |
|                                                                                                    | Améliorer les connaissances sur la faune inféodée au bocage                                           |            |                                                                                          |            |            |
| Analyse de l'objectif du plan                                                                      | Analyse au regard des enjeux du plan de gestion en cours                                              |            | Analyse au regard des objectifs et actions mis en place dans le plan de gestion en cours |            |            |
|                                                                                                    | Formulation                                                                                           | Pertinence | Résultats                                                                                | Efficacité | Efficience |
|                                                                                                    | 2/3                                                                                                   | 3/3        | 3/3                                                                                      | 2/3        | 3/3        |
|                                                                                                    | Synthèse                                                                                              |            |                                                                                          |            |            |
| Il aurait pu être implémenté un indicateur de réussite sur les arbres têtard et les arbres isolés. |                                                                                                       |            |                                                                                          |            |            |
| L'objectif opérationnel est atteint.                                                               |                                                                                                       |            |                                                                                          |            |            |



## Synthèse de l'objectif à long terme C

### OLT C - Maintenir une mosaïque paysagère riche et diversifiée

#### OBJECTIFS ET OPERATIONS ASSOCIEES

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objectifs opérationnels            | C.1 - Conserver le patrimoine bocager et les éléments qui lui sont liés (arbres isolés, arbres têtards,...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Problématique<br>(PdG 2016 - 2021) | <b>Au-delà de la seule préservation des habitats prioritaires (visés par l'objectif A), on recherchera la conservation d'une matrice paysagère complexe et diversifiée, tenant compte également d'habitats naturels à valeur patrimonial plus faible.</b><br><b>La conservation de cette matrice vise notamment la préservation des habitats à rôle fonctionnel dans l'écosystème, notamment les végétations de transition ou de lisières : ourlets, haies, habitats prairiaux humides (hors mégaphorbiaies). L'objectif pourra être évalué par le suivi d'assemblages d'espèces fortement dépendant de l'éco complexe (Lépidoptères, Syrphes par exemple).</b> |
| Synthèse de l'OLT                  | L'objectif opérationnel et ses actions associées ont permis de répondre en partie à l'objectif à long terme, même si ce dernier va au-delà du simple réseau bocager.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### C.2.2.4. OLT D – Assurer le suivi et l'évaluation des opérations de gestion et approfondir les connaissances sur le fonctionnement du patrimoine

Objectif opérationnel D.1 - Accroître le niveau de connaissance sur la diversité biologique du site tout en assurant un contrôle des groupes bio-indicateurs pour un meilleur suivi des actions de gestions

## SE 1

## Effectuer annuellement un suivi phytosociologique des habitats naturels

## OBJECTIFS DE L'OPERATION, RESULTATS ATTENDUS ET MODE OPERATOIRE

Le suivi phytosociologique a pour objectif de « Surveiller l'évolution des milieux » et d'évaluer leur état de conservation selon la gestion mise en place sur la RNR. Les résultats obtenus permettent donc d'évaluer les effets de la gestion. Ils sont également susceptibles d'expliquer les résultats des suivis des populations d'espèces patrimoniales (SE 2).



- Placettes obsolètes (2016-2018)
- Placettes actuelles (2019-2021)
- Périmètre RNR
- parcelles CEN



0 25 50 m

Conservatoire  
d'espaces naturels  
Pays de la Loire

Sources : Google maps 2021, CEN  
Production : CEN PDL - 2021.

| Periode d'intervention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Juin/juillet | Juin/juillet | Juin/août | Juin/juillet | Avril/juin | 31 mai (passage unique) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|-------------------------|
| Réalisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%         | 100%         | 100%      | 100%         | 100%       | 100%                    |
| <b>Opérateur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |           |              |            |                         |
| CEN Pays de la Loire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |           |              |            |                         |
| <b>Méthodologie/protocole</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |           |              |            |                         |
| Relevés phytosociologiques sur des placettes permanentes de 16 à 100m <sup>2</sup> : inventaire des espèces présentes, attribution de coefficients d'abondance-dominance.                                                                                                                                                                                                                      |              |              |           |              |            |                         |
| Les suivis sont effectués tous les ans, entre avril et août. La détermination des espèces et des habitats a été effectuée à l'aide de différents ouvrages (Baliga <i>et al.</i> , 2006 ; Bissardon & Guibal, 2003 ; Commission européenne DG XI, 1997 ; Coste, 1990, Foucault, 1984 ; Fournier, 1947 ; Guinochet & Vilmorin, 1973-1984 ; Jahns, 1996 ; La documentation française, 2001-2005). |              |              |           |              |            |                         |
| A partir de 2019, 7 placettes subsistent : deux placettes deviennent obsolètes (pas d'action de gestion associée) et sont abandonnées. De plus, la placette 4 située au milieu du secteur 1 est déplacée en secteur 2 (suite à l'acquisition de cette nouvelle parcelle et à la différence de gestion).                                                                                        |              |              |           |              |            |                         |
| <b>Synthèse budgétaire de l'opération (2016 – 2021)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |           |              |            |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2016         | 2017         | 2018      | 2019         | 2020       | 2021                    |
| Nombre de jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5            | 5            | 5         | 5            | 3          | 3                       |
| Budget prévisionnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000 €      | 2 000 €      | 2 250 €   | 2 250 €      | 1 410 €    | 1 410 €                 |
| Budget réel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000 €      | 2 000 €      | 2 250 €   | 2 250 €      | 1 500 €    | 1 500 €                 |
| <b>Taux de réalisation : 100%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |           |              |            |                         |

## Mise en œuvre et synthèse de l'action

Les suivis ont été réalisés systématiquement chaque année.

Chaque relevé se doit d'être effectué sur un emplacement fixe d'une année sur l'autre. À cette fin, leur localisation est marquée sur cartographie SIG, grâce à des coordonnées GPS pouvant être retrouvées sur le terrain.

La méthodologie utilisée est celle mise au point par Braun-Blanquet (1915), visant à établir pour chaque relevé phytosociologique la liste des espèces présentes, et à leur attribuer un coefficient d'abondance-dominance (cf. tableau ci-dessous).

| Coeff. | Recouvrement                             |
|--------|------------------------------------------|
|        |                                          |
| i      | Espèce représentée par un individu isolé |
| +      | Espèce peu abondante                     |
| 1      | < 5 %                                    |
| 2      | 5 à 25 %                                 |
| 3      | 25 à 50 %                                |
| 4      | 50 à 75 %                                |
| 5      | > 75 %                                   |

### Présentation du type de résultats obtenus :

Chaque année, les résultats du suivi sont présentés placette par placette, au regard de la gestion conduite et des objectifs fixés par le Plan de gestion 2016-2021 pour les habitats dans lesquels elles sont localisées.

Un indicateur estimatif de réussite des résultats de la gestion est donné via le code couleur suivant, pour chaque placette :


**Objectif non atteint**

**Objectif atteint**



Un graphique présentant la part relative de chaque habitat au sein de la placette étudiée est présenté (exemple ci-dessous).

- Placette n°1 :



| Objectif de gestion pour 2021                                                  | Gestion 2021   | Indicateur estimatif de réussite en 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|
| Maintien en pelouse du <i>Blackstonia perfoliata</i> - <i>Caricetum flacca</i> | Fauche tardive |                                          |

| Formulation<br>1/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pertinence<br>3/3                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Suite à des adaptations du protocole datant de 2018, deux relevés avaient été modifiés ainsi que leur numéro : le relevé 4 avait changé de localisation, et le relevé n°8 était devenu n°7, l'ancien numéro 7 étant supprimé (cf. carte en début de fiche action). Ce changement de relevé avec réutilisation d'anciens numéros a entraîné des confusions dans les rapports d'activité 2019 et 2020.</p> <p>De plus, la localisation de la placette 6 n'est pas fidèle à la réalité, source d'erreur potentielle d'une année à l'autre et surtout en cas de changement de prospecteur.</p> | <p>Le suivi phytosociologique est tout à fait cohérent avec les objectifs, il s'agit d'un indicateur de premier ordre quant à la gestion même si la RNR gagnerait à un lien plus fort entre ce suivi et les actions de gestion.</p> <p>Il devra être reconduit pour le prochain plan de gestion.</p> |
| Efficacité<br>2/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Efficience<br>3/3                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Les résultats obtenus par ce suivi ont permis d'évaluer la majeure partie des actions de gestion associées ; certains indicateurs n'ont pas été intégrés annuellement aux résultats de ce suivi, notamment IE18 pour TE9, ou IE7 pour TE1.</p> <p>On notera également que les résultats espérés pour certains indicateurs étaient trop ambitieux : certains objectifs sont non adaptés ou difficilement réalisables en quelques années</p>                                                                                                                                                 | <p>Un nombre trop conséquent de jours était alloué à l'opération jusqu'en 2019, il a été revu à la baisse en 2020 (notamment pour la réduction du nombre de placettes).</p>                                                                                                                          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| compte tenu du temps nécessaire à l'évolution naturelle des milieux. Il conviendra de mener une réflexion sur ces objectifs pour déterminer s'ils doivent être maintenus sachant qu'ils ne seront pas atteints avant longtemps ou bien qu'ils ne sont pas atteignables compte tenu des conditions écologiques locales.                                                                                                      |  |
| <b>Synthèse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Le suivi SE1 est à reconduire pour le prochain plan de gestion, il s'agit d'un outil efficace de bio-indication, à condition qu'il soit bien cadré et calibré. Des ajustements seraient à apporter pour le parfaire, notamment la révision du positionnement des placettes si les unités de gestion venaient à changer. Les parcelles acquises en 2017 sont également à prendre en compte pour le prochain plan de gestion. |  |

Le suivi des espèces végétales d'intérêt patrimonial a pour objectif d'acquérir des « connaissances sur l'évolution quantitative des populations d'espèces végétales d'intérêt patrimonial » pour un site donné.

Sur la Réserve « Prairies et coteau des Caforts », le suivi porte sur l'évaluation de l'abondance et de la répartition de 6 espèces à enjeux.

Dont cinq sur le coteau calcaire :

- Le Grémil bleu-pourpre (*Aegonychon purpureocaeruleum*) ;
- L'Ail à tête ronde (*Allium sphaerocephalon*) ;
- L'Œillet des fleuristes (*Dianthus caryophyllus*) ;
- L'Échinops à tête ronde (*Echinops sphaerocephalus*) ;
- La Bugrane jaune (*Ononis natrix*) ;

Et une sur la prairie humide :

- La Valériane dioïque (*Valeriana dioica*).

### Localisation



### LEGENDE

- Flore patrimoniale
- Buglossoides purpureocaerulea
- Ononis natrix
- Allium sphaerocephalon
- Limites RNR Cafort

0 10 20 m



Conservatoire  
d'espaces naturels  
Pays de la Loire

Sources : Google map 2021  
Production : CEN Pays de la Loire, janvier 2022

|                                                                                                                                                                                                                   | 2016                             | 2017                                       | 2018                              | 2019                  | 2020                          | 2021                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Période d'intervention                                                                                                                                                                                            | 14 avril ; 10 juin et 13 juillet | 9 et 26 avril ; 7 et 28 juin et 13 juillet | 18 avril ; 4 et 17 mai et 27 juin | 10 et 28 mai, 26 juin | 09 avril, 18 juin, 02 juillet | 04 mai, 31 mai, 07 juin, 02 juillet |
| Réalisation                                                                                                                                                                                                       | 100%                             | 100%                                       | 100%                              | 100%                  | 100%                          | 100%                                |
| <b>Opérateur</b>                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                            |                                   |                       |                               |                                     |
| CEN Pays de la Loire                                                                                                                                                                                              |                                  |                                            |                                   |                       |                               |                                     |
| <b>Méthodologie/protocole</b>                                                                                                                                                                                     |                                  |                                            |                                   |                       |                               |                                     |
| A l'origine, le plan de gestion prévoit un comptage annuel, systématique et exhaustif des pieds des 6 plantes patrimoniales. Des changements ont eu lieu au cours des 6 ans de mise en œuvre du plan de gestion : |                                  |                                            |                                   |                       |                               |                                     |

Les 6 plantes patrimoniales font l'objet d'un suivi entre 2016 et 2019.

Depuis 2020, l'Œillet des fleuristes (*Dianthus caryophyllus*) et l'Échinops à tête ronde (*Echinops sphaerocephalus*) ne sont plus suivis ; en effet leur caractère subspontané a été vérifié, ce qui amoindrit leur statut de patrimonialité.

Le protocole consiste à passer entre mai et août pendant la période de floraison des espèces.

| Indicateurs de résultat                                                                           |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| - Maintien voire augmentation des stations (surface et nombre) actuelles de plantes patrimoniales |         |         |         |         |         |         |
| Synthèse budgétaire de l'opération (2016 - 2021)                                                  |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                                   | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| Nombre de jours                                                                                   | 5       | 5       | 3       | 3       | 3       | 3       |
| Budget prévisionnel                                                                               | 2 000 € | 2 000 € | 1 410 € | 1 410 € | 1 410 € | 1 410 € |
| Budget réel                                                                                       | 2 000 € | 2 000 € | 1 410 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |
| Taux de réalisation : 100%                                                                        |         |         |         |         |         |         |

### Mise en œuvre et synthèse de l'action

Le suivi des plantes patrimoniales présentes sur la Réserve a été réalisé chaque année, il donne lieu aux résultats suivants :

**Tableau 12. Evolution des effectifs des plantes patrimoniales entre 2014 et 2021**

| Nom scientifique                    | Nom vernaculaire      | 2014  | 2015  | 2016        | 2017 | 2018 | 2019           | 2020 | 2021        | Comparaison entre 2016 et 2021* |
|-------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------------|------|------|----------------|------|-------------|---------------------------------|
| <i>Aegonychon purpureocaeruleum</i> | Grémil bleu-pourpre   | >1000 | >1000 | Estimé >950 | 3033 | 1763 | 1902           | 2462 | <b>2467</b> | <b>X2,45</b>                    |
| <i>Allium sphaerocephalon</i>       | Ail à tête ronde      | -     | -     | 5           | 0    | 6    | 6              | 25   | <b>35</b>   | <b>X 7</b>                      |
| <i>Ononis natrix</i>                | Bugrane jaune         | -     | >200  | 478         | 410  | 497  | 596            | 626  | <b>758</b>  | <b>X1,6</b>                     |
| <i>Valeriana dioica</i>             | Valériane dioïque     | 50    | >50   | 0           | 18   | 23   | 0              | 0    | <b>0</b>    | <b>Disparition ?</b>            |
| <i>Dianthus caryophyllus</i>        | Œillet giroflée       | -     | 146   | 5           | 2    | 8    | Arrêt du suivi |      |             | -                               |
| <i>Échinops sphaerocephalus</i>     | Échinops à tête ronde | 3     | 54    | 249         | 145  | 65   |                |      |             | -                               |

\*Coefficient multiplicateur.

Ce suivi permet de remarquer une augmentation des effectifs de trois plantes patrimoniales : le Grémil-pourpre, l'Ail à tête ronde et le Bugrane jaune. La Valériane dioïque semble avoir disparu du site (les données de 2018, voire de 2017 pourraient être des erreurs d'identification). L'habitat présent (mégaphorbiaie mésotrophe) correspond très peu à son milieu habituel. En l'état actuel et si maintien de ce milieu, il est donc très peu probable de voir réapparaître cette espèce sur la RNR.

L'arrêt des suivis de l'œillet giroflée et de l'Echinops à tête ronde a été acté en raison de leur caractère subspontané.

| Formulation<br>3/3                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pertinence<br>2/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Les intitulés sont bien formulés.</p> <p>A noter que le protocole aurait pu être plus détaillé : plusieurs observateurs se sont succédés au cours des années, ayant pu générer un biais dans les collectes de données.</p>                                                                     | <p>On regrettera le choix de l'indicateur de résultat, non pertinent : l'évaluation de ce suivi ne doit pas s'appuyer sur des données biologiques de terrain. La réussite de sa mise en œuvre est en revanche conditionnée par les dates de passages de l'observateur et le respect du protocole.</p> <p>En outre, le suivi en lui-même est relativement pertinent même si le protocole pourra être allégé dans le prochain plan de gestion : un comptage exhaustif du nombre de pieds est peu réaliste/fiable/pertinent pour le Grémil bleu bleu pourpre et la Bugrane jaune.</p> <p>En outre, l'opération est pertinente vis-à-vis des objectifs même si les résultats de ce suivi peinent à influencer sur les actions de gestion (outil de bio-indication à mieux prendre en compte).</p> |
| Efficacité<br>3/3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Efficience<br>3/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Les résultats obtenus sont à la hauteur de ceux espérés.</p> <p>L'importance du suivi est de connaître l'état des stations de la RNR. Un relevé surfacique avec estimation du nombre de pieds aurait été plus efficace en termes de protocole, pour le Grémil pourpre et la bugrane jaune.</p> | <p>Le suivi paraît en soi efficace compte tenu des résultats obtenus pour l'effort fourni. Les différences de phénologie entre les espèces suivies impliquent un certain nombre de passages annuels qui ne peut pas être réduit.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Synthèse                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Le suivi SE 2 est à reconduire pour le prochain plan de gestion, en l'optimisant sur plusieurs points : protocole présentant plus de détails sur la mise en œuvre, indicateur de résultat cohérent, changement du protocole concernant le Grémil bleu pourpre et la Bugrane jaune.</p>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## OBJECTIFS DE L'OPERATION, RESULTATS ATTENDUS ET MODE OPERATOIRE

**Objectif :** Accroître le niveau de connaissance sur la diversité biologique du site tout en assurant un contrôle des groupes bio-indicateurs pour un meilleur suivi des actions de gestion.

**Description de l'opération :** Papillon protégé et faisant l'objet d'un plan national d'action (CEN PAYS DE LA LOIRE, VANNUCCI. O, MUZZOLINI. C., 2013), l'écologie de l'Azuré du serpolet est assez mal connue sur la RNR (période de ponte, réparation des individus au sein du périmètre, échange avec les métapopulations de l'ensemble du coteau du Port des roches. Enfin, nous connaissons mal les espèces de fourmis présentes sur la RNR qui sont indispensables à son cycle de vie.

## Localisation

- Déploiement du protocole sur l'ensemble du coteau calcaire de la RNR,
- Recherche de nouvelles stations hors RNR dans un rayon de 5000m.



|                        | 2016                                                                                   | 2017 | 2018                          | 2019                                      | 2020 | 2021 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------------------|------|------|
| Période d'intervention | Plusieurs passages entre mi-juin et mi-août (23 juin ; 6, 13 et 28 juillet et 17 août) | -    | 9 passages entre juin et août | Très nombreux passages entre juin et août | -    | -    |
| Réalisation            | 100%                                                                                   | -    | 100%                          | 100%                                      | -    | -    |
| Opérateur              |                                                                                        |      |                               |                                           |      |      |

| CEN Pays de la Loire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |      |         |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|---------|------|------|
| Méthodologie/protocole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |         |         |      |      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comptage des imagos hors et dans la RNR (lien avec SE 7)</li> <li>- Comptage et localisation des pontes selon le protocole de MERCIER, J.-L., LENOIR, A., ERRARD, C., FRESQUET, N., &amp; MORIZET, Y., 2004</li> <li>- Cartographie des stations d'Origan</li> <li>- Protocole de recherche des fourmis hôtes B. KAUFMANN, J-L MERCIER, R. ITRAC-BRUNEAU et G. CHMARGOUNOF (Protocole d'échantillonnage simple permettant d'évaluer la présence et l'importance des <i>Myrmica</i> au sein des communautés de fourmis)</li> <li>- Recherche de nouvelles stations à proximité de la RNR</li> <li>- Etude de la métapopulation par CMR, sur la RNR et sur les stations à proximité</li> </ul> <p>Passage tous les 15 jours de juin à septembre pendant la période d'émergence de l'espèce.<br/>Une réflexion sur les protocoles sera engagée afin de répondre à l'ensemble des interrogations sur l'espèce dans le contexte vallée du Loir (réflexion sur les corridors de la trame sèche).</p> |         |      |         |         |      |      |
| Indicateurs de résultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      |         |         |      |      |
| - Nombre d'individus de <i>Phengaris arion</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |      |         |         |      |      |
| - Augmentation des zones de pontes (stations d'Origan) sur la RNR suite aux travaux de réouverture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |         |         |      |      |
| - Détermination des fourmis hôtes présentes sur la RNR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      |         |         |      |      |
| Synthèse budgétaire de l'opération (2016 - 2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |      |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2016    | 2017 | 2018    | 2019    | 2020 | 2021 |
| Nombre de jours (réel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10      | -    | 9       | 8       | -    | -    |
| Budget prévisionnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 000 € | -    | 3 600 € | 5 510 € | -    | -    |
| Budget réel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 000 € | -    | 3 600 € | 5 510 € | -    | -    |
| Taux de réalisation : 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |      |         |         |      |      |

### Mise en œuvre et synthèse de l'action

Les indicateurs de résultats « Nombre d'individus de *Phengaris arion* » et « Augmentation des zones de pontes (stations d'Origan) sur la RNR suite aux travaux de réouverture » ne sont pas pertinents pour évaluer cette action : cette dernière émet et analyse un résultat, mais sa qualité n'est pas dépendant des caractéristiques des données.

Les fourmis ont été déterminées gracieusement par le laboratoire Antarea, en 2016 et fin 2019 (pour les données de 2018 et 2019).

En 2016, les protocoles prévus sont tous réalisés. Tous les sites potentiels (présence de la plante-hôte) dans un rayon de 5000m autour de la RNR ont été identifiés. Tous n'ont pas pu être prospectés faute de temps (restriction à un rayon de 400m).

Au-delà de l'aspect populationnel, ce suivi a permis de contribuer grandement à la connaissance de l'écologie de l'espèce dans la Réserve, se traduisant par un inventaire myrmécologique et une cartographie de l'Origan commun. Notamment, la fourmi-hôte du papillon semble se cantonner uniquement à la partie nord-ouest du coteau, délaissant une grande partie est du site où l'Origan est pourtant abondant. Les résultats de l'inventaire myrmécologique, cela laisse supposer que le taux de survie des larves n'est pas homogène sur l'ensemble du coteau.

Le suivi de 2018 s'est principalement axé sur le protocole 4 (recherche de stations hors RNR), en effet il est compliqué de statuer sur la population de *P. arion* sur la RNR (qui présente de très faibles effectifs) sans avoir une connaissance plus globale à l'échelle méta populationnelle. Plusieurs stations avec présence de l'espèce ont ainsi été identifiées autour de la RNR. Les protocoles 1 et 2 ont

également été mis en œuvre : 2 observations de l'espèce ont eu lieu sur transects et un inventaire sur les *Myrmica* a été mis en place sur la RNR, mais les résultats n'ont jamais été exploités (analyse des échantillons survenue de manière tardive, fin 2019).

Lors de la révision à mi-parcours et au regard des conclusions des suivis de 2016 et 2018, il a été décidé de ne plus réaliser les quatre protocoles tous les deux ans. Il était plus pertinent de concentrer les efforts sur une étude plus poussée et ponctuelle, afin d'apporter des réponses quant au fonctionnement méta populationnel de l'espèce dans et autour de la Réserve.

Ainsi en 2019, un stage de master de 6 mois a été réalisé par Maëlle Ladislas sur la mise en place d'un protocole CMR (Capture-Marquage-Recapture) sur l'Azuré du serpolet. Il permet également d'avoir davantage de recul quant à l'état de conservation de l'espèce et la gestion conservatoire à mettre en œuvre.

Au vu des résultats de cette étude, force est de constater que malgré des effectifs relativement faibles en comparaison à des études semblables réalisées ailleurs en France (Bouyssou & Paillat 2014, Villemagne 2015), elle apporte des informations indispensables à la bonne conservation de l'Azuré du serpolet à l'échelle locale. En effet, si l'on considère que l'absence d'échanges n'est pas liée à un biais de prospection, mais bel et bien à la faible mobilité de l'espèce, alors l'état des différentes stations doit être considéré comme prioritaire, car conditionnant fortement le maintien de la métapopulation où l'on peut considérer les échanges comme existants, mais très faibles.

A contrario, les estimatifs ont permis d'obtenir des indications qui permettent de dresser un niveau d'importance selon les stations. Ainsi en l'état des connaissances, le site des Caforts, bénéficiant pourtant d'une gestion orientée en faveur de l'Azuré, ne peut être considéré comme important au vu de la faiblesse des effectifs en comparaison aux autres sites étudiés sur la commune de Luché-Pringé. La conclusion de l'étude est donc de revoir les mesures préconisées en faveur de l'Azuré du serpolet sur le site, ces dernières n'ayant qu'un intérêt limité au regard des résultats de la CMR.

Au-delà de la gestion, cette étude contribue à mieux comprendre l'écologie de l'espèce en obtenant nombre d'indications sur son occupation des sites d'étude, sa phénologie ainsi que ses pics d'abondance qui permettront sans doute de parfaire les futures études qui concerneront cette espèce.

| <b>Formulation<br/>3/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Pertinence<br/>2/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'action est bien formulée et en accord avec l'objectif. La réalisation va finalement au-delà du descriptif de l'opération, celui-ci faisant mention du port des roches comme zone d'étude alors qu'elle s'avère finalement bien plus vaste. Il s'agit cependant plus d'un ajustement cohérent de l'action au moment de la mise en œuvre plutôt que d'un défaut de descriptif. | Cette étude aurait pu prendre la forme d'un inventaire ponctuel plutôt que d'un suivi bisannuel, en particulier pour les protocoles sur la répartition de l'origan et des <i>Myrmica</i> dont les stations n'évoluent pas assez rapidement sur un pas de temps de plan de gestion. En outre, dans sa globalité l'action était pertinente au regard des objectifs à long terme et opérationnel, même si le suivi est finalement très peu (voire pas) utilisé pour orienter la gestion. |
| <b>Efficacité<br/>3/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Efficiace<br/>3/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Une amélioration de la connaissance est constatée grâce à l'exécution des quatre protocoles. Les résultats sont conformes à l'attendu                                                                                                                                                                                                                                          | Les coûts sont conformes au prévisionnel et les protocoles ont été déployés de manière cohérente. La révision de l'action à mi-parcours avec l'augmentation du budget sur 2019 fut pertinente.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Synthèse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cette action fut pertinente et permet une amélioration notable de la connaissance sur l'Azuré du serpolet, de sa plante-hôte et de sa fourmi-hôte. La révision de l'action à mi-parcours en se                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

concentrant sur une partie de l'action (CMR sur la métapopulation) avec un effort plus conséquent (augmentation du budget et prise d'un stagiaire) fut cohérent et pertinent.

Les perspectives et axes de développement qui résultent de cette action :

- Développer le travail d'accompagnement autour de la gestion des bords de routes à l'instar de ce qui est déjà réalisé sur Thorée-les-Pins, l'Azuré du serpolet est souvent détecté au bord des emprises, mais ne bénéficiant pas forcément d'une gestion optimale comme par exemple nous avons pu l'observer sur certaines routes communales.

- Déployer des études par CMR ailleurs dans la région afin de confronter les résultats et étudier avec plus de précisions le fonctionnement méta populationnel ailleurs en Pays de la Loire.

- Faire du site des Caforts et ses abords un site expérimental pour la préservation du papillon. Cette étude a l'avantage de produire un état des lieux précis des populations présentes. Ainsi, si des modifications de gestion sont proposées, il sera intéressant de reproduire le même protocole afin d'étudier l'évolution démographique du papillon sur chaque site.

A noter que cette étude (et de fait la RNR) a pu être valorisée en faisant l'objet d'une publication nationale dans la revue Oreina en juin 2020 (Ladislav et Chevreau, 2020).



## OBJECTIFS DE L'OPERATION, RESULTATS ATTENDUS ET MODE OPERATOIRE

**Objectif** : Accroître le niveau de connaissance sur la diversité biologique du site tout en assurant un contrôle des groupes bio-indicateurs pour un meilleur suivi des actions de gestion.

**Description de l'opération** : Le Cuivré des marais (*Lycaena dispar*) est un papillon menacé, et protégé sur l'ensemble du territoire national. Le cycle de vie de ce Rhopalocère est lié aux zones humides. Il a besoin de prairies riches en plantes nectarifères pour les imagos et riche en *Rumex sp.* pour la chenille. La RNR offre au Cuivré des marais l'ensemble des habitats qu'il recherche, et la stratégie de gestion choisie a notamment pour objectif de maintenir cette mosaïque pour conserver ses populations. Afin de confirmer la reproduction de ce papillon sur la RNR, d'évaluer le succès de la gestion et de suivre ses effectifs, nous proposons le suivi SE 4.


## Localisation

Prairies humides de la RNR et sous maîtrise foncière du CEN.

|                                                                                                                                                                                                                                  | 2016 | 2017                   | 2018 | 2019                   | 2020 | 2021                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|
| Période d'intervention                                                                                                                                                                                                           | -    | Entre mai et septembre | -    | Entre mai et septembre | -    | Entre mai et septembre |
| Réalisation                                                                                                                                                                                                                      | -    | 100%                   | -    | 100%                   | -    | 100%                   |
| <b>Opérateur</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |                        |      |                        |      |                        |
| CEN Pays de la Loire                                                                                                                                                                                                             |      |                        |      |                        |      |                        |
| <b>Méthodologie/protocole</b>                                                                                                                                                                                                    |      |                        |      |                        |      |                        |
| Application du protocole mis en œuvre par le CEN Pays de la Loire en 2010 sur la RNR (CEN Pays de la Loire, Université du Maine et SEPENES. 2013)                                                                                |      |                        |      |                        |      |                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recherche des zones à forte densité de Rumex</li> <li>- Recherche de pontes</li> <li>- Evaluation de l'effet réserve avec recherche de pontes et imagos en dehors de la RNR.</li> </ul> |      |                        |      |                        |      |                        |
| Passage tous les 15 jours pendant les périodes d'émergence de l'espèce (mai à septembre).                                                                                                                                        |      |                        |      |                        |      |                        |
| <b>Indicateurs de résultat</b>                                                                                                                                                                                                   |      |                        |      |                        |      |                        |
| - Maintien voire augmentation du nombre de pontes de Cuivré des marais sur la RNR                                                                                                                                                |      |                        |      |                        |      |                        |
| - Evaluation positive de l'effet réserve sur le Cuivré des marais.                                                                                                                                                               |      |                        |      |                        |      |                        |
| <b>Synthèse budgétaire de l'opération (2016 - 2021)</b>                                                                                                                                                                          |      |                        |      |                        |      |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 2016 | 2017                   | 2018 | 2019                   | 2020 | 2021                   |
| Nombre de jours                                                                                                                                                                                                                  | -    | -                      | -    | -                      | -    | -                      |
| Budget prévisionnel                                                                                                                                                                                                              | -    | 3 200 €                | -    | 1 880 €                | -    | 1 880 €                |
| Budget réel                                                                                                                                                                                                                      | -    | 3 200 €                | -    | 1 880 €                | -    | 2 000 €                |
| <b>Taux de réalisation : 100%</b>                                                                                                                                                                                                |      |                        |      |                        |      |                        |

Le suivi du Cuivré des marais comprend deux protocoles :

Le premier consiste à rechercher les plantes hôtes (*Rumex sp.*) et les pontes du Cuivré des marais. Pour cela, 4 secteurs de recherche ont été définis. Pour chacun de ces secteurs, un échantillonnage de 100 pieds de *Rumex sp.* (plante-hôte) est souhaité.



Carte 15 : Localisation des 4 secteurs de suivi du Cuivré des marais au sein de la RNR "Prairies et coteau des Caforts"

| Formulation<br>3/3                                                                                                                    | Pertinence<br>3/3                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       | Pour mieux connaître l'état de conservation de la population à l'échelle du site. |
| Efficacité<br>2/3                                                                                                                     | Efficienne<br>2/3                                                                 |
| En 2021, des aléas techniques et humains ont empêché une acquisition puis l'exploitation habituelle des résultats.                    |                                                                                   |
| Synthèse                                                                                                                              |                                                                                   |
| Suivi pertinent, dont le protocole est à réaliser de concert avec d'autres sites de la vallée du Loir, notamment les deux autres RNR. |                                                                                   |

## OBJECTIFS DE L'OPERATION, RESULTATS ATTENDUS ET MODE OPERATOIRE


**Objectif** : Accroître le niveau de connaissance sur la diversité biologique du site tout en assurant un contrôle des groupes bio-indicateurs pour un meilleur suivi des actions de gestion.

**Description de l'opération** : Situés dans un des points chauds du département de la Sarthe en termes de richesse spécifique en Lépidoptères, le coteau calcaire et la prairie humide des Caforts jouent un rôle écologique notable pour plusieurs espèces. La singularité des milieux rencontrés en fait un site important localement en termes de reproduction et d'alimentation pour les Rhopalocères.

La qualité de bio-indicateurs des Lépidoptères diurnes permet également de suivre l'incidence des mesures de gestion mises en place à travers l'évolution de leurs populations.

La dynamique des populations de papillons de jour permet de qualifier le bon état biologique des milieux (typicité et bon état fonctionnel). Ce sont en effet des espèces avec des gammes écologiques larges permettant d'obtenir des informations sur plusieurs paramètres comme la connectivité des milieux entre eux, la nature et la qualité des habitats (Freydier, 2010).

## Localisation



|                        | 2016                      | 2017                     | 2018                        | 2019                        | 2020                        | 2021                        |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Période d'intervention | Du 20 mai au 28 septembre | Du 5 mai au 20 septembre | Du 18 avril au 11 septembre | Du 30 avril au 12 septembre | Du 23 avril au 07 septembre | Du 13 avril au 07 septembre |
| Nombre de passages     | 11                        | 9                        | 11                          | 10                          | 11                          | 12                          |
| Réalisation            | 100%                      | 100%                     | 100%                        | 100%                        | 100%                        | 100%                        |

## Opérateur

CEN Pays de la Loire

## Méthodologie/protocole

Le protocole de collecte des données de papillons diurnes (Rhopalocères et Zygènes) s'appuie sur deux suivis complémentaires.

Le premier doit permettre d'obtenir une liste qualitative des espèces présentes sur le site.

Le deuxième doit fournir des données quantitatives permettant d'appréhender la taille des populations des différentes espèces.

Le suivi qualitatif est basé sur une prospection aléatoire des différents habitats du site, en tenant compte des abondances observées et des périodes de vol des différentes espèces potentiellement présentes.

Le suivi quantitatif, basé sur un protocole adapté du STERF (Manil & Henry, 2007) et de la méthode appliquée dans les Réserves Naturelles de France (Langlois & Gilg, 2007), doit permettre d'obtenir des données permettant de comparer les abondances des différentes espèces. Chaque secteur où est réalisé un transect fait également l'objet d'un suivi phytosociologique, afin de corréliser les abondances des lépidoptères à celles de leurs plantes hôtes.

Le protocole quantitatif présente les caractéristiques suivantes :

Trois transects de longueur variable parcourent les différents habitats du site.

Les imagos présents dans une bulle de 2,50 m autour de l'observateur sont identifiés et comptés.

Jusqu'en 2018, le transect était parcouru en un temps standardisé de 7 (+/- 1) minutes. A partir de 2018, il a été décidé de modifier cette durée selon la longueur des transects afin d'avoir un effort d'échantillonnage similaire. La vitesse constante de parcours optimale pour effectuer un transect pour suivre les rhopalocères étant de 2km/h, une échelle de temps de parcours a été mise en place (vitesse entre 1,5km/h et 2 km/h) (Langlois D. & O. Gilg, 2007).

Un passage est effectué tous les 15 jours de mai à septembre.

Les conditions météorologiques doivent être favorables et satisfaire des critères de force du vent, température et couverture nuageuse. Elles seront notées sur les fiches terrain pour chaque passage.

Afin de comparer des parcelles de prairies humides fauchées et/ou pâturées et des parcelles de prairies humides en défens, un transect a été rajouté sur la parcelle acquise en 2016 par le CEN.

| Indicateurs de résultat                                                          |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| - Evaluation de la qualité des habitats par l'étude des cortèges de Lépidoptères |         |         |         |         |         |         |
| Synthèse budgétaire de l'opération (2016 - 2021)                                 |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                  | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| Nombre de jours                                                                  | 10      | 10      | 6       | 6       | 6       | 6       |
| Budget prévisionnel                                                              | 4 000 € | 4 000 € | 2 700 € | 2 820 € | 2 820 € | 2 820 € |
| Budget réel                                                                      | 4 000 € | 4 000 € | 2 700 € | 2 820 € | 3 000 € | 2 820 € |
| Taux de réalisation : 100%                                                       |         |         |         |         |         |         |

## Mise en œuvre et synthèse de l'action

### Bref récapitulatif des résultats :

Le suivi SE7 donne lieu aux résultats suivants (synthèse) :

Richesse spécifique annuelle en papillons de jour :

| Année               | 2015<br>(hors PdG) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total<br>cumulé |
|---------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Richesse spécifique | 49                 | 45   | 51   | 48   | 55   | 48   | 50   | 63              |

La richesse spécifique est relativement stable au cours des années, et s'avère plutôt élevée par rapport à la richesse spécifique du département : plus d'une espèce sur deux connue en Sarthe est contactée aux Caforts chaque année.

Au niveau de l'abondance globale, l'indice montre une légère augmentation en 2021, semble-t-il, liée aux conditions météorologiques humides de l'année et à





Figure 37. Evolution de l'indice d'abondance cumulée globale (toutes espèces confondues). L'indice correspond au nombre d'individus/100m/passage.



l'ouverture de la prairie mésophile.

2021 montre une évolution positive de 25 % d'individus en plus par rapport à 2019.



**Figure 38. Evolution des indices d'abondances des 5 espèces les plus représentées en 2021.**

Les espèces les plus abondantes du cortège restent relativement en stable, c'est notamment le cas de l'Azuré bleu-céleste (*Lysandra bellargus*), espèce la plus abondante du cortège et classée déterminante ZNIEFF. Une tendance à la baisse peut être remarquée pour les deux espèces les plus ubiquistes ; le Myrtil (*Maniola jurtina*) et le Demi-deuil (*Melanargia galathea*).

Les effectifs des espèces patrimoniales (*Lysandra bellargus* et *Phengaris arion*) sont stables. *Phengaris arion* est très peu observé chaque année, ce qui induit une population faible sur le coteau (cf action SE 3).

Au niveau de la prairie mésophile (bas du coteau) l'accroissement global des papillons liés aux prairies est visible (notamment *Coenonympha pamphilus*, *Erynnis tages*, *Boloria dia* et *Pyronia tithonus*) qui marquent une forte progression de leurs effectifs depuis 2016. Dans une moindre mesure *Lysandra bellargus* et *Phengaris arion*, espèces patrimoniales du site, se rencontrent de manière de plus en plus régulière sur le bas du coteau. Ces évolutions de cortège montrent l'ouverture du milieu grâce notamment à l'abattage des noyers sur le bas du coteau et au recépage de la haie qui enrichissait fortement le milieu tout en diminuant la luminosité.

### **Commentaires :**

Au cours des années et à partir de 2018, le nombre de jours dédié à l'action (et donc le budget associé) a diminué en passant de 10 à 6. Une demi-journée par passage s'avère en effet être suffisante pour assurer le suivi.

Sur les 6 saisons de mise en œuvre de ce plan de gestion, 4 entomologistes différents se sont succédés pour réaliser ce suivi, ce qui a pu éventuellement entraîner un biais dans les analyses. Cela dit, celui-ci a été atténué dans la mesure du possible à l'aide d'un tuilage systématique pour la première session de chaque année (à minima), entre l'ancien et le nouveau prospecteur.

Les parcours ont légèrement été modifiés à partir de 2017 ou 2018 afin de prendre en compte la réalité du terrain (passages parfois difficiles d'accès sur la première version (T1 et T3), et pour éviter l'effet d'une haie arborée, différent de l'habitat étudié (T2).

Le nombre de passages/sessions a varié chaque année, oscillant entre 9 et 12 passages. On remarque que ce nombre de passages est principalement conditionné par la première date de passage de la saison. Cela est donc perfectible pour standardiser le suivi le plus possible et avoir un nombre de passages identique chaque année, même si la météo capricieuse de début de saison est parfois une contrainte. Par ailleurs, la différence de passages est systématiquement prise en compte dans les analyses, les résultats étant ramenés sous un même dénominateur commun soit au nombre d'individus par passage.

Contrairement à ce qui est stipulé par le protocole du plan de gestion de 2016, les données obtenues ne sont pas mises en perspective des placettes phytosociologiques pourtant placées au niveau de chacun des trois transects. La composition du cortège floristique est pourtant un paramètre biotique important pour expliquer la distribution et l'abondance des rhopalocères.

Par ailleurs, l'analyse du cortège des papillons de jour reste peu poussée chaque année, aucun test statistique n'est utilisé, pour trois raisons principales :

- jusqu'à présent, le jeu de données était trop faible pour donner lieu à une analyse statistique, avec peu d'années de recul.
- Très peu de paramètres environnementaux sont pris en compte, ce qui limite les analyses possibles. Pour les prochaines années, les données pourront donc être analysées à l'aide de différentes variables associées : la météo, la gestion, l'habitat et la composition du cortège floristique. Pour ce dernier, on se penchera plus particulièrement sur la disponibilité et la diversité de la ressource nectarifère, en s'appuyant sur les relevés phytosociologiques existants au niveau de ces transects et sur des relevés simplifiés, spécifiquement adaptés à cette étude.
- Enfin, les naturalistes qui se sont succédés ne disposaient pas des ressources et du temps nécessaire pour les mettre en œuvre.

| <b>Formulation<br/>3/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Pertinence<br/>3/3</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAS, si ce n'est un manque de précision dans le descriptif du plan de gestion concernant les espèces inventoriées (mention de lépidoptères diurnes alors que seuls les zygènes sont pris en compte parmi les hétérocères). Cependant, pas d'incidence sur la réalisation.                                                                                                                                                                                                        | Action utile pour répondre aux besoins de bio-indication et accroître la connaissance du cortège.                                                                                                                                                             |
| <b>Efficacité<br/>2/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Efficienne<br/>3/3</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Des efforts sont à faire sur la récolte de paramètres environnementaux et l'analyse des résultats pour que ce suivi devienne un réel outil d'aide à la décision pour le gestionnaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La qualité des habitats n'a été évaluée que de manière très superficielle, c'est insuffisant.<br><br>En outre, le suivi tel qu'il est exécuté actuellement permet d'avoir des informations sur l'évolution du cortège de papillons de jour de la RNR. | Les ressources attribuées sont cohérentes depuis 2018. Si une amélioration qualitative des analyses est retenue pour le prochain plan de gestion, une augmentation du nombre de jours sera à prévoir (voire une assistance externe), au moins ponctuellement. |
| <b>Synthèse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |

Ce suivi reste essentiel puisqu'il permet d'obtenir des informations importantes sur l'évolution du cortège de papillons de jour de la RNR. Le protocole est pertinent. On regrettera cependant le manque d'exploitation des données brutes et de prise de paramètres environnementaux, qui induisent un outil de bio-indication peu performant. La bio-indication reste compliquée à mettre en œuvre dans un contexte de gestion fluctuante chaque année, faute de partenariat pérenne avec un éleveur.


Pour le prochain plan de gestion, il est donc préconisé un maintien de ce suivi, en perfectionnant les analyses.

## OBJECTIFS DE L'OPERATION, RESULTATS ATTENDUS ET MODE OPERATOIRE

**Objectif :** Accroître le niveau de connaissance sur la diversité biologique du site tout en assurant un contrôle des groupes bio-indicateurs pour un meilleur suivi des actions de gestion.

**Description de l'opération :** La répartition des reptiles reste relativement mal connue sur l'ensemble du territoire de la RNR. Ce manque de connaissances est lié à la grande discrétion de ces espèces, au manque d'observateurs et à l'absence d'inventaires standardisés dans le premier plan de gestion. Les premiers résultats du protocole Réserve naturelle de France mis en place en 2015 sur la RNR laisse apparaître une grande diversité d'espèces sur le site. Le but est donc d'améliorer nos connaissances sur ce groupe et l'utilisation de la RNR dans leur mode de vie.

## Localisation




## Légende

- Périmètre du site
- Ancienne localisation des plaques à Reptiles
- Localisation actuelle des plaques à Reptiles

0 50 100 150 200 m

Source : BD Ortho 2015  
Elaboration : L. Gaffé - CEN PDL - juillet 2018  
Logiciel : 3.0.1



**Conservatoire  
d'espaces naturels  
Pays de la Loire**

|                               | 2016                          | 2017                       | 2018                   | 2019                  | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|------|------|
| Période d'intervention        | Du 6 avril et le 13 septembre | Du 5 avril au 20 septembre | Du 18 avril au 21 août | <b>Action annulée</b> |      |      |
| Nombre de passages            | 14                            | 8                          | 10                     |                       |      |      |
| Réalisation                   | 100%                          | 100%                       | 100%                   | 0%                    | 0%   | 0%   |
| <b>Opérateur</b>              |                               |                            |                        |                       |      |      |
| CEN Pays de la Loire          |                               |                            |                        |                       |      |      |
| <b>Méthodologie/protocole</b> |                               |                            |                        |                       |      |      |



Le protocole mis en place est largement inspiré du protocole de suivi des reptiles du réseau des RNF. Ce protocole propose à tout opérateur naturaliste, ayant des connaissances dans l'identification des reptiles, de mettre en œuvre un inventaire dont la stratégie d'échantillonnage est suffisante pour considérer qu'il est pertinent. La mise en œuvre de ce protocole permet d'évaluer la diversité et la densité des populations de reptiles terrestres dans les milieux naturels, qu'ils soient gérés ou non. La standardisation de la méthode offre aux gestionnaires la possibilité, en plus de compléter l'inventaire, de suivre l'évolution des populations à une échelle locale et tester l'effet des pratiques de gestion sur les populations. Ces espèces sont toutes protégées en France, c'est pourquoi la méthode proposée présente l'avantage de ne pas nécessiter la capture des animaux pour les identifier, ni donc l'obtention d'autorisations de capture. Afin de cerner la diversité spécifique du site et d'appréhender l'évolution des populations sur le long terme, un dispositif de deux transects comprenant chacun quatre plaques à reptiles est mis en place, et sera inspecté à 5 reprises au cours de l'année.

| Indicateurs de résultat                          |         |         |         |                |      |      |
|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------|------|------|
| - Absence d'indicateur.                          |         |         |         |                |      |      |
| Evaluation de l'opération                        |         |         |         |                |      |      |
| Synthèse budgétaire de l'opération (2016 - 2021) |         |         |         |                |      |      |
|                                                  | 2016    | 2017    | 2018    | 2019           | 2020 | 2021 |
| Nombre de jours                                  | 5       | 5       | 2,5     | Action annulée |      |      |
| Budget prévisionnel                              | 2 000 € | 2 000 € | 1 125 € |                |      |      |
| Budget réel                                      | 2 000 € | 2 000 € | 1 125 € |                |      |      |
| Taux de réalisation : 100%                       |         |         |         |                |      |      |

### Mise en œuvre et synthèse des résultats

En 2016, il a été mis en avant le manque d'attractivité du transect Reptile localisé à proximité du ruisseau l'Organne. En conséquence, il a été décidé de modifier la configuration de ce transect en prairie de manière à améliorer son efficacité vis-à-vis des Reptiles. Le nouveau transect a été installé le 5 avril 2017 au sein de la Réserve (cf carte page précédente).

#### Bref récapitulatif des résultats :

| Espèce                                    | 2015                                         |                                | 2016                                 |                                         | 2017                                 |                                        | 2018                                 |                                         | Indice moyen | Tendance |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------|
|                                           | Nombre d'individus contactés en 2015 (n = 7) | Nombre d'individus par passage | Nombre d'individus contactés en 2016 | Nombre d'individus par passage (n = 14) | Nombre d'individus contactés en 2017 | Nombre d'individus par passage (n = 8) | Nombre d'individus contactés en 2018 | Nombre d'individus par passage (n = 10) |              |          |
| <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758     | 13                                           | 1,86                           | 21                                   | 1,5                                     | 6                                    | 0,75                                   | 28                                   | 2,8                                     | 1,73         | Stable   |
| <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768 | 2                                            | 0,29                           | 7                                    | 0,5                                     | 3                                    | 0,375                                  | 4                                    | 0,4                                     | 0,39         | Stable   |
| <i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802     | 9                                            | 1,29                           | 2                                    | 0,14                                    | 1                                    | 0,125                                  | 1                                    | 0,1                                     | 0,41         | ↘        |
| Lézard indéterminé                        | 2                                            | 0,29                           | -                                    |                                         |                                      |                                        | -                                    | -                                       |              |          |
| <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)  | 23                                           | 3,29                           | 5                                    | 0,36                                    | 3                                    | 0,375                                  | 0                                    | 0,0                                     | 1,01         | ↘        |
| Squamata                                  | -                                            | -                              | 2                                    | 0,14                                    |                                      |                                        | -                                    | -                                       |              |          |
| <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758)      | 1                                            | 0,14                           | -                                    |                                         | -                                    | -                                      | -                                    | -                                       | 0,14         | ↘        |

|                                             |   |      |   |      |   |      |   |     |      |        |
|---------------------------------------------|---|------|---|------|---|------|---|-----|------|--------|
| <i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768) | 3 | 0,43 | 2 | 0,14 | 2 | 0,25 | 1 | 0,1 | 0,23 | Stable |
|---------------------------------------------|---|------|---|------|---|------|---|-----|------|--------|

Si l'on considère l'ensemble des contacts sous les plaques, on constate que trois espèces se maintiennent convenablement sur la Réserve. Il s'agit de la Coronelle lisse, de l'Orvet fragile et de la Couleuvre d'Esculape. Concernant l'Orvet fragile, les années 2015 et 2017 semblent avoir été moins favorables à cette espèce. Il apparaît que ce dernier est majoritairement présent dans la prairie même si quelques individus étaient présents sur le coteau. La Coronelle lisse a été contactée sous la même plaque que l'an passé (plaque I2 à proximité de l'entrée de la cavité) et pour la première fois cette année sous une plaque localisée dans la prairie. Pour la Couleuvre d'Esculape, un seul individu a été observé contre trois en 2015. Ses effectifs semblent se maintenir et l'espèce ne doit pas être présente en nombre plus important vis-à-vis de la surface du site et de la densité moyenne d'individus par hectare de cette espèce (0,2 à 2 individus par hectare, selon Vacher & Geniez 2010). Les lézards (Lézard vert et Lézard des murailles) quant à eux semblent être moins détectables sous les plaques à Reptile.

### **Commentaires :**

Après quatre années consécutives de suivis, les résultats sont difficiles à interpréter du fait de la faiblesse des effectifs de chaque espèce sous les plaques. De plus, la fiabilité de ces résultats est impactée par plusieurs biais : biais prospecteur, conditions météorologiques (température, couverture nuageuse, vent), nombre de plaques, horaires de relevé des plaques...

Il a été décidé, lors de l'évaluation du plan de gestion de la RNR, de ne pas reconduire ce suivi dans les années à venir sur la Réserve des Caforts en raison du manque d'observations et de la difficulté d'interpréter les résultats obtenus. Il s'avère important que différentes informations complémentaires soient notées lors de la réalisation d'un suivi de ce type. En effet, comme l'énonce le Protocole commun d'inventaire des reptiles terrestres sur les Réserves Naturelles (GROUPE RNF « Amphibiens et Reptiles », 2013), il est important de tenir compte de l'heure de passage (bien la noter), des conditions météorologiques et de relever les plaques plutôt en fin de matinée dans le cadre de l'analyse des données ce qui n'a pas été systématiquement fait depuis 2015.

Enfin, pour la fiabilité des interprétations à long terme, il serait nécessaire d'effectuer une analyse statistique de manière à avoir des analyses plus robustes qui ne se basent pas uniquement sur les interprétations des gestionnaires et rédacteurs.

En outre, les plaques existantes pourront continuer à être relevées de manière opportuniste au gré des passages des naturalistes, pérennisant ainsi l'acquisition de données sur ce taxon. Dans cette même optique, des plaques pourront être ajoutées sur les parcelles de 2017 pour augmenter la connaissance dans ce secteur.

| <b>Formulation<br/>2/3</b>                                                                                                           | <b>Pertinence<br/>1/3</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pas d'indicateur de résultat.                                                                                                        | L'action ne permet de répondre que partiellement aux objectifs opérationnels. Le suivi a permis une (faible) augmentation de la connaissance sur les reptiles, mais effectuer de la bio-indication était trop ambitieux au regard des résultats finalement obtenus. |
| <b>Efficacité<br/>1/3</b>                                                                                                            | <b>Effizienz<br/>2/3</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Manque d'efficacité à cause de différents biais, peu de plaques donc très peu de données, difficultés d'interprétation à long terme. | Le budget est respecté, mais les résultats ne sont pas satisfaisants.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Synthèse</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Ce suivi permet d'obtenir des informations sur la présence ou non d'espèces de Reptiles sur la Réserve. Cependant les résultats obtenus sont trop faibles pour pouvoir être analysés convenablement et cela n'est pas révélateur de l'influence de la gestion sur le cortège inventorié. Le suivi a donc été supprimé depuis 2019 et il ne sera probablement pas reconduit pour le prochain plan de gestion. En outre, les plaques existantes pourront continuer à être relevées de manière opportuniste au gré des passages des naturalistes, pérennisant ainsi l'acquisition de données sur ce taxon.

SE 9

Suivre les populations d'Orthoptères en lien avec les communautés végétales

OBJECTIFS DE L'OPERATION, RESULTATS ATTENDUS ET MODE OPERATOIRE


**Objectif :** Accroître le niveau de connaissance sur la diversité biologique du site tout en assurant un contrôle des groupes bio-indicateurs pour un meilleur suivi des actions de gestion.

**Description de l'opération (2015) :** L'ordre des Orthoptères constitue un bon indicateur du fait de sa grande sensibilité aux changements de la structure de la végétation (hauteur, stratification) et de l'humidité stationnelles. La structure des peuplements d'Orthoptères informe sur la structure des milieux, leur température moyenne (en fonction de la biogéographie, l'exposition, l'altitude), mais aussi l'humidité stationnelle. Certains cortèges d'espèces sont qualifiés d'indicateurs de la dynamique hydrologique. Les insectes étant ectothermes, la température de leur corps dépend essentiellement des conditions climatiques du milieu : ce sont à ce titre des indicateurs potentiels du climat.

Les habitats ouverts de la RNR sont connus pour être des habitats favorables aux Orthoptères. N'ayant en 2015 qu'une connaissance moyenne de ce groupe taxonomique sur le site, nous proposons de mener un inventaire qui servira de diagnostic pour évaluer l'état de conservation des habitats. Celui-ci aura lieu en 2016, afin de caractériser un état de référence puis en 2018 pour faire un état des lieux. En fonction de l'évolution des résultats, nous pourrons ajuster nos actions de gestion lors de l'élaboration du bilan intermédiaire et du document prévisionnel en 2018, puis de nouveau en 2019 et 2021.

Lors de la révision à mi-parcours, la fréquence de l'action a été revue pour passer de bisannuelle à annuelle.

#### Localisation



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2016                       | 2017 | 2018                                             | 2019               | 2020                 | 2021                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| Période d'intervention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29 juillet et 28 septembre | -    | 25 juillet, 14 et 17 septembre                   | 28 juin et 22 août | 2 juillet et 11 août | 8 et 13 juillet, 2 septembre                    |
| Nombre de passages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                          | -    | 2 (2 <sup>ème</sup> passage réalisé sur 2 dates) | 2                  | 2                    | 2 (1 <sup>er</sup> passage réalisé sur 2 dates) |
| Réalisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100%                       | -    | 100%                                             | 100%               | 100%                 | 100%                                            |
| <b>Opérateur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |      |                                                  |                    |                      |                                                 |
| CEN Pays de la Loire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |      |                                                  |                    |                      |                                                 |
| <b>Méthodologie/protocole</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |      |                                                  |                    |                      |                                                 |
| <p>Le calcul de l'abondance est basé sur l'ILA selon la méthode de Voisin (1986). L'ILA consiste à effectuer différents transects de 20 m établis de façon à ne pas se rapprocher trop près les uns des autres. Ces trajets ne se recoupent pas. Le nombre de spécimens fuyant devant les pas du prospecteur est compté pour une bande d'une largeur environ égale à un mètre. La distance est estimée à l'aide d'une corde munie de nœuds que l'opérateur laisse filer entre ses doigts.</p> <p>2 passages par mois seront effectués de juin à août.</p> <p>Avant de réaliser chaque ILA, un pool de 50 à 100 individus d'Orthoptères sera identifié afin d'avoir une densité plus fine du cortège sur chaque parcelle (méthode issue de l'étude de Jaulin &amp; Baillet, 2007) et donc d'optimiser l'aspect qualitatif de l'échantillonnage (Rapport d'activité 2016).</p> <p>Recherche d'une parcelle thermophile témoin en dehors de la RNR afin de comparer avec le coteau calcaire de la Réserve.</p> <p>Pour les prairies de la RNR, la parcelle de comparaison sera la parcelle (Nord) acquise par le CEN en 2016. La parcelle témoin correspondra à celle qui ne sera ni fauchée, ni pâturée l'année du suivi.</p> <p>Réaliser les suivis la même année sur les deux RNR : « Prairies et coteaux des Caforts » et « Roselière et prairies des Dureaux » afin de pouvoir faire une comparaison de la gestion intersites.</p> <p><u>Le suivi devient annuel à partir de la révision à mi-parcours du plan de gestion.</u></p> |                            |      |                                                  |                    |                      |                                                 |
| <b>Indicateurs de résultat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |      |                                                  |                    |                      |                                                 |
| - Définition de l'impact du pâturage et de la fauche sur les communautés d'Orthoptères                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |      |                                                  |                    |                      |                                                 |
| <b>Synthèse budgétaire de l'opération (2016 - 2021)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |      |                                                  |                    |                      |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2016                       | 2017 | 2018                                             | 2019               | 2020                 | 2021                                            |



|                                   |         |   |         |         |         |         |
|-----------------------------------|---------|---|---------|---------|---------|---------|
| Nombre de jours                   | 7       | - | 5       | 3       | 3       | 3       |
| Budget prévisionnel               | 2 800 € | - | 2 250 € | 1 410 € | 1 410 € | 1 410 € |
| Budget réel                       | 2 800 € | - | 2 250 € | 1 410 € | 1 500 € | 1 500 € |
| <b>Taux de réalisation : 100%</b> |         |   |         |         |         |         |

### Mise en œuvre et synthèse de l'action

#### Bref récapitulatif des résultats :

Depuis 2018, 24 espèces ont été relevées dans le cadre du protocole ILA. Cette richesse représente près de 50% du cortège départemental et témoigne du bon niveau de connaissance de la Réserve ainsi que de la gestion extensive qui y est mise en place. La diversité d'habitats joue notamment un rôle pour l'accueil de ce cortège avec des espèces d'affinité strictement hygrophile d'une part (Criquet ensanglanté, Conocéphale des roseaux...) et thermophiles d'autre part (Criquet des bromes, Decticelle carroyée ...).

Quoique moins visible en 2021, le coteau (habitats 1 et 2) reste plus favorable aux orthoptères que les prairies humides (même si l'habitat 8 les meilleures richesses et densités cette année) tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif. Ce constat peut avoir plusieurs raisons :

- une différence d'habitat entre la partie coteau et la partie prairie qui influence fortement le cortège. En effet, chez les orthoptères, la richesse et la densité sont réputées plus riches en contexte thermophile. La hauteur de végétation a aussi son rôle, les orthoptères affectionnant davantage les strates de végétations basses à moyenne, plus présentes sur le coteau que dans les prairies humides.
- la gestion mise en place peut aussi conditionner les résultats globaux. En effet, selon les années de fauche, la densité de végétation des prairies humides peut être importante et influencer le cortège présent. Ce facteur de densité peut bénéficier à certaines espèces (comme le Conocéphale des roseaux), mais reste non optimal pour le cortège dans sa globalité.

#### Commentaires :

La première phase du protocole retenu (soit l'échantillonnage d'un nombre conséquent d'individus au sein de chaque entité d'habitat) n'a pas été effectuée en 2016 pour se concentrer sur la 2<sup>nd</sup>e phase. Il est apparu pertinent par la suite de mettre en œuvre les deux phases afin d'avoir des informations plus fines sur le cortège de chaque parcelle étudiée.

A partir de la révision à mi-parcours du plan de gestion, le suivi passe de bisannuel à annuel.

| <b>Formulation</b><br><b>3/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Pertinence</b><br><b>3/3</b>                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiche bien formulée.<br>Dans le plan de gestion initial, la méthodologie est floue et propose plusieurs protocoles. Il n'est cependant pas illogique de ne pas disposer de protocole précis au moment de la rédaction du document. Cependant, cela pourrait expliquer l'estimatif imprécis du budget, ce dernier ayant été ensuite divisé par deux au cours des 6 ans. | L'action est tout à fait cohérente avec les objectifs, tant en termes de bio-indication que de connaissance. |
| <b>Efficacité</b><br><b>3/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Efficienne</b><br><b>3/3</b>                                                                              |
| Le suivi est efficace, dans le sens où il apporte de réelles préconisations de gestion et permet de mieux connaître les cortèges d'orthoptères présents sur chaque parcelle.                                                                                                                                                                                           | Ressources à disposition suffisantes.                                                                        |

## Synthèse

Cette action apporte des informations pertinentes au gestionnaire avec de réelles préconisations en fonction des cortèges. Tout comme le suivi SE 7 relatif aux papillons de jour, on pourra cependant regretter le manque d'analyses statistiques afin d'étayer des conclusions plus robustes.

### RE 1

#### EFFECTUER UNE ETUDE DES CORTÈGES DE SYRPHES ET DEDUIRE UN DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS

##### OBJECTIFS DE L'OPERATION, RESULTATS ATTENDUS ET MODE OPERATOIRE

Objectif : Etablir un inventaire initial des Syrphes de la Réserve naturelle régionale.

Evaluer la qualité écologique et apporter de nouveaux éléments sur l'état de conservation des habitats de la RNR et contribuer à l'amélioration des connaissances (régionales et nationales) des Syrphes.


##### Description de l'opération :

A l'état larvaire, les syrphes utilisent des niches écologiques restreintes et ont des exigences strictes, ce qui fait d'eux d'excellents bio-indicateurs. Il est possible à l'aide de ce taxon de couvrir à la fois la quasi-totalité des habitats naturels, une grande variété de leurs niches écologiques et les trois niveaux trophiques principaux : zoophage, microphage et phytophage. Cette étude a pour but de :

- Etablir un inventaire initial des syrphes de la Réserve naturelle régionale
- Evaluer la qualité écologique et apporter de nouveaux éléments sur l'état de conservation des habitats de la réserve naturelle.
- Contribuer à l'amélioration des connaissances (régionales et nationales) des syrphes.

##### Localisation

Trois dispositifs de piégeage en RNR, le quatrième (T2) sur une parcelle adjacente en propriété du CEN.  
+ chasse active sur l'ensemble du périmètre sous maîtrise foncière CEN.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2016 | 2017 | 2018                                 | 2019                                 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|------|
| Période d'intervention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -    | -    | Entre le 18 avril et le 11 septembre | Entre le 05 avril et le 27 septembre | -    | -    |
| Nombre de passages (chasse active)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -    | -    | 10                                   | 3                                    | -    | -    |
| Réalisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -    | -    | 100%                                 | 100%                                 | -    | -    |
| <b>Opérateurs</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                      |                                      |      |      |
| Simon Cavallès et Cyrille Dussaix (experts indépendants), CEN Pays de la Loire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                                      |                                      |      |      |
| <b>Méthodologie/protocole</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |                                      |                                      |      |      |
| Utilisation de la méthode Syrph The Net (StN) développée par le Dr MCD SPEIGHT. Dans un premier temps, les syrphes adultes, doivent être collectés de manière standardisée en utilisant des pièges « Malaise ». Dans un souci d'exhaustivité, cet inventaire doit être réalisé sur un cycle biologique annuel complet. Dans un second temps, c'est l'analyse des informations collectées. Pour cela, à partir des habitats présents sur la zone d'inventaire, une liste des espèces européennes prédites dans les habitats est constituée grâce à la base de données "Syrph-the-Net". Un deuxième filtre est réalisé avec les espèces locales connues, constituant ainsi une liste régionale des espèces prédites pour les macro-habitats. Ces listes d'espèces prédites sont ensuite comparées à la liste des espèces observées sur la RNR permettant ainsi d'exprimer « l'intégrité écologique » de l'habitat. Les espèces attendues (espèces présentes au rendez-vous) renseignent sur « la qualité de la description » des habitats. Les espèces manquantes (prédites, mais non observées) traduisent des « dysfonctionnements » dans l'habitat. |      |      |                                      |                                      |      |      |
| <b>Indicateurs de résultat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                                      |                                      |      |      |
| - Etablissement d'une liste exhaustive des syrphes de la RNR,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |                                      |                                      |      |      |
| - Etablir la qualité écologique du site et son évolution après la mise en œuvre des opérations de gestion conservatoire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |                                      |                                      |      |      |
| <b>Synthèse budgétaire de l'opération (2016 - 2021)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |                                      |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2016 | 2017 | 2018                                 | 2019                                 | 2020 | 2021 |
| Budget prévisionnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -    | -    | 1 800 €                              | 1 800 €                              | -    | -    |
| CEN prestation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -    | -    | 4000 €                               | 4000 €                               | -    | -    |

|                           |                   |   |   |         |         |   |   |
|---------------------------|-------------------|---|---|---------|---------|---|---|
| Budget réel               | CEN<br>prestation | - | - | 1 800 € | 1 800 € | - | - |
|                           |                   | - | - | 4000 €  | 4000 €  | - | - |
| Taux de réalisation : 95% |                   |   |   |         |         |   |   |

### Mise en œuvre et synthèse de l'action

#### Bref récapitulatif des résultats (d'après Cavallès et Dussaix, 2019) :

101 espèces ont été identifiées au cours de cette étude (voir diagnostic écologique du plan de gestion 2022-2027), ce qui représente 49% de la richesse faunistique sarthoise. Ce résultat est remarquable quand on considère la superficie très modeste de la réserve des Caforts et la diversité syrphidologique moyenne du Grand Ouest. La représentativité à l'échelle nationale est évidemment plus modeste, de l'ordre de 18%, les zones biogéographiques les plus diversifiées étant les chaînes montagneuses.

La présence d'un cortège important d'espèces patrimoniales est à souligner avec 24 espèces menacées à l'échelle du domaine atlantique, de la France ou de l'Europe. La composition de ce cortège ne met pas en avant l'importance écologique d'un habitat plus qu'un autre, mais reflète des enjeux de conservation à l'échelle de la mosaïque d'habitats de la réserve des Caforts et, au-delà de ses limites, de la chênaie thermophile. La patrimonialité forte de cet habitat fait des parcelles limitrophes de la réserve des cibles de choix pour étendre les limites de la réserve et y intégrer un nouvel habitat d'intérêt avec les enjeux de conservation associés.



©Cyrille Dussaix, 2018.

L'analyse StN met en avant une assez bonne fonctionnalité des habitats de la réserve des Caforts, avec une intégralité écologique de 55%. La partie constituée par le coteau calcaire présente une meilleure fonctionnalité que l'ensemble des prairies humides, les habitats de ces dernières souffrant d'un régime hydrologique modifié par le caractère agricole passé et présent du paysage local.

Le principal dysfonctionnement écologique identifié réside dans l'assèchement trop rapide des milieux humides, causé par la transformation du paysage par l'agriculture au niveau local et notamment la rectification des cours d'eau et la présence régulière de fossés de drainage. Des pistes de gestion existent pour renaturaliser les habitats de la prairie humide, à l'échelle de la réserve ou du lit majeur du Loir. Des travaux de restauration hydrologique peuvent en effet permettre de retrouver un fonctionnement hydrologique plus naturel, mais de leur portée dépendra leur efficacité.

Les milieux prairiaux de la réserve des Caforts pourraient bénéficier d'un changement de mode de gestion de la fauche vers le pâturage extensif, si la superficie de la réserve le permet. Le pâturage extensif s'avère plus adapté pour les populations d'invertébrés prairiaux que la fauche (GRETIA, 2011).

#### Commentaires :

Les deux protocoles sont complémentaires, en atteste l'observation de 19 espèces capturées uniquement à vue et non à l'aide des tentes Malaise.

Des difficultés relatives à la petite superficie du site ont été rencontrées, menant à certaines limites dans l'analyse des résultats et à un risque de surinterprétation, cependant connu et pris en compte.



Dans des considérations plus matérielles, la qualité des tentes Malaise utilisées lors de l'étude n'a pas permis de réaliser deux campagnes complètes de piégeage, le tissu se détériorant sous les effets de l'exposition au soleil et au vent et abrégant la deuxième saison de capture pour une tente.

Le tri des échantillons a été effectué par un volontaire en service civique par année. Après avoir bénéficié d'une formation par les experts, chaque taxon (et en premier lieu les syrphes) a été isolé pour faire gagner un temps considérable aux experts. Les autres taxons (hors syrphes) sont gardés, à ce jour certains n'ont pas encore été analysés.

| <b>Formulation<br/>3/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Pertinence<br/>3/3</b>                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L'action s'est avérée tout à fait pertinente et en cohérence avec les objectifs de connaissance et de bio-indication. |
| <b>Efficacité<br/>3/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Effizienz<br/>3/3</b>                                                                                              |
| Les indicateurs de résultat sont validés, l'action a permis de dresser une liste des syrphes de la RNR la plus complète possible au regard du temps imparti. La Qualité écologique du site a également pu être évaluée, et des recommandations de gestion ont été formulées.                                                                                                                                                                                         | Les résultats sont validés, sans surcoût.                                                                             |
| <b>Synthèse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |
| <p>Cette étude sur 2 ans a permis une augmentation remarquable de la connaissance des Syrphes de la RNR, avec 101 espèces identifiées dont 3 nouvelles pour le département.</p> <p>De plus, la méthode Syrph the net a permis d'évaluer l'intégrité écologique des différents habitats de la RNR et de certaines parcelles du CEN hors RNR. Les conclusions de l'étude constituent un outil concret pour orienter certaines actions du prochain plan de gestion.</p> |                                                                                                                       |

## Synthèse de l'objectif opérationnel D.1 - Accroître le niveau de connaissance sur la diversité biologique du site tout en assurant un contrôle des groupes bio-indicateurs pour un meilleur suivi des actions de gestions

| Objectif opérationnel D.1 | Accroître le niveau de connaissance sur la diversité biologique du site tout en assurant un contrôle des groupes bio-indicateurs pour un meilleur suivi des actions de gestion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suivis                    | SE1, SE 2, SE3, SE4, SE7, SE8, SE9, RE1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Indicateurs de suivi      | <p>Produire une liste quasi exhaustive des coléoptères saproxyliques de la RNR (RE3)</p> <p>Produire une liste quasi exhaustive des Orthoptères de la RNR et mettre en lumière le côté indicateur. (SE9)</p> <p>Produire une liste quasi exhaustive des syrphes et mettre en lumière leur côté indicateur des habitats. (RE1)</p> <p>Mettre en avant les changements d'habitats suite aux travaux de restauration et de gestion par le biais des relevés phytobiologiques, des suivis de plantes patrimoniales, par le côté bio-indicateur des Orthoptères et par l'étude des populations de Syrphes (RE1)</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |            |                                                                                                 |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Analyse de l'objectif du plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Analyse au regard des enjeux du plan de gestion en cours</b> |            | <b>Analyse au regard des objectifs et actions mis en place dans le plan de gestion en cours</b> |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Formulation                                                     | Pertinence | Résultats                                                                                       | Efficacité | Efficience |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2/3                                                             | 3/3        | 2/3                                                                                             | 3/3        | 3/3        |
| <b>Synthèse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |            |                                                                                                 |            |            |
| La première partie de l'objectif opérationnel est atteint avec succès, les opérations ayant permis une amélioration notable de la connaissance naturaliste. L'évolution des habitats a également été mise en évidence, en particulier grâce au suivi phytosociologique (SE 1). Des efforts sont à faire pour les autres suivis afin d'améliorer l'outil. L'action ponctuelle RE1 sur les syrphes s'est révélée très pertinente. |                                                                 |            |                                                                                                 |            |            |

## Objectif opérationnel D.2 - Compléter et approfondir les connaissances sur le fonctionnement abiotique de la RNR

RE 2

ETUDIER LE FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE ET LA COMPOSITION PEDOLOGIQUE DE LA RNR

OBJECTIFS DE L'OPERATION, RESULTATS ATTENDUS ET MODE OPERATOIRE

Objectif opérationnel D3 : Compléter et approfondir les connaissances sur le fonctionnement abiotique de la RNR.

Description de l'opération :

Nous manquons actuellement de connaissance dans ce domaine. Afin de pallier le manque de connaissances, nous proposons d'étudier de manière fine l'hydrologie de la RNR (et de son environnement proche), en lien notamment avec la nature des sols. Ceci permettra par exemple de mieux comprendre le rôle et le fonctionnement de la nappe permanente au sein des facteurs abiotiques qui conditionnent l'écologie de la RNR. L'étude hydraulique tentera de mettre en relation le lien entre le niveau d'eau permanent de la nappe et le rôle des différents ouvrages hydroélectriques présents sur le Loir à proximité de la RNR.

Localisation

Le Loir et l'ensemble de la RNR.

|                        | 2016 | 2017             | 2018         | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|------|------------------|--------------|------|------|------|
| Période d'intervention | -    | Reportée en 2018 | Non réalisée | -    | -    | -    |
| Réalisation            | -    | 0%               | 0%           | -    | -    | -    |

Opérateurs

Bureau d'étude

Méthodologie/protocole

Mise en place d'un protocole d'étude du fonctionnement hydrologique du site avec un bureau d'étude spécialisé.

Analyse du fonctionnement de la nappe en fonction des niveaux d'eau du Loir.

Mise en place des zones d'étude pédologique avec un spécialiste et définition de nos attentes.

Indicateurs de résultat

- Pas d'indicateur.

Synthèse budgétaire de l'opération (2016 - 2021)

|        | 2016 | 2017 | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|------|------|-------|------|------|------|
| Budget | -    | -    | 800 € | -    | -    | -    |
| CEN    | -    | -    | -     | -    | -    | -    |

|                          |            |   |   |        |   |   |   |
|--------------------------|------------|---|---|--------|---|---|---|
| prévisionnel             | prestation | - | - | 4500 € | - | - | - |
| Budget réel              | CEN        | - | - | 800 €  | - | - | - |
|                          | prestation | - | - | 0 €    | - | - | - |
| Taux de réalisation : 0% |            |   |   |        |   |   |   |

| Formulation<br>2/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pertinence<br>3/3                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les questions auxquelles doit répondre l'étude sont à préciser. Manque d'indicateur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cette action était pertinente à mettre en œuvre et aurait pu fournir au gestionnaire des données intéressantes pour la zone humide. |
| Efficacité<br>0/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Efficienne<br>1/3                                                                                                                   |
| L'étude n'a pas été réalisée, aucun résultat obtenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Budget alloué faible pour une telle étude, par ailleurs non réalisée.                                                               |
| Synthèse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |
| <p>Cette étude prévue en 2017 a été reportée sur 2018, puis définitivement annulée. Manquant de précision sur les objectifs et probablement de budget, elle aurait tout de même pu être affinée et exécutée sur la 2<sup>nd</sup>e moitié du plan de gestion, à la faveur de l'évaluation à mi-parcours.</p> <p>Cette action est pertinente et sera à réaliser pour le prochain plan de gestion, à la lumière des conclusions de l'action RE1 de modifier le profil de l'Organe.</p> |                                                                                                                                     |

## Synthèse de l'objectif opérationnel D.2

| Objectif opérationnel D.2     | Compléter et approfondir les connaissances sur le fonctionnement abiotique de la RNR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                          |            |            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Opérations associées          | RE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                          |            |            |
| Résultats                     | Production de relevés pédologiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                          |            |            |
|                               | Synthèse des connaissances sur le fonctionnement hydro écologique de la RNR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                          |            |            |
| Analyse de l'objectif du plan | Analyse au regard des enjeux du plan de gestion en cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | Analyse au regard des objectifs et actions mis en place dans le plan de gestion en cours |            |            |
|                               | Formulation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pertinence | Résultats                                                                                | Efficacité | Efficienne |
|                               | 2/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3/3        | 0/3                                                                                      | 0/3        | 1/3        |
|                               | Synthèse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                          |            |            |
|                               | <p>L'action RE2 prévue en 2017 a été reportée sur 2018, puis définitivement annulée. Manquant de précision sur les objectifs et probablement de budget, elle aurait tout de même pu être affinée et exécutée sur la 2<sup>nd</sup>e moitié du plan de gestion, à la faveur de l'évaluation à mi-parcours.</p> <p>L'action est pertinente et sera à réaliser pour le prochain plan de gestion, à la lumière des conclusions de l'action RE1 de modifier le profil de l'Organe.</p> |            |                                                                                          |            |            |

## Synthèse de l'objectif à long terme D

### **OLT D – Assurer le suivi et l'évaluation des opérations de gestion et approfondir les connaissances sur le fonctionnement du patrimoine**

#### **OBJECTIFS ET OPERATIONS ASSOCIEES**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objectifs opérationnels            | D.1 - Accroître le niveau de connaissance sur la diversité biologique du site tout en assurant un contrôle des groupes bio-indicateurs pour un meilleur suivi des actions de gestion<br>D.2 - Compléter et approfondir les connaissances sur le fonctionnement abiotique de la RNR |
| Problématique<br>(PdG 2016 - 2021) | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Synthèse de l'OLT                  | Dans l'ensemble le bilan est satisfaisant, mise à part l'action de connaissance du fonctionnement hydrologique qui n'a pas pu aboutir et qui aurait été pertinente. Par ailleurs, les indicateurs doivent être améliorés.                                                          |

### **C.2.2.5. OLT E – Développer l'usage pédagogique de la RNR de façon structurée, en cohérence avec les objectifs patrimoniaux et la gestion par pâturage**

Objectif opérationnel E.1 - Faire connaître l'intérêt et le rôle de la RNR aux différents publics



## TU 4


## ELABORER ET POSER DE NOUVEAUX PANNEAUX PEDAGOGIQUES

### OBJECTIFS DE L'OPERATION, RESULTATS ATTENDUS ET MODE OPERATOIRE

Objectif : sensibiliser et informer le public sur la RNR.

Description de l'opération : Le panneau pédagogique actuellement en place sur la RNR est obsolète. Il est nécessaire d'en implanter un nouveau. De plus, afin de promouvoir la RNR, il est proposé d'implanter un second panneau en limite ouest de la RNR, dans un emplacement fréquenté par de nombreux promeneurs et habitants du territoire

### Localisation



|                                                         | 2016      | 2017 | 2018 | 2019   | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------------------------|-----------|------|------|--------|------|------|
| Période d'intervention                                  | Rédaction | -    | -    |        | -    | -    |
| Réalisation                                             | 50%       | -    | -    |        | -    | -    |
| <b>Opérateurs</b>                                       |           |      |      |        |      |      |
| CEN Pays de la Loire, entreprise spécialisée (Pic bois) |           |      |      |        |      |      |
| <b>Méthodologie/protocole</b>                           |           |      |      |        |      |      |
|                                                         |           |      |      |        |      |      |
| <b>Indicateurs de résultat</b>                          |           |      |      |        |      |      |
| - Pas d'indicateur.                                     |           |      |      |        |      |      |
| <b>Synthèse budgétaire de l'opération (2016 - 2021)</b> |           |      |      |        |      |      |
|                                                         | 2016      | 2017 | 2018 | 2019   | 2020 | 2021 |
| Budget prévisionnel                                     | 2800 €    | -    | -    | 1880 € | -    | -    |
| CEN prestation                                          | 3000 €    | -    | -    | 3000 € | -    | -    |
| Budget réel                                             | 2800 €    | -    | -    | 1880 € | -    | -    |
| CEN prestation                                          | 2922,97 € | -    | -    | 0 €    | -    | -    |
| <b>Taux de réalisation : 32,5 %</b>                     |           |      |      |        |      |      |

Les panneaux ont été élaborés durant l'été 2016 par le CEN. Le prestataire (entreprise Pic Bois) a été chargé de les confectionner (réalisation de maquettes et conception). Cependant, dans l'attente de disposer d'éléments sur une éventuelle charte graphique liée aux RNR, le projet a été arrêté. En 2019,

le projet n'a pas pu aboutir non plus mais a fait l'objet d'un travail préliminaire de la part d'une apprentie en communication en interne.

| <b>Formulation<br/>2/3</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Pertinence<br/>2/3</b>                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manque d'informations sur les thèmes visés par les panneaux pédagogiques.                                                                                                                                                                                    | Opération pertinente, même si le contexte fait que les panneaux toucheront relativement peu de personnes.        |
| <b>Efficacité<br/>1/3</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Effizienz<br/>3/3</b>                                                                                         |
| Un travail sur la conception des panneaux a été effectué, mais ceux-ci ne sont toujours pas posés.                                                                                                                                                           | Les moyens matériels et humains semblent suffisants. L'attente d'une charte graphique commune a enrayé l'action. |
| <b>Synthèse</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |
| Les panneaux ont été réfléchis, mais l'attente d'une charte graphique RNR a enrayé l'action. Pour le prochain plan de gestion, cette action doit donc être finalisée, avec une réactualisation des panneaux, l'utilisation de la nouvelle charte et la pose. |                                                                                                                  |

| <b>PI 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Sensibiliser et former les publics à la biodiversité grâce à la RNR</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJECTIFS DE L'OPERATION, RESULTATS ATTENDUS ET MODE OPERATOIRE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |
| Objectif : Faire connaître l'intérêt et le rôle de la RNR aux différents publics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |
| Description de l'opération : En tant que Réserve naturelle régionale, le site a vocation à servir de support pédagogique à tous les publics désireux de se former ou de se sensibiliser aux thématiques de conservation du patrimoine naturel, ou des sciences de l'environnement.<br>Le Conservatoire a donc proposé et mis en œuvre plusieurs actions de sensibilisation, d'animation où de formation autour de la RNR et de son patrimoine. |                                                                            |

#### Localisation

Ensemble de la RNR (partie humide, coteau et cavité).

|                                                                                                     |                | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Période d'intervention                                                                              |                | Toute l'année | Toute l'année | Toute l'année | Toute l'année | Toute l'année | Toute l'année |
| Réalisation                                                                                         |                | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          |
| Opérateurs                                                                                          |                |               |               |               |               |               |               |
| CEN des Pays de la Loire et CPIE vallées de la Sarthe du Loir                                       |                |               |               |               |               |               |               |
| Méthodologie/protocole                                                                              |                |               |               |               |               |               |               |
| <div>- Animations grand public</div> <div>- Animations scolaires auprès de différentes écoles</div> |                |               |               |               |               |               |               |
| Indicateurs de résultat                                                                             |                |               |               |               |               |               |               |
| <div>- Pas d'indicateur.</div>                                                                      |                |               |               |               |               |               |               |
| Synthèse budgétaire de l'opération (2016 - 2021)                                                    |                |               |               |               |               |               |               |
|                                                                                                     |                | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
| Budget prévisionnel                                                                                 | CEN prestation | 1 400 €       | 1 400 €       | 1 350 €       | 1 410 €       | 1 410 €       | 1 410 €       |
|                                                                                                     |                | 3 200 €       | 3 200 €       | 3 200 €       | 3 200 €       | 3 200 €       | 3 200 €       |
| Budget réel                                                                                         | CEN prestation | 1 400 €       | 1 400 €       | 1 350 €       | 1 410 €       | 1 500 €       | 1 500 €       |
|                                                                                                     |                | 2 206,70 €    | 2 490,25 €    | 3 084,50 €    | 3 014,60 €    | 2 950,20 €    | 3 070 €       |
| Taux de réalisation : 100%                                                                          |                |               |               |               |               |               |               |

## Mise en œuvre et synthèse de l'action

Sept écoles différentes ont bénéficié de l'action : Mansigné, Thorée-les-Pins, Luché-Pringé, Pontvallain, Le Lude, Saint Jean de la motte et Coulongé. Ainsi sur les six ans, 19 classes ont pu bénéficier des animations du CPIE, soit une moyenne de 3 classes par an.

Le CEN contribue à cette action par la réalisation d'une animation grand public effectuée chaque année au printemps, au moment de la floraison des orchidées et de la sortie de l'entomofaune.

Jusqu'en 2019, les animations du CEN ont un format classique de présentation de la RNR et de sa richesse biologique et patrimoniale. Ces animations classiques amènent somme toute peu de monde, en lien également avec un manque de communication.

A partir de 2020 et au regard du faible nombre de personnes sensibilisées par ces animations, le CEN a fait évoluer son animation en passant sur un format où le public déambule librement ou non sur la RNR, à travers les différents habitats. Une dizaine de panneaux multi-thématiques répartis sur la RNR ont permis au public de découvrir les lieux, mais aussi la biodiversité locale. Un petit jeu à destination en particulier des enfants est présent à la fin de chaque panneau. L'animateur reste présent pour guider et apporter des explications complémentaires. Avec ce nouveau format, plus d'une vingtaine de personnes se sont déplacées chaque année.



Figure 41. Animation grand public en 2020.

### Commentaires :

Dans les rapports d'activité, les actions PI 1 et PI 2 sont toujours traitées ensemble, sans distinction. Il aurait été plus pertinent de les distinguer, d'autant plus qu'il s'agit d'opérations très différentes.

| Formulation<br>3/3                                                                                                                                                                                                                                  | Pertinence<br>2/3                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAS.                                                                                                                                                                                                                                                | Action permettant de répondre à l'objectif à long terme. A ce jour elle répond partiellement à l'objectif opérationnel de faire connaître la RNR aux différents publics : seuls le grand public et les publics scolaires ont bénéficié d'animations. |
| Efficacité<br>2/3                                                                                                                                                                                                                                   | Effizienz<br>3/3                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sur les 6 ans, un grand nombre d'enfants a été sensibilisé.<br>Le résultat est cependant plus mitigé sur les animations grand public dont la réussite semble conditionnée en premier lieu par la communication et en second lieu au type de format. | Moyens financiers et humains en adéquation avec les résultats.                                                                                                                                                                                       |
| Synthèse                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |



Les animations scolaires réalisées par le CPIE sont toujours très appréciées des élèves et des enseignants, elles s'adaptent au niveau scolaire, apportent des connaissances et sensibilisent la jeune génération. La RNR, au regard de la diversité de ses habitats, constitue un bon support pour ce genre d'animations, tant qu'elles restent ponctuelles. Le nombre de classes et de passages ne doit en effet pas être trop élevé, car aucun cheminement n'est présent sur la RNR.

Pour les animations grand public du CEN, des efforts sont à faire en particulier en termes de communication pour toucher plus de monde. Des partenariats pourraient aussi être effectués avec des publics spécialisés ou des associations.

Cette action est à reconduire pour le prochain plan de gestion.

PI 2

Contribuer à l'enrichissement des connaissances naturalistes et scientifiques à l'échelle régionale ou nationale

OBJECTIFS DE L'OPERATION, RESULTATS ATTENDUS ET MODE OPERATOIRE

Objectif : Faire connaître le rôle et l'intérêt de la RNR aux différents publics

Description de l'opération : La labellisation en RNR a permis depuis 2009 d'augmenter à la fois la qualité et la quantité de connaissances acquises sur la RNR et ses milieux. Ces connaissances peuvent bénéficier plus largement aux naturalistes, aux gestionnaires ou aux acteurs locaux. En retour le CEN des Pays de la Loire espère pouvoir accéder de manière plus large à des informations qui permettront de mieux analyser les résultats de la gestion.

Localisation

Réseau des partenaires du CEN, institutions, revues scientifiques, bases de données.

|                        | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Période d'intervention | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Réalisation            | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 100% | 0%   |

Opérateur

CEN des Pays de la Loire

Méthodologie/protocole

Les données recueillies seront transmises aux organismes qualifiés (CBN, GRETIA, etc.), dans le cadre de la signature de conventions de partenariat avec le CEN. Les acquis en matière de gestion seront transmis et diffusés aux gestionnaires des Pays de la Loire qui en feront la demande. Dans le cadre de protocoles nationaux, nos résultats pourront être transmis à RNF. Certains résultats ou découvertes intéressantes pourront faire l'objet de publications dans des revues naturalistes.

Indicateurs de résultat

- Nombre de publications et de productions écrites diffusées

- Nombre de demandes d'informations scientifiques par an

Synthèse budgétaire de l'opération (2016 - 2021)

|                     | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Budget prévisionnel | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 500 € | 500 € |
| Budget réel         | 400 € | 400 € | 400 € | 500 € | 500 € | 500 € |

Taux de réalisation : 75%

En 2017, un article a été publié sur la redécouverte de la punaise *Elasmotethus minor* en Sarthe, grâce à sa détection sur la RNR (Cherpitel et Chevreau, 2017).

Le 25 juin 2019, le séminaire « connaître, collecter et valoriser les données naturalistes ligériennes » organisé par le CEN PDL et la Fédération des CEN, visait à échanger sur les protocoles et suivis menés sur des espèces ou milieux emblématiques du bassin de la Loire. A cette occasion, l'étude



effectuée sur les Syrphes (action RE 2) a été présentée par leurs auteurs, Cyrille Dussaix (par ailleurs administrateur du CEN) et Simon Cavallès.

En juin 2020 a été publiée un article rendant compte des résultats de l'étude CMR sur l'Azuré du serpolet (action SE 3). Elle porte ainsi sur la dynamique de la métapopulation autour de la RNR (Ladislav et Chevreau, 2020).

Par ailleurs, l'ensemble des données de Géonature (nouvelle base de données du CEN remplaçant SiCEN) associées à la RNR des Caforts sont disponibles pour les partenaires.

#### Commentaires :

Dans les rapports d'activité, les actions PI 1 et PI 2 sont toujours traitées ensemble, sans distinction. Il aurait été plus pertinent de les distinguer, d'autant plus qu'il s'agit d'opérations très différentes.

| Formulation<br>3/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pertinence<br>2/3                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L'action est plus ou moins cohérente pour répondre aux objectifs. Un axe de communication aurait pu permettre de mieux y répondre, notamment par la mise en place de conférences. |
| Efficacité<br>2/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Efficience<br>1/3                                                                                                                                                                 |
| Deux publications scientifiques ont eu lieu sur les 6 ans, ainsi qu'une communication lors d'un séminaire national. Les demandes d'informations scientifiques n'ont pas été répertoriées au cours des années, mais sont à priori anecdotiques.<br>L'objectif de faire connaître la RNR au public scientifique n'est que partiellement atteint. | L'action est peu efficiente ; le budget alloué est faible, mais rien n'a été produit sur certaines années.                                                                        |
| Synthèse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |
| La mise en place du SINP rend cette action partiellement obsolète. Pour le prochain plan de gestion, des efforts seront à mener sur la vulgarisation des données par des conférences ou des articles scientifiques.                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |

## Synthèse de l'objectif opérationnel E.1

| Objectif opérationnel E.1     | Faire connaître l'intérêt et le rôle de la RNR aux différents publics |            |                                                                                                 |            |            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Opérations associées          | TU 4                                                                  |            |                                                                                                 |            |            |
| Suivis                        | PI 1, PI 2                                                            |            |                                                                                                 |            |            |
| Résultats                     | Au moins deux animations proposées chaque année                       |            |                                                                                                 |            |            |
|                               | Installer de nouveaux panneaux de sensibilisation                     |            |                                                                                                 |            |            |
| Analyse de l'objectif du plan | <b>Analyse au regard des enjeux du plan de gestion en cours</b>       |            | <b>Analyse au regard des objectifs et actions mis en place dans le plan de gestion en cours</b> |            |            |
|                               | Formulation                                                           | Pertinence | Résultats                                                                                       | Efficacité | Efficience |
|                               | 3/3                                                                   | 3/3        | 2/3                                                                                             | 2/3        | 2/3        |

### Synthèse

L'objectif opérationnel est plus ou moins atteint, le bilan étant :

- très positif pour le public scolaire grâce aux animations du CPIE,
- mitigé pour le grand public, avec une animation annuelle du CEN, mais un échec pour l'installation des panneaux pédagogiques aux entrées du site,
- mitigé auprès de la communauté scientifique,
- insuffisant pour les publics spécialisés.

## Synthèse de l'objectif à long terme E

### OLT E – Développer l'usage pédagogique de la RNR de façon structurée, en cohérence avec les objectifs patrimoniaux et la gestion par pâturage

#### OBJECTIFS ET OPERATIONS ASSOCIEES

Objectifs opérationnels

E.1 - Faire connaître l'intérêt et le rôle de la RNR aux différents publics

Problématique  
(PdG 2016 - 2021)

En tant que RNR, le site a pour vocation d'être un support pédagogique à destination du grand public ou des scolaires. Il convient au gestionnaire de mettre en œuvre et d'assurer une valorisation de la RNR auprès du public, en adéquation avec les contraintes inhérentes au site.

Synthèse de l'OLT

L'usage pédagogique a été maintenu lors de ce plan de gestion, en respectant les contraintes liées à la fragilité du patrimoine naturel du site. Le public scolaire a été particulièrement sensibilisé. Pour le prochain plan de gestion, cet objectif pourra être maintenu en accentuant plus sur les autres types de public.

### C.2.2.6. OLT F – Assurer les missions d'évaluation du plan de gestion, ainsi que la gestion administrative, comptable et financière de la RNR

Objectif opérationnel F.1 - Assurer les missions d'évaluation du plan de gestion

| AD 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | Elaborer annuellement le rapport d'activités |                           |                           |                           |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| OBJECTIFS DE L'OPERATION, RESULTATS ATTENDUS ET MODE OPERATOIRE                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                              |                           |                           |                           |                           |
| Objectif : Vérifier la gestion mise en place sur la RNR et l'ajuster si besoin.                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                              |                           |                           |                           |                           |
| Description de l'opération : Réaliser le bilan des opérations effectuées et les bilans financiers pour chaque année correspondant à la période du plan de gestion.                                                                                                                                             |                           |                                              |                           |                           |                           |                           |
| Période d'intervention                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2016<br>Dernier trimestre | 2017<br>Dernier trimestre                    | 2018<br>Dernier trimestre | 2019<br>Dernier trimestre | 2020<br>Dernier trimestre | 2021<br>Dernier trimestre |
| Réalisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%                      | 100%                                         | 100%                      | 100%                      | 100%                      | 100%                      |
| Opérateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                              |                           |                           |                           |                           |
| CEN des Pays de la Loire                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                              |                           |                           |                           |                           |
| Méthodologie/protocole                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                              |                           |                           |                           |                           |
| Chaque fin d'année, un rapport détaillant les bilans des actions de suivis, de gestion ou de valorisation est remis aux membres du comité consultatif, dans le but d'être discuté collectivement. Il est complété d'un compte de résultats financier, ainsi que d'un budget prévisionnel pour l'année à venir. |                           |                                              |                           |                           |                           |                           |
| Indicateurs de résultat                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                              |                           |                           |                           |                           |
| - Production d'un rapport d'activité annuel et transmission aux membres du comité consultatif                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                              |                           |                           |                           |                           |
| Synthèse budgétaire de l'opération (2016 - 2021)                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                              |                           |                           |                           |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2016                      | 2017                                         | 2018                      | 2019                      | 2020                      | 2021                      |

|                                   |         |         |         |       |         |         |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|
| Budget prévisionnel<br>CEN        | 4 000 € | 4 000 € | 2 250 € | 940 € | 940 €   | 1 000 € |
| Budget réel<br>CEN                | 4 000 € | 4 000 € | 2 250 € | 940 € | 1 000 € | 1 000 € |
| <b>Taux de réalisation : 100%</b> |         |         |         |       |         |         |

| <b>Formulation<br/>3/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Pertinence<br/>3/3</b>                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L'action est par essence pertinente et essentielle à la bonne réalisation du plan de gestion, elle assure un suivi annuel de toutes les opérations.                                                           |
| <b>Efficacité<br/>2/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Efficience<br/>3/3</b>                                                                                                                                                                                     |
| <p>Points négatifs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Très ponctuellement certaines actions non récurrentes ont été oubliées dans les rapports d'activités.</li> <li>- Des manques de précision sont à mentionner, certains comptes-rendus d'actions de gestion gagneraient à être plus détaillés pour un meilleur suivi.</li> <li>- Les chiffres de la RNR (en particulier concernant les données naturalistes) figurant en introduction gagneraient à être réactualisés plus souvent, à minima tous les 2 ans.</li> <li>- Les actions PI 1 et PI 2 sont systématiquement fusionnées (à tort), et PI 2 n'est quasiment jamais détaillée.</li> </ul> <p>Points positifs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le bilan financier, les actions de suivi (SE) et l'action PI1 sont majoritairement bien explicités.</li> <li>- Un rapport d'activités a systématiquement été produit chaque année et présenté en comité consultatif.</li> </ul> | Le budget s'est progressivement ajusté au cours des années, pour arriver à l'équivalent de 2 jours de rédaction par an à partir de 2020. Il s'agit du temps adéquat pour la bonne réalisation de l'opération. |
| <b>Synthèse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |
| Action essentielle pour assurer un suivi de la mise en œuvre du plan de gestion, qui gagnerait à être rédigée avec plus de précisions et de rigueur pour certaines parties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |

| <b>AD 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Evaluer à mi-parcours le plan de gestion</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>OBJECTIFS DE L'OPERATION, RESULTATS ATTENDUS ET MODE OPERATOIRE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |
| <p>Objectif : Vérifier l'impact de la gestion mise en place dans le plan de gestion et de l'ajuster si elle ne permet pas de répondre aux objectifs fixés.</p> <p>Description de l'opération : Evaluer à mi-parcours le plan de gestion. Réaliser un bilan des opérations effectuées ou non au cours de la période correspondant à la première moitié du plan de gestion.</p> |                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2016 | 2017 | 2018            | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|------|------|------|
| Période d'intervention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -    | -    | Mars à décembre | -    | -    | -    |
| Réalisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -    | -    | 100%            | -    | -    | -    |
| <b>Opérateur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |                 |      |      |      |
| CEN des Pays de la Loire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |                 |      |      |      |
| <b>Méthodologie/protocole</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |                 |      |      |      |
| Chacune des opérations du plan de gestion est évaluée indépendamment selon les critères d'évaluation et les indicateurs de résultats définis dans le plan de gestion. L'apport de nouvelles connaissances pour le site est mis en évidence, et l'impact des opérations et de la stratégie de gestion discutés au regard des objectifs assignés. La cohérence et la pertinence des objectifs opérationnels sont également mesurées. Enfin, un bilan des moyens financiers, matériels et humains mobilisés est dressé. |      |      |                 |      |      |      |
| Le CEN a recruté une stagiaire de Master 2 pendant 6 mois afin d'appuyer la réalisation de cette action.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |                 |      |      |      |
| <b>Indicateurs de résultat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                 |      |      |      |
| En 2018 : production d'un bilan intermédiaire 2016 – 2018 et d'un document prévisionnel 2019 - 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |                 |      |      |      |
| <b>Synthèse budgétaire de l'opération (2016 - 2021)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2016 | 2017 | 2018            | 2019 | 2020 | 2021 |
| Budget prévisionnel CEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      | 6 000 €         |      |      |      |
| Budget réel CEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      | 6 000 €         |      |      |      |
| <b>Taux de réalisation : 100%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |                 |      |      |      |

| <b>Formulation<br/>2/3</b>                                                                                                                    | <b>Pertinence<br/>3/3</b>      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Manque de précision dans le descriptif concernant la production d'un document prévisionnel sur la 2 <sup>nde</sup> moitié du plan de gestion. | Action tout à fait pertinente. |
| <b>Efficacité<br/>2/3</b>                                                                                                                     | <b>Efficienne<br/>3/3</b>      |
| Les différents critères d'évaluation font uniquement l'objet d'une note à 3 échelons (😊😐😞), mais ne sont pas explicités.                      | Action efficiente.             |
| <b>Synthèse</b>                                                                                                                               |                                |
| Action réalisée avec succès, avec recommandation d'amélioration pour le système d'évaluation.                                                 |                                |

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AD 7</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Evaluer à échéance de 6 ans le plan de gestion et rédiger le 3<sup>ème</sup> plan de gestion</b> |
| <b>OBJECTIFS DE L'OPERATION, RESULTATS ATTENDUS ET MODE OPERATOIRE</b>                                                                                                                         |                                                                                                     |
| Objectif opérationnel F.1 : Assurer les missions d'évaluation du plan de gestion                                                                                                               |                                                                                                     |
| Description de l'opération : Comme le prévoit la réglementation relative à la mise en place de RNR, le plan de gestion couvre une période de 6 ans, à l'issue de laquelle il doit être évalué. |                                                                                                     |



Suite à son évaluation, le présent plan de gestion a vocation à être suivi d'une nouvelle programmation sur 10 ans. Un nouveau plan de gestion sera alors à élaborer et réfléchi, si les conditions sont rassemblées, à une échelle « Vallée du Loir » (plan de gestion multi-sites).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--------------------|
| Période d'intervention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -    | -    | -    | -    | -    | 2021 et début 2022 |
| Réalisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -    | -    | -    | -    | -    | 100%               |
| <b>Opérateur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                    |
| CEN des Pays de la Loire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |                    |
| <b>Méthodologie/protocole</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                    |
| Chacune des opérations du plan de gestion est évaluée indépendamment selon les critères d'évaluation et les indicateurs de résultats définis dans le plan de gestion. L'apport de nouvelles connaissances pour le site est mis en évidence, et l'impact des opérations et de la stratégie de gestion discutés au regard des objectifs assignés. La cohérence et la pertinence des objectifs opérationnels sont également mesurées. Enfin, un bilan des moyens financiers, matériels et humains mobilisés est dressé. |      |      |      |      |      |                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réactualisation et rédaction du diagnostic du site.</li> <li>- Organisation de groupes de travail, concertation avec les acteurs de la RNR et les financeurs.</li> <li>- Elaboration, rédaction et budgétisation d'un nouveau programme d'actions sur 10 ans.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |                    |
| <b>Indicateurs de résultat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |                    |
| En 2021/2022 : production du bilan final du plan de gestion 2016 – 2021, selon le guide méthodologique (ATEN) en vigueur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |      |      |      |                    |
| Production du 3ème plan de gestion de la RNR : diagnostic et programme d'actions sur 10 ans en 2021/2022, selon le guide méthodologique (ATEN) en vigueur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |                    |
| <b>Synthèse budgétaire de l'opération (2016 - 2021)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021               |
| Budget prévisionnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -    | -    | -    | -    | -    | 10 550 €           |
| Budget réel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -    | -    | -    | -    | -    | 10 550 €           |
| <b>Taux de réalisation : 95%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                    |

#### Commentaires :

Lors de la rédaction du plan de gestion en 2015, 17 jours sont prévus pour l'évaluation (action AD 7) et 30 jours pour la rédaction du 3<sup>ème</sup> plan de gestion (action AD 8), soit un total de 47 jours.

Lors de l'évaluation à mi-parcours en 2018, les deux actions sont fusionnées en une seule (AD 7). Les moyens humains évoluent, avec la prévision d'un stage de 6 mois de niveau Master 2 ainsi que 15 jours de temps salarié.

Finalement, le stage de 6 mois n'a pas été mis en place, le budget alloué (3500€) a donc été transformé en 7 jours salariés. Au total, 22 jours sont ainsi attribués à la réalisation de cette action.

| <b>Formulation</b><br><b>3/3</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Pertinence</b><br><b>3/3</b>                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gain de cohérence et simplification avec la fusion des deux fiches AD 7 et AD 8.                                                                                                                                                                                     | Action pertinente à réaliser, et essentielle.                                                                       |
| <b>Efficacité</b><br><b>2/3</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Effizienz</b><br><b>1/3</b>                                                                                      |
| L'action aurait probablement gagné à être externalisée pour la partie Evaluation afin d'avoir un regard nouveau et objectif sur les actions réalisées. Dans la même idée, un accompagnement de quelques jours par une structure extérieure aurait pu être prévu pour | La transformation du stage de 6 mois de Master 2 en 7 jours salariés génère une diminution majeure de l'efficacité. |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| amener une autre vision sur la gestion à opérer sur le prochain plan de gestion.<br>Par ailleurs, le plan de gestion suivant ne sera finalement pas sur 10 ans, mais sur 6 ans.                                                                       |  |
| <b>Synthèse</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Véritable charnière indispensable à la bonne transition entre les plans de gestion, cette action est essentielle. Elle aurait gagné en efficacité et en efficience à être partiellement externalisée et à bénéficier de l'appui d'un stage de 6 mois. |  |

## Synthèse de l'objectif opérationnel F.1

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |            |            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Objectif opérationnel F.1</b> | <b>Assurer les missions d'évaluation du plan de gestion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                 |            |            |
| Opérations associées             | AD 5, AD 6, AD 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                 |            |            |
| Résultats                        | Production d'un rapport d'activités par an<br>Production d'un bilan intermédiaire et d'un prévisionnel pour 2019-2021 en 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                 |            |            |
| Analyse de l'objectif du plan    | <b>Analyse au regard des enjeux du plan de gestion en cours</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <b>Analyse au regard des objectifs et actions mis en place dans le plan de gestion en cours</b> |            |            |
|                                  | Formulation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pertinence | Résultats                                                                                       | Efficacité | Efficience |
|                                  | 3/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3/3        | 3/3                                                                                             | 2/3        | 2/2        |
|                                  | <b>Synthèse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |            |            |
|                                  | Les missions d'évaluation ont été assurées, à mi-parcours et en fin de plan de gestion. Un rapport d'activités annuel a également été rédigé chaque hiver. Dans l'ensemble, l'objectif opérationnel F.1 est donc atteint. Ces actions seront bien sûr à reconduire pour le prochain plan de gestion, en améliorant certains points liés à la méthode d'évaluation et en gagnant en rigueur et en détail pour les rapports d'activités annuels. |            |                                                                                                 |            |            |

Objectif opérationnel F.2 - Assurer les missions de gestion et d'évaluation administrative, financière et comptable

| AD 2                                                                                                                                                                                                    |                       | Rechercher des partenariats financiers et réaliser les suivis comptables et administratifs de la RNR |                       |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| OBJECTIFS DE L'OPERATION, RESULTATS ATTENDUS ET MODE OPERATOIRE                                                                                                                                         |                       |                                                                                                      |                       |                       |                       |                       |
| Objectif opérationnel F2 : Assurer les missions de gestion et d'évaluation administrative et financière                                                                                                 |                       |                                                                                                      |                       |                       |                       |                       |
| Description de l'opération : Un suivi administratif régulier est nécessaire à la mise en œuvre du plan de gestion. Le programme d'actions, prévoit notamment un budget prévisionnel pour chaque action. |                       |                                                                                                      |                       |                       |                       |                       |
| Période d'intervention                                                                                                                                                                                  | 2016<br>Toute l'année | 2017<br>Toute l'année                                                                                | 2018<br>Toute l'année | 2019<br>Toute l'année | 2020<br>Toute l'année | 2021<br>Toute l'année |
| Réalisation                                                                                                                                                                                             | 100%                  | 100%                                                                                                 | 100%                  | 100%                  | 100%                  | 100%                  |
| Opérateur                                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                      |                       |                       |                       |                       |
| CEN des Pays de la Loire                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                      |                       |                       |                       |                       |
| Méthodologie/protocole                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                      |                       |                       |                       |                       |
| - Pas de méthodologie particulière.                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                      |                       |                       |                       |                       |
| Indicateurs de résultat                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                      |                       |                       |                       |                       |
| - Pas d'indicateur.                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                      |                       |                       |                       |                       |
| Synthèse budgétaire de l'opération (2016 - 2021)                                                                                                                                                        |                       |                                                                                                      |                       |                       |                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                         | 2016                  | 2017                                                                                                 | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2021                  |
| Budget prévisionnel CEN                                                                                                                                                                                 | 4 000 €               | 4 000 €                                                                                              | 2700 €                | 1 410 €               | 1 410 €               | 1 410 €               |
| Budget réel CEN                                                                                                                                                                                         | 4 000 €               | 4 000 €                                                                                              | 2700 €                | 1 410 €               | 1 500 €               | 1 500 €               |
| Taux de réalisation : 100%                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                      |                       |                       |                       |                       |

| Formulation<br>3/3 | Pertinence<br>3/3                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                         |
| Efficacité<br>2/3  | Effizienz<br>1/3                                                                                                        |
|                    | <p>A noter que le budget alloué a été réajusté au cours du plan de gestion.</p> <p>Temps sous-estimé de 2019 à 2021</p> |

## Synthèse

Le suivi financier s'est déroulé chaque année avec succès. Un dossier FEDER est monté pour le co-financement, ce qui induit une augmentation du temps à passer sur les demandes de subventions pour chaque RNR.

**AD 3**

**Réactualiser les conventions de gestion entre les agriculteurs  
gestionnaires et le CEN des Pays de la Loire**

### OBJECTIFS DE L'OPERATION, RESULTATS ATTENDUS ET MODE OPERATOIRE

Objectif opérationnel F2 : Assurer les missions de gestion et d'évaluation administrative et financière.  
Description de l'opération : Les conventions liant le gestionnaire de la RNR et les agriculteurs-gestionnaires sont obsolètes. Afin d'assurer une mise en œuvre efficace du plan de gestion, nous proposons d'en élaborer de nouvelles, qui tiendront notamment compte des modifications apportées par le nouveau plan de gestion et les nouveaux statuts du CEN des Pays de la Loire.

|                                                                                                                               | 2016     | 2017               | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------|------|------|------|
| Période d'intervention                                                                                                        | Reportée | Courant de l'année | -    | -    |      | -    |
| Réalisation                                                                                                                   | 0%       | 100%               | -    | -    | -    | -    |
| <b>Opérateur</b>                                                                                                              |          |                    |      |      |      |      |
| CEN des Pays de la Loire                                                                                                      |          |                    |      |      |      |      |
| <b>Méthodologie/protocole</b>                                                                                                 |          |                    |      |      |      |      |
| -                                                                                                                             |          |                    |      |      |      |      |
| <b>Indicateurs de résultat</b>                                                                                                |          |                    |      |      |      |      |
| - Production et signature d'une nouvelle convention de gestion le CEN Pays de la Loire et les agriculteurs concernés en 2016. |          |                    |      |      |      |      |
| <b>Synthèse budgétaire de l'opération (2016 - 2021)</b>                                                                       |          |                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                               | 2016     | 2017               | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Budget prévisionnel CEN                                                                                                       | 600 €    | 600 €              | -    | -    | -    | -    |
| Budget réel CEN                                                                                                               | 0 €      | 600 €              | -    | -    | -    | -    |
| <b>Taux de réalisation : 50%</b>                                                                                              |          |                    |      |      |      |      |

En 2017 : travail sur une nouvelle convention avec M. Nicolas Fleurance, agriculteur, qui a mis ses brebis à partir de la même année sur la RNR. Signature en 2018.

| <b>Formulation</b><br>3/3 | <b>Pertinence</b><br>3/3 |
|---------------------------|--------------------------|
| RAS                       | RAS                      |
| <b>Efficacité</b><br>2/3  | <b>Efficienne</b><br>3/3 |



|                                                                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Difficultés à trouver un éleveur pérenne.                                                                                                                                           | RAS |
| <b>Synthèse</b>                                                                                                                                                                     |     |
| Une convention a bien été signée, les résultats espérés sont donc atteints. En revanche, l'éleveur ne met plus ses brebis sur la RNR et le partenariat n'est donc plus d'actualité. |     |

| AD 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | Préparer et participer à l'animation du comité consultatif |       |       |         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-------|
| OBJECTIFS DE L'OPERATION, RESULTATS ATTENDUS ET MODE OPERATOIRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                            |       |       |         |       |
| Objectif : Discuter, partager de nouvelles idées et conseils sur les actions menées durant l'année, notamment en ce qui concerne leur adéquation avec les objectifs du plan de gestion et leur réelle application sur la RNR.                                                                                                                                                             |       |                                                            |       |       |         |       |
| Description de l'opération : Inviter tous les membres du comité consultatif à se réunir. Le CEN Pays de la Loire prépare les documents nécessaires, anime les réunions et établit un compte-rendu de la réunion par la suite.                                                                                                                                                             |       |                                                            |       |       |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2016  | 2017                                                       | 2018  | 2019  | 2020    | 2021  |
| Période d'intervention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |       |       |         |       |
| Réalisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100%  | 100%                                                       | 100%  | 100%  | 100%    | 100%  |
| Opérateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                            |       |       |         |       |
| CEN des Pays de la Loire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                            |       |       |         |       |
| Méthodologie/protocole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                            |       |       |         |       |
| La Région Pays de la Loire et le CEN Pays de la Loire invitent les membres du comité consultatif à se réunir. Le CEN Pays de la Loire prépare les documents nécessaires, anime la réunion et établit un compte-rendu (finalisé et validé par la Région). Ce compte-rendu est envoyé à tous les membres. Le CEN peut être amené à présenter une problématique particulière sur le terrain. |       |                                                            |       |       |         |       |
| Indicateurs de résultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                            |       |       |         |       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Organisation et animation d'une réunion du comité consultatif par an</li><li>- Production et transmission d'un compte-rendu pour chacune de ces réunions</li></ul>                                                                                                                                                                                |       |                                                            |       |       |         |       |
| Synthèse budgétaire de l'opération (2016 - 2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                            |       |       |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2016  | 2017                                                       | 2018  | 2019  | 2020    | 2021  |
| Budget prévisionnel CEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 800 € | 800 €                                                      | 900 € | 940 € | 940 €   | 940 € |
| Budget réel CEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 800 € | 800 €                                                      | 900 € | 940 € | 1 000 € | 500 € |
| Taux de réalisation : 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                            |       |       |         |       |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>Formulation</b><br>3/3 | <b>Pertinence</b><br>3/3 |
| RAS                       | RAS                      |
| <b>Efficacité</b><br>3/3  | <b>Efficienne</b><br>3/3 |
| RAS                       | RAS                      |

| Synthèse                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Depuis 2018, les comités consultatifs de la RNR des Caforts et de la RNR des Dureaux sont communs (même élue régionale). En 2019, était inclus également au comité consultatif de ces deux RNR la RNR des marais de Cré/La Flèche. |

## Synthèse de l'objectif opérationnel F.2

|                               |                                                                                                              |            |                                                                                          |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Objectif opérationnel F.2     | Assurer les missions de gestion et d'évaluation administrative, financière et comptable                      |            |                                                                                          |            |            |
| Opérations associées          | AD 2, AD 3, AD 4                                                                                             |            |                                                                                          |            |            |
| Résultats                     | Réactualisation de la nouvelle convention de gestion entre les agriculteurs-gestionnaires et le gestionnaire |            |                                                                                          |            |            |
|                               | Réunion du comité consultatif au moins une fois par an                                                       |            |                                                                                          |            |            |
| Analyse de l'objectif du plan | Analyse au regard des enjeux du plan de gestion en cours                                                     |            | Analyse au regard des objectifs et actions mis en place dans le plan de gestion en cours |            |            |
|                               | Formulation                                                                                                  | Pertinence | Résultats                                                                                | Efficacité | Efficience |
|                               | Synthèse                                                                                                     |            |                                                                                          |            |            |

## Synthèse de l'objectif à long terme F

### OLT F – Assurer les missions d'évaluation du plan de gestion, ainsi que la gestion administrative, comptable et financière de la RNR

#### OBJECTIFS ET OPERATIONS ASSOCIEES

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objectifs opérationnels         | F.1 - Assurer les missions d'évaluation du plan de gestion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Problématique (PdG 2016 - 2021) | F.2 - Assurer les missions de gestion et d'évaluation administrative, financière et comptable<br>Cet objectif vise à assurer une lisibilité financière à moyen terme aux organismes en charge de la gestion de la RNR, dans le but d'assurer le bon déroulement de la mise en œuvre du plan de gestion. Il s'appuie notamment sur la diversification des sources de financement. |
| Synthèse de l'OLT               | Les deux objectifs opérationnels associés sont atteints ; les missions d'évaluation ont été exécutées, ainsi que les missions de gestion d'ordre administratif, financier et comptable.                                                                                                                                                                                          |

## C.2.4 -OPERATIONS NON PREVUES

Aucune opération non inscrite dans le plan de gestion n'a eu besoin d'être réalisée.

## C.2.5 SYNTHÈSE DE L'ÉVALUATION PAR OPERATIONS : FORMULATION, PERTINENCE, EFFICACITÉ ET EFFICIENCE

Tableau 13. Synthèse de l'évaluation par opération. Les notes de chaque paramètre sont récapitulées ici. Trois valeurs sont possibles : 1/3 en rouge, 2/3 en orange ou 3/3 en vert, cette dernière notation correspondant à une note maximale.

| Objectif à long terme                                        | Code et intitulé de l'opération |                                                                                  | Formulation | Pertinence | Efficacité | Efficience | Commentaires                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A<br>Maintenir, restaurer et conserver les habitats naturels | TU 1                            | Restaurer le coteau calcaire par coupe et débroussaillage                        | 3/3         | 3/3        | 2/3        | 3/3        | Maintien résiduel d'un ourlet forestier sciaphile à imputer au substrat marneux relativement profond. |
|                                                              | TU 2                            | Abattre et exporter les noyers                                                   | 3/3         | 3/3        | 2/3        | 3/3        | Le milieu n'est toujours pas stabilisé, mais diversification du cortège lépidoptérique                |
|                                                              | TU 3                            | Restaurer des bandes de sols nus par décapage                                    | 2/3         | 3/3        | 1/3        | 1/3        | L'opération a été annulée                                                                             |
|                                                              | TE 1                            | Entretenir les zones restaurées                                                  | 1/3         | 3/3        | 2/3        | 3/3        | Cf. commentaires TU 1                                                                                 |
|                                                              | TE 2                            | Faucher tardivement avec exportation le coteau calcaire                          | 2/3         | 3/3        | 2/3        | 3/3        |                                                                                                       |
|                                                              | TE 3                            | Faucher tardivement avec exportation la prairie humide                           | 2/3         | 2/3        | 3/3        | 3/3        |                                                                                                       |
|                                                              | TE 4                            | Poser une clôture temporaire séparant les zones fauchées des zones non fauchées. | 3/3         | 2/3        | 2/3        | 2/3        | Action annulée à mi-parcours                                                                          |
|                                                              | TE 5                            | Pâturer tardivement et de manière extensive le coteau calcaire                   | 3/3         | 3/3        | 1/3        | 2/3        | Pâturage irrégulier selon années.                                                                     |
|                                                              | TE 6                            | Pâturer tardivement et de manière extensive la prairie humide                    | 3/3         | 3/3        | 1/3        | 2/3        | Absence de pâturage les 4 premières années.                                                           |
|                                                              | TE 7                            | Entretenir par débroussaillage manuel les zones non gérées mécaniquement         | 3/3         | 3/3        | 3/3        | 3/3        |                                                                                                       |
|                                                              | TE 8                            | Entretenir les zones rudérales                                                   | 2/3         | 1/3        | 1/3        | 1/3        | Action annulée à mi-parcours                                                                          |
|                                                              | TE 11                           | Contrôler et entretenir le linéaire de clôtures                                  | 2/3         | 3/3        | 2/3        | 3/3        | En 2016 et 2017, l'entretien des clôtures de la prairie a entraîné la                                 |

|                                                             |       |                                                                                                                |     |     |     |     |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |       |                                                                                                                |     |     |     |     | casse du ruban de fil électrique à plusieurs endroits                                                 |
|                                                             | SE 1  | Mettre en place un suivi phytosociologique des habitats naturels                                               | 1/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | Un exemple de relevé phytosociologique est présenté en annexe 2.                                      |
|                                                             | SE 2  | Suivre annuellement les plantes patrimoniales                                                                  | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 |                                                                                                       |
|                                                             | SE 3  | Compléter voire accroître les connaissances sur les populations d'Azuré du Serpolet ( <i>Maculinea arion</i> ) | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 |                                                                                                       |
|                                                             | SE 4  | Suivre annuellement les populations de cuivré des marais ( <i>Lycaena dispar</i> )                             | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 2/3 | A synchroniser avec autres sites de la vallée du Loir.                                                |
|                                                             | SE 7  | Suivre annuellement les populations de Lépidoptères                                                            | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 |                                                                                                       |
|                                                             | SE 9  | Suivre annuellement les populations d'Orthoptères en lien avec les communautés végétales                       | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |                                                                                                       |
|                                                             | RE 1  | Effectuer une étude des cortèges de Syrphes et déduire un diagnostic de l'état de conservation des habitats    | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |                                                                                                       |
|                                                             | AD 1  | Effectuer une veille foncière en périphérie de la RNR                                                          | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 |                                                                                                       |
| B<br>Maintenir et conserver les populations de Chiroptères. | SE 5  | Suivre annuellement les populations de Chiroptères sur la RNR                                                  | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |                                                                                                       |
|                                                             | SE 10 | Rechercher les colonies de Chiroptères en parturition aux alentours de la RNR                                  | 3/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | L'opération n'a pas été réalisée du fait des pertes de compétences internes en matière de Chiroptères |
|                                                             | SE 11 | Effectuer un suivi acoustique des populations de Chiroptères sur le périmètre de la RNR                        | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 2/3 | L'opération n'a été réalisée que partiellement, en 2016.                                              |
| C<br>Maintenir une mosaïque paysagère riche et diversifiée  | TE 9  | Entretenir le linéaire de haies, les arbres isolés et les têtards                                              | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 |                                                                                                       |
|                                                             | SE 1  | Mettre en place un suivi phytosociologique des habitats naturels                                               | 1/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 |                                                                                                       |
|                                                             | RE 3  | Effectuer un inventaire des Coléoptères saproxyliques de la RNR                                                | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |                                                                                                       |
| D                                                           | SE 1  | Mettre en place un suivi phytosociologique des habitats                                                        | 1/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 |                                                                                                       |



|                                                                                                                                            |      |                                                                                                                  |     |     |     |     |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assurer le suivi et l'évaluation des opérations de gestion et approfondir les connaissances sur le fonctionnement et le patrimoine         |      | naturels                                                                                                         |     |     |     |     |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                            | SE 2 | Suivre annuellement les plantes patrimoniales                                                                    | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                            | SE 3 | Compléter voire accroître les connaissances sur les populations d'Azuré du Serpolet ( <i>Maculinea arion</i> )   | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                            | SE 4 | Suivre annuellement les populations de Cuivré des marais ( <i>Lycaena dispar</i> )                               | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 2/3 |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                            | SE 7 | Suivre annuellement les populations de lépidoptères                                                              | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                            | SE 8 | Suivre annuellement les populations de reptiles                                                                  | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | L'opération a été supprimée pour les trois dernières années, car les résultats sont trop faibles et inexploitable. |
|                                                                                                                                            | SE 9 | Suivre annuellement les populations d'Orthoptères en lien avec les communautés végétales                         | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                            | RE 1 | Effectuer une étude des cortèges de syrphes et déduire un diagnostic de l'état de conservation des habitats      | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                            | RE 2 | Etudier le fonctionnement hydrologique et la composition pédologique de la RNR                                   | 2/3 | 3/3 | 1/3 | 1/3 | L'opération a été annulée                                                                                          |
|                                                                                                                                            | RE 3 | Effectuer un inventaire des coléoptères saproxyliques de la RNR                                                  | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |                                                                                                                    |
| E<br>Développer l'usage pédagogique de la RNR de façon structurée, en cohérence avec les objectifs patrimoniaux et la gestion par pâturage | TU 4 | Elaborer et poser de nouveaux panneaux pédagogiques                                                              | 2/3 | 2/3 | 1/3 | 3/3 | L'opération n'a pas abouti.                                                                                        |
|                                                                                                                                            | PI 1 | Sensibiliser et former les publics à la biodiversité grâce à la RNR                                              | 3/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                            | PI 2 | Contribuer à l'enrichissement des connaissances naturalistes et scientifiques à l'échelle régionale ou nationale | 3/3 | 2/3 | 2/3 | 1/3 |                                                                                                                    |

|                                                                                                                         |                  |                                                                                                         |     |     |     |     |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------|
| F<br>Assurer les missions d'évaluation du plan de gestion, ainsi que la gestion administrative, comptable et financière | AD 2             | Rechercher des partenariats financiers et réaliser les suivis comptables administratifs de la RNR       | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 1/3 |                                          |
|                                                                                                                         | AD 3             | Réactualiser les conventions de gestion entre les agriculteurs gestionnaires et le Cen Pays de la Loire | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | Difficultés à trouver un éleveur pérenne |
|                                                                                                                         | AD 4             | Préparer et participer à l'animation du comité consultatif                                              | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |                                          |
|                                                                                                                         | AD 5             | Elaborer annuellement le rapport d'activités                                                            | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 |                                          |
|                                                                                                                         | AD 6             | Evaluer à mi-parcours le plan de gestion                                                                | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 |                                          |
|                                                                                                                         | AD 7<br>(+ AD 8) | Evaluer à échéance de 6 ans le plan de gestion et rédiger le 3ème plan de gestion                       | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 1/3 |                                          |

## C.2.6- SYNTHÈSE DE L'ÉVALUATION DES OBJECTIFS OPERATIONNELS

| Objectif à long terme |                                                                                                                                    | Objectif opérationnel du plan de gestion |                                                                                                                                                                                 | Résultat global                                                                 | Objectif atteint | Commentaires                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                     | Maintenir, restaurer et conserver les habitats naturels                                                                            | A.1                                      | Maintenir, restaurer et favoriser l'extension des habitats de pelouse, d'ourlet tout en assurant la conservation d'une mosaïque d'habitats calcicoles variés                    | La majorité des indicateurs est validée, sauf l'extension en surface de pelouse | Majoritairement  | L'objectif de restauration et d'extension de l'habitat de pelouse n'était pas réalisable au regard des conditions du milieu. |
|                       |                                                                                                                                    | A.2                                      | Conserver et entretenir la diversité de milieux humides                                                                                                                         | Indicateurs validés                                                             | oui              | Difficultés d'analyse de l'indicateur concernant le Cuivré des Marais                                                        |
|                       |                                                                                                                                    | A.3                                      | Augmenter la superficie bénéficiant d'une gestion conservatoire                                                                                                                 | 5 parcelles acquises en 2017, pour 2,5 ha                                       | oui              |                                                                                                                              |
| B                     | Maintenir et conserver les populations de Chiroptères                                                                              | B.1                                      | Assurer la conservation des populations de Chiroptères dans et hors de la RNR                                                                                                   | Conservation des chiroptères en RNR atteint                                     | Majoritairement  | Difficultés d'assurer la conservation des chiroptères hors de la RNR.                                                        |
| C                     | Maintenir une mosaïque paysagère riche et diversifiée                                                                              | C.1                                      | Conserver le patrimoine bocager et les éléments qui lui sont liés (arbres isolés, arbres têtard,...)                                                                            | Maintien du patrimoine bocager                                                  | oui              | Il aurait pu être implémenté un indicateur de réussite sur les arbres têtard et les arbres isolés.                           |
| D                     | Assurer le suivi et l'évaluation des opérations de gestion et approfondir les connaissances sur le fonctionnement et le patrimoine | D.1                                      | Accroître le niveau de connaissance sur la diversité biologique du site tout en assurant un contrôle des groupes bio-indicateurs pour un meilleur suivi des actions de gestions | Tous les indicateurs atteints, mais aspect bio-indication perfectible           | Majoritairement  | Belle amélioration de la connaissance, mais des efforts sont à faire pour les autres suivis afin d'améliorer l'outil.        |
|                       |                                                                                                                                    | D.2                                      | Compléter et approfondir les connaissances sur le fonctionnement abiotique de la RNR                                                                                            | Aucun résultat, opération associée annulée                                      | Non              | Objectif opérationnel pertinent, mais non effectué.                                                                          |
| E                     | Développer l'usage                                                                                                                 | E.1                                      | Faire connaître l'intérêt et le rôle                                                                                                                                            | Animations                                                                      | Majoritairement  | Bilan :                                                                                                                      |

|   |                                                                                                                    |     |                                                                                         |                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | pédagogique de la RNR de façon structurée, en cohérence avec les objectifs patrimoniaux et la gestion par pâturage |     | de la RNR aux différents publics                                                        | effectuées chaque année. Panneaux pédagogiques non posés |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- mitigé pour le grand public, avec une animation annuelle du CEN, mais un échec pour l'installation des panneaux pédagogiques aux entrées du site,</li> <li>- mitigé auprès de la communauté scientifique, insuffisant pour les publics spécialisés.</li> </ul> |
| F | Assurer les missions d'évaluation du plan de gestion, ainsi que la gestion administrative, comptable et financière | F.1 | Assurer les missions d'évaluation du plan de gestion                                    | Production de tous les rapports                          | oui |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |                                                                                                                    | F.2 | Assurer les missions de gestion et d'évaluation administrative, financière et comptable | Bonne gestion administrative et financière               | oui | La gestion financière est essentiellement du temps passé sur les dossiers FEDER ce qui peut rapidement prendre beaucoup de temps. Attention donc à ne pas sous évaluer le temps dans la fiche du prochain plan de gestion.                                                                              |



### C.3.1- PRESENTATION SYNTHETIQUE DES OPERATIONS D'AMELIORATION DES CONNAISSANCES DU PLAN DE GESTION

Au cours des six années de mise en œuvre du plan de gestion, la connaissance naturaliste sur la RNR s'est améliorée significativement, en particulier grâce à l'objectif à long terme D « Assurer le suivi et l'évaluation des opérations de gestion et approfondir les connaissances sur le fonctionnement du patrimoine ».

Au-delà des actions ponctuelles d'inventaires ciblés, l'ensemble des protocoles de suivis scientifiques participe à l'acquisition de connaissances.

A ce jour, 1475 taxons différents ont été contactés sur la RNR entre 1983 (année de prospection la plus ancienne correspondant au premier inventaire répertorié des chauves-souris et des papillons de jour du site) et aujourd'hui. Pour la comptabilisation, on entend par « taxons » les espèces uniques ainsi que les déterminations au genre lorsque ces derniers ne sont pas représentés en tant qu'espèces (certitude d'avoir un taxon nouveau). Certaines de ces espèces sont considérées disparues. Les oiseaux contactés en vol et n'ayant pas utilisé le site (chasse, reproduction, halte, hivernage) ne sont pas comptabilisés.

Entre le 1<sup>er</sup> janvier 2016 et le 31 décembre 2021, la connaissance naturaliste de la RNR augmente de manière notable avec **444 taxons découverts**, jamais mentionnés auparavant (figure suivante). En 6 ans, cela correspond donc à une hausse de plus de 25% du nombre d'espèces connues. Dans la majorité des cas on peut supposer que ces espèces étaient déjà présentes sur la RNR, mais n'avaient pas été détectées, faute de moyens, de temps ou de compétences. Dans certains cas, il s'agit d'espèces non établies de manière pérenne sur le site (notamment pour les lépidoptères et les oiseaux).




Figure 42. Nombre d'espèces découvertes sur la RNR depuis 2016 au sein de chaque groupe paraphylétique (n=444). Les « autres invertébrés » sont détaillés sur le graphique suivant.




Figure 43. Détail du nombre de nouvelles espèces pour la catégorie "Autres invertébrés" (n=73)

A cela il est à noter la réactualisation de 401 taxons, déjà connus de la RNR (données de 2015 et antérieures) et recontactés entre 2016 et 2021.

Au total, 845 taxons sont donc contactés au cours des six ans du plan de gestion, soit 57% de la richesse spécifique cumulée en près de 40 ans de connaissances.

Les paragraphes ci-après détaillent de manière synthétique les principales connaissances acquises.

### 1. Amélioration de la connaissance sur les Syrphes

L'étude du cortège des syrphes sur 2 ans (action RE 1) a permis une augmentation remarquable de la connaissance des Syrphes de la RNR, avec 101 espèces identifiées dont 78 nouvelles pour la RNR et 3 nouvelles pour le département. Quelques-unes de ces espèces sont considérées comme rares à l'échelle départementale et/ou patrimoniales.

### 2. Amélioration de la connaissance sur les Coléoptères

En six ans, 162 nouveaux coléoptères pour la RNR sont détectés, via les prospections opportunistes, mais surtout via l'étude réalisée par le GRETIA en 2020 sur le cortège saproxylique (action RE 3). Parmi ces espèces, 23 sont considérées patrimoniales.

Le passage et les pièges des experts entomologistes du GRETIA dans le cadre de cette étude ont également permis de manière opportuniste d'identifier 104 autres insectes dont 49 font l'objet d'une première mention pour la RNR.

### 3. Amélioration de la connaissance sur les Hémiptères

66 nouveaux Hémiptères (punaises) sont détectés en six ans. Il s'agit uniquement de données opportunistes (sans cadre de financement dédié), grâce aux passages du GRETIA, mais surtout aux passages réguliers d'un salarié du CEN ayant la compétence pour la détermination de ce groupe.

### 4. Amélioration de la connaissance sur les Lépidoptères

Le suivi annuel du cortège de papillons de jour (SE 7) a permis de contacter 7 nouvelles espèces. Pour la majorité il s'agit d'espèces patrimoniales, mais non établies sur le site de manière pérenne (observation très ponctuelle d'un individu de passage). C'est par exemple le cas de la Lucine (*Hamearis lucina*), du Fluoré (*Colias alfacariensis*) du Grand nacré (*Speyeria aglaja*) ou de l'Hespérie de la mauve (*Pyrgus malvae*). Cette amélioration de la connaissance est donc à relativiser.

Par ailleurs, l'étude CMR réalisée par un stagiaire a permis de dresser une cartographie des stations potentielles et avérées d'Azuré du serpolet dans un rayon de 5000m autour de la RNR. Mieux comprendre la métapopulation à cette échelle permet une meilleure compréhension de la station située aux Caforts. Des informations ont également pu être collectées sur les stations de fourmis et plante hôtes.

Enfin, des sessions de piégeage nocturne bénévoles, ainsi que la collecte de données en marge du suivi diurne SE 7, ont permis d'augmenter la connaissance en termes d'hétérocères, avec 18 nouvelles espèces.

#### **5. Amélioration de la connaissance sur les Mollusques**

Un atelier de Malacologie continentale organisé par le CEN et le GRETIA a eu lieu en vallée du Loir en septembre 2017. A cette occasion, la RNR des Caforts a bénéficié du passage des naturalistes. 28 nouvelles espèces sont détectées.

#### **6. Amélioration de la connaissance sur les plantes**

23 plantes nouvelles sont mentionnées entre 2016 et 2021, grâce à des observations opportunistes ou dans le cadre de l'action SE 1.

#### **7. Amélioration de la connaissance sur les fourmis**

La RNR n'avait jamais fait l'objet d'inventaire sur les fourmis avant ce plan de gestion. Des inventaires ont été menés en 2016 et en 2018 (cadre suivi SE3). Les tentes Malaise de l'étude sur les syrphes (RE1) ont également amené des données complémentaires. Au total, 17 espèces sont répertoriées sur la RNR.

#### **8. Amélioration de la connaissance sur les autres invertébrés (hors rhopalocères)**

Il s'agit uniquement d'observations opportunistes, qui cumulées représentent une part significative de l'amélioration de la connaissance sur les 6 ans.

### **C.3.4- CONCLUSION SUR L'AMELIORATION DES CONNAISSANCES**

L'amélioration de la connaissance sur la biodiversité de la RNR est indéniable. Elle porte principalement (à 86%) sur l'entomofaune, taxon qui présente une marge importante d'amélioration au regard de la grande diversité de ce groupe. De plus, une partie de l'équipe salarié présente des compétences dans ce domaine. Parallèlement, deux actions déterminantes ont joué un rôle majeur dans l'augmentation de la connaissance entre 2016 et 2021 : l'étude sur les Syrphes (2018-2019) et l'étude sur les coléoptères saproxyliques (2020) dont le passage d'experts entomologistes sur la RNR a permis d'aller au-delà des taxons fixés par l'étude en termes de connaissance. A noter également l'accueil d'un atelier/colloque sur la malacologie, qui aura permis non seulement de faire connaître la RNR auprès de partenaires et d'un public spécialisé, mais aussi d'apporter des connaissances supplémentaires sur les mollusques. Ce genre d'action est donc à réitérer dans la mesure du possible. Les autres nouvelles mentions concernent des données opportunistes, permises grâce aux nombreux passages de l'équipe du CEN ou de partenaires, principalement en marge d'actions financées.

Enfin, il est utile de rappeler ici que les naturalistes (bénévoles ou non) sont les bienvenus sur la RNR, avec des visites en autonomie ou de manière opportuniste en profitant du passage d'un salarié du CEN. La RNR est ainsi de plus en plus connue du monde naturaliste et les connaissances naturalistes de chacun sont une réelle plus-value pour la RNR.

### C.3.5- SYNTHÈSE ET ANALYSE SUR LES SUIVIS

Dans l'ensemble, les suivis sont pertinents et au-delà d'accroître la connaissance de la RNR, ils représentent des bio-outils intéressants pour évaluer la gestion. L'évaluation est cependant lacunaire à ce jour. Plus de lien doit être fait entre suivis naturalistes et gestion. L'utilisation d'outils statistiques permettant de chercher des corrélations entre résultats des suivis, gestion et autres facteurs biotiques et abiotiques pourrait être une solution. De plus, la qualité des indicateurs de résultat est primordiale pour obtenir une évaluation correcte.

## D. EVALUATION DES MOYENS FINANCIERS, MATÉRIELS ET HUMAINS

### D.1- BILAN FINANCIER

#### D.1.1 LES DÉPENSES

Un bilan général des dépenses est présenté dans le tableau suivant, avec le coût total, le coût moyen annuel ainsi que le coût moyen par hectare. Les dépenses réelles totales atteignent 291 766,55€ sur les 6 ans de gestion, soit une somme inférieure au prévisionnel de l'ordre de 7% (voir second tableau).

Tableau 14. Bilan général des dépenses

|                                    | Prévisionnel       | Réel                |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Coût total</b>                  | <b>314 905 €</b>   | <b>291 766,55 €</b> |
| <b>Coût par année</b>              | <b>52 484,17 €</b> | <b>48 627,76 €</b>  |
| <b>Coût par hectare</b>            | <b>50 224,08 €</b> | <b>46 533,74 €</b>  |
| <b>Coût par hectares et par an</b> | <b>8 370,68 €</b>  | <b>7 755,62 €</b>   |

Tableau 15. Différences entre budgets prévisionnel et réel entre 2016 et 2021

|              | 2016        | 2017     | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2016-2021    |
|--------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Prévisionnel | 64 790 €    | 51 315 € | 58 305 €    | 51 765 €    | 43 365 €    | 45 365 €    | 314 905 €    |
| Réel         | 57 118,62 € | 48 101 € | 51 374,80 € | 44 695,50 € | 43 606,97 € | 46 869,66 € | 291 766,55 € |
| Fluctuation  | -12%        | -6%      | -12%        | -14%        | 1%          | 3%          | -7%          |

Le détail des dépenses par opération et par an est présenté dans le tableau de synthèse suivant.



Tableau 16. Synthèse des dépenses par action entre 2016 et 2021

| Opérations      | 2016           |                   | 2017            |                    | 2018            |                    | 2019            |                    | 2020            |                    | 2021            |                    | TOTAL Prévi .   | TOTAL Réel         | Différence        |
|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
|                 | Prévi.         | Réel              | Prévi.          | Réel               | Prévi.          | Réel               | Prévi.          | Réel               | Prévi.          | Réel               | Prévi.          | Réel               |                 |                    |                   |
| TU 1            | 3 130 €        | 3 125,60 €        | 3 130 €         | 3 130 €            | - €             | - €                |                 |                    | - €             | - €                | - €             | - €                | 6 260 €         | 6 255,60 €         | 4,40 €            |
| TU 2            | 1 790 €        | 1 928,30 €        | - €             | - €                | - €             | - €                |                 |                    | - €             | - €                | - €             | - €                | 1 790 €         | 1 928,30 €         | - 138,30 €        |
| TU 3            | - €            | - €               | - €             | - €                | 4 800 €         | 1 800 €            | - €             | - €                | - €             | - €                | - €             | - €                | 4 800 €         | 1 800 €            | 3 000 €           |
| TU 4            | - €            | - €               | - €             | - €                | - €             | - €                | 4 880 €         | - €                | - €             | - €                | - €             | - €                | 4 880 €         | - €                | 4 880 €           |
| <b>Total TU</b> | <b>4 920 €</b> | <b>5 053,90 €</b> | <b>3 130 €</b>  | <b>3 130 €</b>     | <b>4 800 €</b>  | <b>1 800 €</b>     | <b>4 880 €</b>  | <b>- €</b>         | <b>- €</b>      | <b>- €</b>         | <b>- €</b>      | <b>- €</b>         | <b>17 730 €</b> | <b>9 983,90 €</b>  | <b>7 746,10 €</b> |
| TE 1            | - €            | - €               | 2 215 €         | 2 075 €            | 1 290 €         | 1 305,50 €         | 1 590 €         | 1 732 €            | 1 590 €         | 1 649,60 €         | 1 590 €         | 1 000 €            | 8 275 €         | 7 762,10 €         | 512,90 €          |
| TE 2            | 1 500 €        | 1 400 €           | 1 500 €         | 1 640 €            | 1 375 €         | 1 295,80 €         | 940 €           | 940 €              | 940 €           | 1 000 €            | 940 €           | 1 000 €            | 7 195 €         | 7 275,80 €         | - 80,80 €         |
| TE 3            | - €            | - €               | - €             | - €                | 1 375 €         | 675 €              | 3 205 €         | 2 885,50 €         | 1 705 €         | 1 942,17 €         | 1 705 €         | 2 787,66 €         | 7 990 €         | 8 290,33 €         | - 300,33 €        |
| TE 4            | - €            | - €               | - €             | - €                | 450 €           | 450 €              | - €             | - €                | - €             | - €                | - €             | - €                | 450 €           | 450 €              | - €               |
| TE 5            | 1 600 €        | 1 600 €           | 1 600 €         | 1 600 €            | 900 €           | 900 €              | 705 €           | 705 €              | 705 €           | 750 €              | 705 €           | 750 €              | 6 215 €         | 6 305 €            | - 90 €            |
| TE 6            | - €            | - €               | - €             | - €                | 450 €           | 450 €              | 470 €           | 470 €              | 470 €           | 500 €              | 470 €           | 500 €              | 1 860 €         | 1 920 €            | - 60 €            |
| TE 7            | 1 400 €        | 1 450 €           | 1 400 €         | 1 450 €            | 1 050 €         | 1 100 €            | 1 405 €         | 1 405 €            | 1 405 €         | 1 450 €            | 1 405 €         | 1 450 €            | 8 065 €         | 8 305 €            | - 240 €           |
| TE 8            | 3 230 €        | 3 219,40 €        | 3 230 €         | 3 249,25 €         | 2 250 €         | 2 250 €            | - €             | - €                | - €             | - €                | - €             | - €                | 8 710 €         | 8 718,65 €         | - 8,65 €          |
| TE 9            | - €            | - €               | - €             | - €                | - €             | - €                | 1 620 €         | 1 642 €            | - €             | - €                | 3 440 €         | 3 222 €            | 5 060 €         | 4 864 €            | 196 €             |
| TE 10           | - €            | - €               | - €             | - €                | - €             | - €                | - €             |                    | - €             | - €                | - €             | - €                | - €             | - €                | - €               |
| TE 11           | 1 740 €        | 1 728,62 €        | 1 740 €         | 1 816,50 €         | 1 840 €         | 2 064 €            | 5 140 €         | 3 291,40 €         | 5 140 €         | 3 765 €            | 5 140 €         | 4 600 €            | 20 740 €        | 17 265,52 €        | 3 474,48 €        |
| <b>Total TE</b> | <b>9 470 €</b> | <b>9 398,02 €</b> | <b>11 685 €</b> | <b>11 830,75 €</b> | <b>10 980 €</b> | <b>10 490,30 €</b> | <b>15 075 €</b> | <b>13 070,90 €</b> | <b>11 955 €</b> | <b>11 056,77 €</b> | <b>15 395 €</b> | <b>15 309,66 €</b> | <b>74 560 €</b> | <b>71 156,40 €</b> | <b>3 403,60 €</b> |
| SE 1            | 2 000 €        | 2 000 €           | 2 000 €         | 2 000 €            | 1 800 €         | 1 800 €            | 1 410 €         | 1 410 €            | 1 410 €         | 1 500 €            | 1 410 €         | 1 500 €            | 10 030 €        | 10 210 €           | - 180 €           |
| SE 2            | 2 000 €        | 2 000 €           | 2 000 €         | 2 000 €            | 900 €           | 900 €              | 1 410 €         | 1 410 €            | 1 410 €         | 1 500 €            | 1 410 €         | 1 500 €            | 9 130 €         | 9 310 €            | - 180 €           |
| SE 3            | 4 000 €        | 4 000 €           | - €             | - €                | 3 600 €         | 3 600 €            | 5 510 €         | 5 510 €            | - €             | - €                | - €             | - €                | 13 110 €        | 13 110 €           | - €               |
| SE 4            | - €            | - €               | 3 200 €         | 3 200 €            | - €             | - €                | 1 880 €         | 1 880 €            | - €             | - €                | 1 880 €         | 2 000 €            | 6 960 €         | 7 080 €            | - 120 €           |
| SE 5            | 1 600 €        | 1 600 €           | 1 600 €         | 1 600 €            | 900 €           | 900 €              | 1 880 €         | 1 880 €            | 1 880 €         | 2 000 €            | 1 880 €         | 2 000 €            | 9 740 €         | 9 980 €            | - 240 €           |
| SE 6            | 1 600 €        | 1 600 €           | 1 600 €         | 1 600 €            | 900 €           | 900 €              | - €             | - €                | - €             | - €                | - €             | - €                | 4 100 €         | 4 100 €            | - €               |
| SE 7            | 4 000 €        | 4 000 €           | 4 000 €         | 4 000 €            | 2 700 €         | 2 700 €            | 2 820 €         | 2 820 €            | 2 820 €         | 3 000 €            | 2 820 €         | 3 000 €            | 19 160 €        | 19 520 €           | - 360 €           |
| SE 8            | 2 000 €        | 2 000 €           | 2 000 €         | 2 000 €            | 1 125 €         | 1 125 €            | - €             | - €                | - €             | - €                | - €             | - €                | 5 125 €         | 5 125 €            | - €               |
| SE 9            | 2 800 €        | 2 800 €           | - €             | - €                | 2 250 €         | 2 250 €            | 1 410 €         | 1 410 €            | 1 410 €         | 1 500 €            | 1 410 €         | 1 500 €            | 9 280 €         | 9 460 €            | - 180 €           |
| SE 10           | - €            | - €               | 2 000 €         | - €                | - €             | - €                | - €             | - €                | - €             | - €                | - €             | - €                | 2 000 €         | - €                | 2 000 €           |
| SE 11           | 1 000 €        | 1 000 €           | 1 000 €         | -                  | -               | -                  | -               | -                  | -               | -                  | -               | -                  | 2 000 €         | 1 000 €            | 1 000 €           |

|                 |                 |                    |                 |                   |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                  |                     |                    |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|
|                 |                 |                    |                 | €                 | €               | €                  | €               | €                  | €               | €                  | €               | €                  |                  |                     |                    |
| <b>Total SE</b> | <b>21 000 €</b> | <b>21 000 €</b>    | <b>19 400 €</b> | <b>16 400 €</b>   | <b>14 175 €</b> | <b>14 175 €</b>    | <b>16 320 €</b> | <b>16 320 €</b>    | <b>8 930 €</b>  | <b>9 500 €</b>     | <b>10 810 €</b> | <b>11 500 €</b>    | <b>90 635 €</b>  | <b>88 895 €</b>     | <b>1 740 €</b>     |
| RE 1            | -<br>€          | -<br>€             | -<br>€          | -<br>€            | 5 800 €         | 1 800 €            | 6 880 €         | 6 880 €            | -<br>€          | -<br>€             |                 |                    | 12 680 €         | 8 680 €             | 4 000 €            |
| RE 2            | -<br>€          | -<br>€             | -<br>€          | -<br>€            | 5 300 €         | 800 €              | -<br>€          | -<br>€             | -<br>€          | -<br>€             |                 |                    | 5 300 €          | 800 €               | 4 500 €            |
| RE 3            | -<br>€          | -<br>€             | -<br>€          | -<br>€            | -<br>€          | -<br>€             | -<br>€          | -<br>€             | 9 880 €         | 10 100 €           | -<br>€          | -<br>€             | 9 880 €          | 10 100 €            | - 220 €            |
| <b>Total RE</b> | -<br>€          | -<br>€             | -<br>€          | -<br>€            | <b>11 100 €</b> | <b>2 600 €</b>     | <b>6 880 €</b>  | <b>6 880 €</b>     | <b>9 880 €</b>  | <b>10 100 €</b>    | -<br>€          | -<br>€             | <b>27 860 €</b>  | <b>19 580 €</b>     | <b>8 280 €</b>     |
| PI 1            | 4 600 €         | 3 606,70 €         | 4 600 €         | 3 890,25 €        | 4 550 €         | 4 434,50 €         | 4 610 €         | 3 014,60 €         | 4 610 €         | 4 450,20 €         | 4 610 €         | 4 570 €            | 27 580 €         | 23 966,25 €         | 3 613,75 €         |
| PI 2            | 400 €           | 400 €              | 400 €           | 400 €             | 400 €           | 400 €              | -<br>€          | -<br>€             | -<br>€          | -<br>€             | -<br>€          | -<br>€             | 1 200 €          | 1 200 €             | - €                |
| <b>Total PI</b> | <b>5 000 €</b>  | <b>4 006,70 €</b>  | <b>5 000 €</b>  | <b>4 290,25 €</b> | <b>4 950 €</b>  | <b>4 834,50 €</b>  | <b>4 610 €</b>  | <b>3 014,60 €</b>  | <b>4 610 €</b>  | <b>4 450,20 €</b>  | <b>4 610 €</b>  | <b>4 570 €</b>     | <b>28 780 €</b>  | <b>25 166,25 €</b>  | <b>3 613,75 €</b>  |
| AD 1            | 700 €           | 400 €              | 6 000 €         | 400 €             | 450 €           | 450 €              | 710 €           | 710 €              | 4 700 €         | 5 000 €            | 710 €           | 740 €              | 13 270 €         | 7 700 €             | 5 570 €            |
| AD 2            | 4 000 €         | 4 000 €            | 4 000 €         | 4 000 €           | 2 700 €         | 2 700 €            | 1 410 €         | 1 410 €            | 1 410 €         | 1 500 €            | 1 410 €         | 1 500 €            | 14 930 €         | 15 110 €            | - 180 €            |
| AD 3            | 600 €           | -<br>€             | -<br>€          | 600 €             | -<br>€          | -<br>€             | -<br>€          | -<br>€             | -<br>€          | -<br>€             | -<br>€          | -<br>€             | 600 €            | 600 €               | - €                |
| AD 4            | 800 €           | 800 €              | 800 €           | 800 €             | 900 €           | 900 €              | 940 €           | 940 €              | 940 €           | 1 000 €            | 940 €           | 1 000 €            | 5 320 €          | 5 440 €             | - 120 €            |
| AD 5            | 4 000 €         | 4 000 €            | 4 000 €         | 4 000 €           | 2 250 €         | 2 250 €            | 940 €           | 940 €              | 940 €           | 1 000 €            | 940 €           | 1 000 €            | 13 070 €         | 13 190 €            | - 120 €            |
| AD 6            | -<br>€          | -<br>€             | -<br>€          | -<br>€            | 6 000 €         | 6 000 €            | -<br>€          | -<br>€             | -<br>€          | -<br>€             | -<br>€          | -<br>€             | 6 000 €          | 6 000 €             | - €                |
| AD 7            | -<br>€          | -<br>€             | -<br>€          | -<br>€            | -<br>€          | -<br>€             | -<br>€          | -<br>€             | -<br>€          | -<br>€             | 10 550 €        | 10 550 €           | 10 550 €         | 10 550 €            | - €                |
| AD 8            | -<br>€          | -<br>€             | -<br>€          | -<br>€            | -<br>€          | -<br>€             | -<br>€          | -<br>€             | -<br>€          | -<br>€             | -<br>€          | -<br>€             | - €              | - €                 | - €                |
| <b>Total AD</b> | <b>10 100 €</b> | <b>9 200 €</b>     | <b>14 800 €</b> | <b>9 800 €</b>    | <b>12 300 €</b> | <b>12 300 €</b>    | <b>4 000 €</b>  | <b>4 000 €</b>     | <b>7 990 €</b>  | <b>8 500 €</b>     | <b>14 550 €</b> | <b>14 790 €</b>    | <b>63 740 €</b>  | <b>58 590 €</b>     | <b>5 150 €</b>     |
| <b>Total</b>    | <b>50 490 €</b> | <b>48 658,62 €</b> | <b>54 015 €</b> | <b>45 451 €</b>   | <b>58 305 €</b> | <b>46 199,80 €</b> | <b>51 765 €</b> | <b>43 285,50 €</b> | <b>43 365 €</b> | <b>43 606,97 €</b> | <b>45 365 €</b> | <b>46 169,66 €</b> | <b>303 305 €</b> | <b>273 371,55 €</b> | <b>29 933,45 €</b> |

|              |                 |                 |                 |                 |                 |                    |                 |                 |                 |                    |                 |                    |                  |                     |                    |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Inv.</b>  | <b>26 320 €</b> | <b>26 454 €</b> | <b>22 930 €</b> | <b>19 930 €</b> | <b>36 475 €</b> | <b>24 975 €</b>    | <b>28 080 €</b> | <b>23 200 €</b> | <b>18 810 €</b> | <b>19 600 €</b>    | <b>10 810 €</b> | <b>11 500 €</b>    | <b>143 425 €</b> | <b>125 658,90 €</b> | <b>17 766,10 €</b> |
| <b>Fon</b>   | <b>24 170 €</b> | <b>22 205 €</b> | <b>31 085 €</b> | <b>25 521 €</b> | <b>21 830 €</b> | <b>21 224,80 €</b> | <b>23 685 €</b> | <b>20 086 €</b> | <b>24 555 €</b> | <b>24 006,97 €</b> | <b>34 555 €</b> | <b>34 669,66 €</b> | <b>159 880 €</b> | <b>147 712,65 €</b> | <b>12 167,35 €</b> |
| <b>TOTAL</b> | <b>50 490 €</b> | <b>48 659 €</b> | <b>54 015 €</b> | <b>45 451 €</b> | <b>58 305 €</b> | <b>46 199,80 €</b> | <b>51 765 €</b> | <b>43 286 €</b> | <b>43 365 €</b> | <b>43 606,97 €</b> | <b>45 365 €</b> | <b>46 169,66 €</b> | <b>303 305 €</b> | <b>273 371,55 €</b> | <b>29 933,45 €</b> |

## D.1.2 LES RECETTES

Ci-dessous, la contribution de chaque financeur à la mise en œuvre du plan de gestion 2016-2021.

**Tableau 17. Détail des subventions reçues chaque année (réel)**

|                             | 2016               | 2017            | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | Total               |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Subvention régionale CEN    | 28 479,21 €        | 24 658 €        | 25 037,40 €        | 22 847,75 €        | 20 052,99 €        | 24 844,66 €        | 145 920,01 €        |
| Subvention européenne FEDER | 21 815,41 €        | 14 457,09 €     | 16 264,66 €        | 21 847,75 €        | 23 553,98 €        | 22 025 €           | 119 963,89 €        |
| Agence de l'eau             | 6 824 €            | 8 985,91 €      | 10 072,74 €        | -                  | -                  | -                  | 25 882,65 €         |
| <b>Total réel CEN</b>       | <b>57 118,62 €</b> | <b>48 101 €</b> | <b>51 374,80 €</b> | <b>44 695,50 €</b> | <b>43 606,97 €</b> | <b>46 869,66 €</b> | <b>291 766,55 €</b> |

## D.1.3 BILAN HUMAIN

10 salariés du CEN ont contribué à la mise en œuvre du plan de gestion des Caforts entre 2016 et 2021. En cumulé cela représente un total de 372,4 jours, ce qui équivaut à une moyenne de 62 jours par an, soit un peu plus d'un tiers d'ETP.

**Tableau 18. Temps passé pour la RNR des Caforts entre 2016 et 2021**

| Salariés           | Nombre d'heures      | Nombre de jours (7,8h) |
|--------------------|----------------------|------------------------|
| AVRILLA Antoine    | 372,8                | 47,8                   |
| BANASIAK Marek     | 143,8                | 18,4                   |
| BONENFANT Julie    | 96,45                | 12,4                   |
| CHEVREAU Johannic  | 717,5                | 92,0                   |
| D'HIER Guillaume   | 93,6                 | 12,0                   |
| GAUDIN Catherine   | 104,05               | 13,3                   |
| LANTUEJOUL Éric    | 1043,35              | 133,8                  |
| LEPOULTIER Adeline | 146,85               | 18,8                   |
| NORMAND Fabrice    | 93,25                | 12,0                   |
| VANNUCCI Olivier   | 93,05                | 11,9                   |
| <b>Total CEN</b>   | <b>2904,7 heures</b> | <b>372,4 jours</b>     |

A ce temps salarié il est à ajouter :

- un stage de 6 mois, dont 50% du temps dédié à l'action d'évaluation à mi-parcours du plan de gestion (Ludivine Gaffé, Master 2)
- un stage de 6 mois sur l'action SE 3 relative au suivi de l'Azuré du serpolet par CMR (Maëlle Ladislav, licence professionnelle)

- les différents volontaires en service civique qui se sont succédés chaque année (sauf 2021) et qui ont appuyé les salariés pour certaines missions de la RNR : Marie Dervellois (2016), Julie Bonenfant (2017), Antoine Avrilla (2018), Cécile Chaillot et Maïlys Goussard (2019), Thibault Bournouville (2020).

- L'appui de bénévoles pour l'action SE 4 relative au comptage des pontes du Cuivré des marais et pour l'action SE 9 relative au comptage hivernal des chauves-souris. Entre 1 et 5 bénévoles ont appuyé les salariés lors de chaque opération.

## D.1.4 BILAN MATERIEL

Du matériel permettant la mise en œuvre des actions de gestion aux Caforts a été acquis en 2020 et en 2021. Il a également vocation à servir sur d'autres RNR et pour d'autres sites du CEN.

**Tableau 19. Matériel acheté au cours du plan de gestion 2016-2021**

| Année | Matériel                                           | Prix      | Fournisseur     |
|-------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 2018  | Tondeuse-débroussailleuse                          | 3490,54 € | Equip et Jardin |
| 2021  | Débroussailleuse, Perche élagueuse et tronçonneuse | 4100 €    | Grangeray       |



## BIBLIOGRAPHIE

| Auteurs                                                                                                               | Années | Ouvrages                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACEMAV coll., DUGUET R. &amp; MELKI F. ed., 2003</b>                                                               | 2003   | Les Amphibiens de France, Belgique et Luxembourg. Collection Parthénopé, éditions Biotopé, Mèze (France) : 480p.                                                                                                                            |
| <b>AGUILAR (d') &amp; DOMMANGET J.L.</b>                                                                              | 1998   | Guide des Libellules d'Europe et d'Afrique du Nord. Delachaux et Niestlé S.A., Lausanne (Switzerland). Paris, 2 <sup>ème</sup> édition. 463p.                                                                                               |
| <b>BALIGA M.F., BASSO F., BEDOUET F., CATTEAU E., CORNIER T., DUHAMEL F., MORA F., TOUSSAINT B. &amp; VALENTIN B.</b> | 2006   | Guide des végétations des zones humides de la région Nord-Pas de Calais. Tome 1 : végétations aquatiques et hygrophiles. Centre Régional de Phytosociologie agréé Conservatoire Botanique National de Bailleul. 359p. Version provisoire.   |
| <b>BELLMANN H. et LUQUET G.</b>                                                                                       | 1995   | Guide des Sauterelles, Grillons et Criquets d'Europe occidentale. Delachaux et Niestlé Lausanne – Paris : 383p.                                                                                                                             |
| <b>BERLAND L.</b>                                                                                                     | 1958   | Atlas des Hyménoptères de France, Belgique et Suisse. Vol. I. Tenthredines, Parasites, Porte-aiguillons (Béthylidés). Ed. N. Boubée & Cie, Paris (VI <sup>e</sup> ) : 155p.                                                                 |
| <b>BISSARDON M. &amp; GUIBAL L.</b>                                                                                   | 2003   | CORINE biotopes. Version originale des types d'habitats français. ENGREF et ATEN : 179 p.                                                                                                                                                   |
| <b>BOURNERIAS M., ARNAL G., BOCK C.</b>                                                                               | 2001   | Guide des groupements végétaux de la région parisienne, Belin, 640p.                                                                                                                                                                        |
| <b>BRAUD S., BRAUD Y., CHARRIER M., DURAND, O., GABORY O., VRIGNAULT J.-D.</b>                                        | 2007   | Les Araignées de Maine-et-Loire. Inventaire et cartographie. Bulletin de synthèse n°7 de l'association Mauges Nature. 230p.                                                                                                                 |
| <b>BRINDEJONC O., GESLIN J., GUITTON H., HUNAUT G., LACROIX P., LE BAIL J., PONCET L. &amp; THOMASSIN G.</b>          | 2008   | Liste rouge régionale des plantes vasculaires rares et/ou menacées en Pays de la Loire. CBNBrest / CBNBP pour la Région Pays de la Loire. 51p + annexes.                                                                                    |
| <b>Cavaillès S. et Dussaix C.</b>                                                                                     | 2019   | Cavaillès, S. et Dussaix, C., 2019. Application de la méthode Syrph the Net aux habitats de la réserve naturelle régionale « Coteau et prairies des Caforts » (72). Rapport pour le Conservatoire d'Espaces Naturels Pays de la Loire. 33p. |
| <b>Cherpitel Thomas &amp; Chevreau Johannic</b>                                                                       | 2017   | Redécouverte d' <i>Elasmotherus minor</i> Horváth, 1899 dans la Sarthe et sa distribution aux abords du Massif armoricain (Hemiptera : Acanthosomatidae).                                                                                   |
| <b>CHINERY M. &amp; CUISIN M.</b>                                                                                     | 1994   | Les Papillons d'Europe (Rhopalocères et hétérocères diurnes). Delachaux et Niestlé S.A., Lausanne (Suisse). Paris                                                                                                                           |
| <b>COMMISSION EUROPÉENNE DG XI</b>                                                                                    | 1997   | Manuel d'interprétation des habitats de l's. Version EUR 15 : 109p.                                                                                                                                                                         |

| Auteurs                                                                    | Années | Ouvrages                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COSTE H.</b>                                                            | 1990   | Flore descriptive et illustrée de la France, de la Corse et des contrées limitrophes, Albert Blanchard, tome 1, 2 et 3.                                                                                |
| <b>CRASSOUS C., KARAS F.</b>                                               | 2007   | Guide de gestion des tourbières et marais alcalins des vallées alluviales de France septentrionale. Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels, Pôle-relais tourbières, 203p.                    |
| <b>CSRPN &amp; DIREN des Pays de la Loire</b>                              | 1999   | Liste régionale indicative des espèces déterminantes en Pays de la Loire établie par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine naturel (1999). Espèces animales.                                  |
| <b>CSRPN &amp; DIREN des Pays de la Loire</b>                              | 1999   | Liste régionale indicative des espèces déterminantes en Pays de la Loire établie par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine naturel (1999). Espèces végétales.                                 |
| <b>DOMMANGET J.L.</b>                                                      | 1987   | Étude faunistique et bibliographique des Odonates de France. MNHN, Secrétariat de la Faune et de la Flore : 283p.                                                                                      |
| <b>DOMMANGET J.L.</b>                                                      | 1994   | Atlas préliminaire des Odonates de France. Société Française d'Odonatologie. Ministère de l'Environnement : 92p.                                                                                       |
| <b>DUPIEUX N</b>                                                           | 2004   | Démarche d'harmonisation des protocoles de suivi scientifique des sites du programme Loire nature                                                                                                      |
| <b>DUPIEUX N.</b>                                                          | 1998   | La gestion conservatoire des tourbières de France, premiers éléments scientifiques et techniques; Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels, 244p.                                              |
| <b>Eden 62</b>                                                             | 2013   | <i>Proposition d'une méthode d'évaluation de plan de gestion d'espace naturel.</i> 40p.                                                                                                                |
| <b>FAILLIE L. &amp; PASSIN R.</b>                                          | 1983   | Les Lépidoptères de la Sarthe. Alexanor, 13 (2): 55-62                                                                                                                                                 |
| <b>FAILLIE L. &amp; PASSIN R.</b>                                          | 1983   | Les Lépidoptères de la Sarthe. Alexanor, 13 (3): 98-117                                                                                                                                                |
| <b>FIERS V., GAUVRIT B., GAVAZZI E., HAFFNER P., MAURIN H. &amp; Coll.</b> | 1997   | Statut de la Faune de France métropolitaine. Statuts de protection, degrés de menace, statuts biologiques. Col Patrimoines Naturels, volume 24. Paris, IEBG MNHN, RNF, Ministère environnement : 225p. |
| <b>FOUCAULT B. (de)</b>                                                    | 1984   | Systémique, structuralisme et synsystématique des prairies hygrophiles des plaines atlantiques françaises. Thèse. Rouen. 675p.                                                                         |
| <b>FOURNIER P.</b>                                                         | 1947   | Les quatre flores de France. Editions Lechevalier: 1104p.                                                                                                                                              |

| Auteurs                                          | Années    | Ouvrages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FOURNIER E.</b>                               | 1999      | Espaces Naturels Sensibles. Département de la Sarthe. Étude partielle n°1. Sélection, hiérarchisation et délimitation de 37 sites : 103p. + annexes. Conservatoire du Patrimoine naturel sarthois, Conseil Général de la Sarthe.                                                                                                                    |
| <b>FOURNIER E.</b>                               | 1999      | Inventaire du Patrimoine naturel 2ème génération ZNIEFF. Rapport de synthèse : cantons de Ballon, de Beaumont-sur-Sarthe, de Conlie, de la Flèche, de Sablé-sur-Sarthe, de la Suze-sur-Sarthe, du Mans, du Mans Nord-est, du Mans Nord-Ouest, du Mans Sud-est, du Mans Sud-ouest et d'Allonnes. Conservatoire du Patrimoine naturel sarthois : 70p. |
| <b>FOURNIER E.</b>                               | 2004      | Évaluation patrimoniale des mares sarthoises. 102p + annexes. Conservatoire du Patrimoine naturel sarthois, Conseil Général de la Sarthe.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>GENTIL A.</b>                                 | 1905      | Inventaire général des observations ornithologiques sarthoises (1800-1905). Bulletin de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe, LX : 81-149.                                                                                                                                                                                       |
| <b>GENTIL A.</b>                                 | 1914      | Inventaire général des plantes vasculaires de la Sarthe. 2 <sup>ème</sup> supplément. Bulletin de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe, 44 : 233-280.                                                                                                                                                                            |
| <b>GRAND D., BOUDOT J.P.</b>                     | 2006      | Les libellules de France, Belgique et Luxembourg. Biotope, Mèze, Collection Parthénopé, 480 p.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>GSO</b>                                       | 1992      | Les Oiseaux Nicheurs de la Sarthe : 169p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>GUINOCHET M. &amp; de VILMORIN R.</b>         | 1973-1984 | Flore de France. 5 fascicules. Editions du CNRS, Paris. 1879p.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>HEIDEMANN H. &amp; SEIDENBUCH R.</b>          | 2002      | Larves et exuvies des Libellules de France et d'Allemagne (sauf la Corse). Société Française d'Odonatologie. 415p.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>HERBRECHT F., COURTIAL C. &amp; HUBERT B.</b> | 2021      | Inventaire des Coléoptères saproxyliques de la RNR « Coteau et prairies des Caforts » (Sarthe). Rapport d'étude du GRETIA pour le Conservatoire d'Espaces Naturels des Pays de la Loire : 38 pp.                                                                                                                                                    |
| <b>HUNAUT G., MORET J.</b>                       | 2003      | Atlas des plantes protégées de la Sarthe. Patrimoines Naturels, 56 : 363 p.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>JAHS H .M</b>                                 | 1996      | Guide des fougères mousses et lichens d'Europe. Editions Delachaux et Niestlé, Paris, pp. 257                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>JONSSON L.</b>                                | 1993      | Les Oiseaux d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Coll. Guide d'identification. Ed. Nathan, Paris : 559 p.                                                                                                                                                                                                                                |

| Auteurs                                       | Années    | Ouvrages                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ladislav M. et Chevreau J.</b>             | 2020      | Etude de la dynamique de population de <i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758), L'Azuré du serpolet, dans une réserve de la Sarthe (Lepidoptera : Lycaenidae). Oreina n°50, juin 2020.                                                                     |
| <b>LA DOCUMENTATION FRANÇAISE</b>             | 2001-2005 | Cahiers d'habitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. Tome 1 à 7.                                                                                                                                   |
| <b>LAFRANCHIS T.</b>                          | 2000      | Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles. Collection Parthénopée, éditions Biotopie : 448p.                                                                                                                              |
| <b>LANGLOIS D. et GILG O</b>                  | 2007      | <i>Démarche d'harmonisation des protocoles de suivi scientifique des sites du réseau RNF</i>                                                                                                                                                               |
| <b>LE RESTE</b>                               | 2008      | Expertise chiroptérologique, site des Caforts, Luché-Pringé. Office National des Forêts, Conservatoire du Patrimoine naturel sarthois : 5p.                                                                                                                |
| <b>LHONORE J.</b>                             | 1998      | Rapport d'études de l'OPIE, vol.2. Biologie, écologie et répartition de quatre espèces de Lépidoptères Rhopalocères protégés (Lycaenidae, Satyridae) dans l'Ouest de la France. Laboratoire de biosystématique des insectes, université du Maine. Le Mans. |
| <b>MAIZERET C. &amp; OLIVIER L.</b>           | 1996      | Les objectifs de gestion des espaces protégés: éléments pour la définition des objectifs. ATEN : 88p.                                                                                                                                                      |
| <b>MARCHADOUR B. &amp; SECHET E. (coord.)</b> | 2008      | Avifaune prioritaire en Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, conseil régional des Pays de la Loire, 221p.                                                                                                                        |
| <b>MNHN &amp; WWF</b>                         | 1994      | Le Livre Rouge. Inventaire de la Faune menacée en France. – Nathan : 175p.                                                                                                                                                                                 |
| <b>NÖLLERT A. &amp; C.</b>                    | 2003      | Guide des Amphibiens d'Europe (Biologie, Identification, Répartition). Delachaux et Niestlé S.A, Lonay (Switzerland). Paris 383p.                                                                                                                          |
| <b>NÜSS J.H. &amp; WENDLER A.</b>             | 1997      | Libellules. Guide d'identification des Libellules de France, d'Europe septentrionale et centrale. Société Française d'Odonatologie. 130p.                                                                                                                  |
| <b>ORABI P.</b>                               | 1999      | Inventaire entomologique sur les sites naturels du CPNS. CPNS                                                                                                                                                                                              |
| <b>RAMEAU J.C. et al.</b>                     | 2003      | CORINE biotopes. Version originale. Types d'habitats français. ATEN, ENGREF : 179p.                                                                                                                                                                        |
| <b>RÉSERVES NATURELLES DE FRANCE</b>          | 1998      | Guide méthodologique des plans de gestion de réserves naturelles. MATE, ATEN. Montpellier : 96p.+4                                                                                                                                                         |
| <b>SANTIANI M.</b>                            | 2002      | Amphibiens et reptiles, Découverte nature. Editions Artemis, pp. 127.                                                                                                                                                                                      |
| <b>TILLY B., JP., JJ.</b>                     | 1997      | Cartographie des orchidées de la Sarthe. Conservatoire du patrimoine naturel sarthois, 63p.                                                                                                                                                                |



| Auteurs                          | Années | Ouvrages                                                                                       |
|----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TOLMAN T. et LEWINGTON R.</b> | 1999   | Guide des papillons d'Europe et d'Afrique du Nord.<br>Delachaux et Niestlé S.A., Paris : 320p. |

# ANNEXES

## Annexe 1. Décision de classement en RNR pour le site des Caforts



### Classement de la Réserve Naturelle Régionale

#### Coteau et prairies des Caforts

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales,

**VU** le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 332-1 à L. 332-27, R.332-30 à R.332-48 et R.332-68 à R. 332-81,

**VU** la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,

**VU** le décret n°2005-491 du 18 mai 2005 relatif aux réserves naturelles,

**VU** la délibération du Conseil régional des 26 et 27 janvier 2006 relative aux réserves naturelles régionales,

**VU** la délibération du Conseil régional des 22 et 23 janvier 2007 donnant délégation à la Commission permanente pour la création de Réserves Naturelles Régionales,

**VU** la demande du Conservatoire du Patrimoine Naturel Sarthois en date du 23 mai 2008, sollicitant le classement en réserve naturelle régionale de terrains dont il est propriétaire,

**VU** l'avis favorable du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel en date du 29 juin 2009 sur le classement en Réserve Naturelle Régionale des coteau et prairies des Caforts et validant son plan de gestion,

**VU** les avis rendus par le Conseil Général de la Sarthe en date du 11 septembre 2009, la Commune de Luché-Pringé en date du 29 septembre 2009 et la Préfecture de Région des Pays de la Loire en date du 24 septembre 2009.

**CONSIDERANT** l'importance du site pour la préservation de la faune, de la flore et des paysages caractéristiques

**CONSIDERANT** la volonté du propriétaire de maintenir la valeur patrimoniale et pédagogique du site en lui garantissant un statut de protection,

## ARTICLE 1 : Dénomination et délimitation

Sont classées en réserve naturelle régionale, sous la dénomination de «Réserve Naturelle Régionale des coteau et prairies des Caforts », les parcelles cadastrales suivantes :

| Commune      | Section | Numéros de parcelles | Superficie   |
|--------------|---------|----------------------|--------------|
| Luché-Pringé | YP      | 2                    | 2ha 47a 07ca |
|              | YB      | 44, 45, 46, 47, 49   | 73 a 35 ca   |

Soit une superficie totale de 3 hectares 20 ares et 42 centiares dans le département de la Sarthe.

Le périmètre de la réserve naturelle régionale, reporté sur la carte IGN au 1/25 000, ainsi que les parcelles et emprises mentionnées, reportées sur le montage cadastral au 1/5 000, figurent dans l'annexe 1-1 qui fait partie intégrante de la présente délibération. Ces cartes et plans peuvent être consultés à la mairie de Luché-Pringé.

## ARTICLE 2 : Durée du classement

Ce classement est valable pour une durée de 6 ans. Le classement est renouvelable après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) et accord du Président du Conseil Régional des Pays de la Loire, sauf demande expresse présentée par les propriétaires entre trois et six mois avant l'expiration du classement.

## ARTICLE 3 : Mesures de protections

### Article 3.1 : Protection de la faune de la réserve

A l'exception des opérations validées par le Comité Consultatif, il est interdit :

1° D'introduire dans la réserve des animaux non domestiques quel que soit leur stade de développement sous réserve d'autorisation par le Président du Conseil Régional des Pays de la Loire après avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel ;

2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve (sous réserve de l'application des articles 3.5 et 3.9), sauf à des fins scientifiques autorisés par le Président du Conseil Régional des Pays de la Loire après avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel ;

3° De troubler ou de déranger volontairement les animaux domestiques et non domestiques par quelque moyen que ce soit (sous réserve de l'application des articles 3.4, 3.5, 3.8 et 3.9) ;

### Article 3.2 : Protection de la flore de la réserve

A l'exception des opérations validées par le Comité Consultatif, il est interdit, sous réserve de l'application des articles 3.4, 3.5, 3.9 et 3.10 :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve sous forme de semis ou de plants des essences végétales non spontanées ou étrangères à la région, sauf autorisation délivrée par le Président du Conseil régional après avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve sauf à des fins d'entretien du site ou à des fins scientifiques autorisés par le Président du Conseil régional après avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel.

### Article 3.3 : Exploitation forestière

Toute exploitation forestière est interdite, à l'exception des opérations prévues au plan de gestion, des opérations de sécurité ou celles à caractère sanitaire.

### Article 3.4 : Protection du patrimoine géologique et paléontologique de la réserve

La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf à des fins scientifiques autorisés par le Président du Conseil régional après avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel et du Comité Consultatif.

### **Article 3.5 : Activité pastorale et agricole**

Les activités pastorales et agricoles s'exercent conformément aux conventions de gestions passées avec les exploitants.

Les activités agricoles interdites sont, systématiquement :

- le retournement de prairies,
- le drainage ou la modification du système hydraulique à des fins d'assèchement,
- la plantation de peupliers,
- l'emploi des engrais, des herbicides, des insecticides et de tous autres produits phytosanitaires, sauf avec l'accord des gestionnaires après avis du Comité Consultatif.

### **Article 3.6 : Fréquentation**

1° La circulation et le stationnement des personnes ne sont autorisés que sur les cheminements prévus à cet effet. La pénétration à l'intérieur des parcelles est interdite (sous réserve de l'application des articles 3.4, 3.5, 3.6, 3.8 et 3.9) ;

2° Le bivouac, le campement, le stationnement dans un véhicule ou remorque habitable, ou dans tout autre abri est interdit, sauf autorisation par le Président du Conseil Régional des Pays de la Loire après avis du Comité Consultatif et sous réserve de l'accord du propriétaire et gestionnaire, à des fins scientifiques ou dans le cadre d'opérations de gestion de la réserve.

### **Article 3.7 : Activité sportive, touristique et de loisirs**

Les activités sportives, touristiques ou de loisirs individuels ou collectifs, sont strictement limitées aux activités prévues au plan de gestion, en respect des dispositions de l'article 3.1 et 3.2.

### **Article 3.8 : Animaux domestiques**

Les animaux domestiques sont interdits à l'intérieur de la réserve, à l'exception :

- 1° De ceux qui participent à des missions d'entretien, de police, de recherche ou de sauvetage ;
- 2° Des chiens de berger pour les besoins pastoraux ;

### **Article 3.9 : Accès et circulation des véhicules à moteur**

L'accès et la circulation de tout véhicule à moteur sont interdits à l'intérieur de la réserve exception faite des véhicules utilisés :

- 1° pour l'entretien, la gestion, la surveillance et les études scientifiques ;
- 2° pour les activités agricoles telles que prévues à l'article 3.5 ;
- 3° lors des opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
- 4° pour les activités prévues au plan de gestion ;
- 5° dans le cadre des travaux publics ou privés selon l'article 3.10 ;

### **Article 10 : Travaux publics et privés**

Sous réserve des dispositions de l'article L.332-9, R.332-44 et R.332-45 du code de l'environnement, les travaux publics ou privés susceptible de modifier l'état et l'aspect des lieux sont interdits, à l'exception des travaux prévus au plan de gestion de la réserve ou ceux autorisés par le Président du Conseil Régional des Pays de la Loire après avis du Comité Consultatif.

### **Article 3.11 : Autres interdictions**

Il est interdit :

- 1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter tout produit de quelque nature que ce soit pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
- 2° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter, en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet, des papiers, boîtes, bouteilles, ordures, détritiques, remblais ou eaux usées de quelque nature que ce soit ;
- 3° De porter atteinte au milieu naturel en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières, mis en place après avis du Comité Consultatif ;
- 4° D'utiliser le feu, hormis dans le cadre de mesures d'entretien ou de gestion autorisées par le Président du Conseil Régional des Pays de la Loire, après avis du Comité Consultatif et du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel.

### **Article 3.12 : Publicité**

L'utilisation, à des fins publicitaires et sous quelle que forme que ce soit, de toute expression évoquant directement ou indirectement la Réserve Naturelle Régionale, à l'intérieur (conformément à l'article L. 332-14 du Code de l'environnement) ou en dehors du site, est soumise à autorisation du Président du Conseil Régional des Pays de la Loire et sous réserve de l'accord du propriétaire et gestionnaire.

### **ARTICLE 4 : Comité consultatif**

Conformément aux dispositions de l'article R. 332-41 du code de l'environnement, il est institué un comité consultatif de gestion de la réserve, co-présidé par le propriétaire et le Président du Conseil régional des Pays de la Loire ou son représentant. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du Président du Conseil régional des Pays de la Loire. Ce comité a pour rôle d'examiner tout sujet relatif au fonctionnement de la réserve, à sa gestion et aux conditions d'application des mesures de protection prévues à l'article 3.

Le Président du Conseil Régional des Pays de la Loire confie, par voie de convention, la gestion de la réserve naturelle régionale à un gestionnaire, dont le rôle est notamment :

- De mettre en œuvre et évaluer le plan de gestion de la réserve naturelle régionale prévu à l'article 6,
- De réaliser ou de faire réaliser l'ensemble des opérations nécessaires à la conservation du patrimoine naturel de la réserve naturelle régionale et au maintien des équilibres biologiques des habitats et de leurs populations animales et végétales,
- D'assurer l'accueil et l'information du public.

### **ARTICLE 5 : Contrôle des prescriptions**

Le gestionnaire est également chargé de contrôler l'application des mesures de protection prévues à l'article 3 en s'appuyant sur des agents commissionnés et assermentés au titre du 2° de l'article L.332-20 du Code de l'Environnement.

D'une manière générale, les infractions à la législation relative aux réserves naturelles et dispositions de la présente délibération peuvent être constatées par tous les agents cités à l'article L.332-20.

### **ARTICLE 6 : Plan de gestion**

La gestion de la réserve naturelle régionale se fait conformément aux objectifs et aux moyens établis dans le plan de gestion validé par la présente délibération et figurant en annexe 1- 2. Le plan de gestion constitue un document de référence, auquel se conforment toutes les opérations de gestion futures.

Les actions et travaux prévus dans ce plan de gestion, ne sont pas soumis aux demandes d'autorisations prévues à l'article 3.

### **ARTICLE 7 : Sanctions**

Les infractions aux dispositions de la présente délibération sont punies par les peines prévues aux articles L.332-22-1, L.332-25 et R.332-69 à R.332-81 du Code de l'Environnement.

### **ARTICLE 8 : Modification des limites ou de la réglementation**

Conformément au II de l'article L.332-2 et à l'article R.332-40, toute modification des limites ou de la réglementation de la réserve naturelle régionale intervient dans les mêmes formes que celles mises en œuvre par son classement. Il en est de même pour son déclassement partiel ou total.

### **ARTICLE 9 : Affichage sur la réserve naturelle régionale**

L'existence de la réserve naturelle régionale devra être signalée de façon apparente par la pose de panneaux aux entrées de la réserve, dans le respect de la charte graphique définie par la Région des Pays de la Loire.



#### **ARTICLE 10 : Publication et recours**

La décision de classement est publiée au recueil des actes administratifs du Conseil régional des Pays de la Loire.

La présente décision peut être déférée au Tribunal Administratif de Nantes

Tableau 20. Annexe 2 - exemple de relevé phytosociologique (placette n°3 - zone humide)

|                                                   | 2010    | 2011    | 2012   | 2013    | 2014    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019   | 2020    | 2021   |
|---------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|
| Date                                              | 03-juin | 18-juin | 27-mai | 02-juil | 15-juin | 04-juin | 01-juil | 13-août | 28-mai | 23-juin | 31-mai |
| Hmoy (cm)                                         | 80      | 100     | 100    | 70      | 80      | 90      | 110     | 120     | 70     | 60      | 60     |
| Recouvrement total (%)                            | 100     | 100     | 100    | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100    | 100     | 100    |
| Surface (m²)                                      | 120     | 120     | 140    | 120     | 150     | 110     | 120     | 120     | 150    | 120     | 100    |
| <b>Mégaphorbiaies</b>                             |         |         |        |         |         |         |         |         |        |         |        |
| <i>Symphytum officinale</i>                       |         |         | +      |         | 2       | 2       | +       | +       | 1      | 1       | 1      |
| <i>Valeriana officinalis</i> subsp. <i>repens</i> | +       | 1       | 2      |         | 1       | 3       | 2       | 2       | 3      | 2       | 3      |
| <i>Angelica sylvestris</i>                        |         |         |        |         |         |         |         | +       |        |         |        |
| <i>Filipendula ulmaria</i>                        | 2       | 2       | 1      | 3       | 1       | 4       | 3       | 1       | 2      | 2       | 2      |
| <i>Lythrum salicaria</i>                          | +       | +       |        |         |         |         | +       |         |        |         |        |
| <i>Thalictrum flavum</i>                          | 2       | 3       | 4      | 2       | 2       |         | 2       | +       | 2      | 1       | 2      |
| <i>Convolvulus sepium</i>                         | +       | +       | +      | +       |         | 1       | +       | 2       | 2      | 2       | 1      |
| <i>Mentha aquatica</i>                            |         |         |        |         |         |         |         |         |        | +       |        |
| <i>Phalaris arundinacea</i>                       |         |         |        |         |         |         |         |         |        |         | 1      |
| <b>Magnocariçaises</b>                            |         |         |        |         |         |         |         |         |        |         |        |
| <i>Vicia cracca</i>                               |         |         |        |         |         |         | 1       | +       | 1      | 2       |        |
| <i>Phragmites australis</i>                       |         |         |        |         | 2       | 1       | +       |         | 1      | +       | 1      |
| <i>Lathyrus pratensis</i>                         | +       | +       | +      |         | 1       | 1       | 1       |         | +      |         |        |
| <i>Carex riparia</i>                              | +       | 4       | 1      |         |         |         |         |         |        |         |        |
| <i>Iris pseudacorus</i>                           | +       | 1       | 1      | 3       |         |         | +       | +       | 1      | 2       | 2      |
| <i>Lysimachia vulgaris</i>                        | +       | 1       | 1      | 2       | 1       |         | 2       |         | +      |         |        |
| <i>Cyperus longus</i>                             | 4       | 2       |        | 3       | 2       | 2       | 2       | 4       | 4      | 2       | 1      |
| <i>Carex acutiformis</i>                          |         |         | +      |         |         |         |         |         |        |         | 3      |
| <i>Carex vesicaria</i>                            |         |         |        | 3       |         |         |         |         |        | 2       | 2      |
| <i>Carex acuta</i>                                |         |         |        |         |         | +       |         |         |        |         |        |
| <i>Plalaris rundinacea</i>                        |         |         |        |         |         |         |         |         |        | 2       |        |
| <b>Prairies hygrophiles oligotrophes</b>          |         |         |        |         |         |         |         |         |        |         |        |
| <i>Caltha palustris</i>                           | +       | +       | 1      | 2       |         |         | +       |         | 1      |         | +      |
| <i>Juncus acutiflorus</i>                         |         |         |        |         |         | 3       | 2       |         |        |         |        |
| <i>Lotus pedunculatus</i>                         | +       |         |        |         | 1       | +       | 1       |         |        | 1       |        |
| <i>Juncus effusus</i>                             |         |         |        |         |         |         |         |         | 1      |         |        |
| <b>Prairies hygrophiles</b>                       |         |         |        |         |         |         |         |         |        |         |        |
| <i>Agrostis stolonifera</i>                       | +       | 2       | 2      |         |         |         |         |         |        |         |        |
| <i>Juncus articulatus</i>                         |         |         | +      |         |         |         |         | +       |        |         |        |
| <i>Potentilla reptans</i>                         | +       |         |        | +       |         |         |         |         |        |         |        |
| <i>Rumex conglomeratus</i>                        |         | +       |        |         |         | 1       | +       |         |        | 1       | 1      |
| <i>Rumex crispus</i>                              | +       | +       | +      |         | +       |         | +       |         | +      | 1       |        |
| <i>Cardamine pratensis</i>                        | +       | +       | +      |         |         |         |         |         | +      |         |        |
| <i>Equisetum palustre</i>                         | +       | +       | +      | +       | 1       | 1       | 1       | +       | +      |         |        |
| <i>Lychnis flos-cuculi</i>                        |         |         |        |         | +       | +       | +       |         | +      |         |        |
| <i>Schedonorus arundinaceus</i>                   |         | +       |        |         | 1       | 1       | +       |         |        | 2       |        |
| <i>Bromus racemosus</i>                           |         |         | +      |         | +       |         |         |         |        |         | 1      |
| <i>Galium palustre</i>                            | +       | +       | +      | 1       | 2       | 2       | 2       | +       | 1      | 1       | 3      |
| <i>Lysimachia nummularia</i>                      |         |         | +      |         |         |         |         |         |        |         |        |
| <i>Oenanthe fistulosa</i>                         |         |         |        |         | 1       |         |         |         |        |         |        |
| <i>Carex disticha</i>                             |         | +       |        |         |         |         |         |         |        |         |        |
| <i>Ranunculus repens</i>                          |         |         |        |         |         |         |         |         |        |         | +      |
| <b>Prairies méso-hygrophiles</b>                  |         |         |        |         |         |         |         |         |        |         |        |
| <i>Holcus lanatus</i>                             | +       | +       |        | +       | 1       | 1       | 1       |         | +      |         | +      |

|                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <i>Poa trivialis</i>         |   |   |   | 3 | 2 |   | + |   |   | 1 |   |
| <i>Rumex acetosa</i>         |   |   | + |   | + |   |   |   |   |   |   |
| <i>Ranunculus acris</i>      |   |   | + | 1 | + |   | + |   | + |   |   |
| <i>Dactylis glomerata</i>    |   |   |   |   | + |   |   |   |   |   |   |
| <i>Phleum pratense</i>       | + | 1 |   |   |   | 2 | + | + |   | 1 |   |
| <i>Lotus corniculatus</i>    |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | + |
| <b>Autres</b>                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Glyceria fluitans</i>     |   |   | + |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Carex flacca</i>          |   | + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Glechoma hederacea</i>    | + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Vicia hirsuta</i>         |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Galium aparine</i>        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |
| <i>Taraxacum sp.</i>         |   | + | + |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Euphorbia sp.</i>         |   |   |   |   |   |   | + |   |   |   |   |
| <i>Urtica dioica</i>         |   |   |   |   |   |   |   |   | + | 1 |   |

Annexe 3. Liste exhaustive des espèces observées aux Caforts entre 1983 et 2021. En turquoise, les espèces déterminantes ZNIEFF.

| Nom scientifique                                   | Nom vernaculaire       | Première obs. | Dernière obs. |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| <b>Amphibiens</b>                                  |                        |               |               |
| <i>Bufo spinosus</i> (Daudin, 1803)                |                        | 2004          | 2017          |
| <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)               | Rainette verte (La)    | 2004          | 2017          |
| <i>Pelophylax Fitzinger</i> , 1843                 | Pélophylax             | 2015          | 2019          |
| <i>Pelophylax kl. esculentus</i> (Linnaeus, 1758)  |                        | 2010          | 2015          |
| <i>Pelophylax lessonae</i> (Camerano, 1882)        | Grenouille verte       | 1998          | 2015          |
| <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | Grenouille agile (La)  | 1998          | 2021          |
| <i>Rana temporaria</i> (Linnaeus, 1758 )           | Grenouille rousse      | 2004          | 2004          |
| <b>Arachnides</b>                                  |                        |               |               |
| <i>Aceria echii</i> (Canestrini, 1891)             |                        | 2015          | 2015          |
| <i>Achaearanea riparia</i> (Blackwall, 1834)       |                        | 2013-2014     | 2013-2014     |
| <i>Agalenatea redii</i> (Scopoli, 1763)            |                        | 2013-2014     | 2013-2014     |
| <i>Agroeca brunnea</i> (Blackwall, 1833)           |                        | 2013-2014     | 2013-2014     |
| <i>Agroeca cuprea</i> Menge, 1873                  |                        | 2013-2014     | 2013-2014     |
| <i>Alopecosa cuneata</i> (Clerck, 1758)            |                        | 2013-2014     | 2013-2014     |
| <i>Alopecosa pulverulenta</i> (Clerck, 1758)       |                        | 2013-2014     | 2013-2014     |
| <i>Alopecosa striatipes</i> (C.L. Koch, 1837)      |                        | 2013-2014     | 2013-2014     |
| <i>Alopecosa trabalis</i> (Clerck, 1758)           |                        | 2013-2014     | 2013-2014     |
| <i>Amaurobius ferox</i> (Walckenaer, 1830)         |                        | 2013-2014     | 2013-2014     |
| <i>Anelosimus vittatus</i> (C.L. Koch, 1836)       |                        | 2008          | 2013-2014     |
| <i>Antistea elegans</i> (Blackwall, 1841)          |                        | 2013-2014     | 2013-2014     |
| <i>Anyphaena accentuata</i> (Walckenaer, 1802)     |                        | 2013-2014     | 2013-2014     |
| <i>Araeoncus humilis</i> (Blackwall, 1841)         |                        | 2013-2014     | 2013-2014     |
| <i>Araneus quadratus</i> Clerck, 1758              | Epeire à quatre points | 2014          | 2017          |
| <i>Araniella cucurbitina</i> (Clerck, 1758)        |                        | 2008          | 2013-2014     |
| <i>Arctosa leopardus</i> (Sundevall, 1832)         |                        | 2013-2014     | 2013-2014     |
| <i>Argenna subnigra</i> (O. P.-Cambridge, 1861)    |                        | 2013-2014     | 2013-2014     |
| <i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772)          | Epeire frelon          | 2014          | 2021          |

|                                                         |                      |           |           |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| <i>Atypus affinis</i> Eichwald, 1830                    | Mygales à chaussette | 2014      | 2017      |
| <i>Atypus piceus</i> (Sulzer, 1776)                     |                      | 1998      | 2013-2014 |
| <i>Aulonia albimana</i> (Walckenaer, 1805)              |                      | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Ballus chalybeius</i> (Walckenaer, 1802)             |                      | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Bathypantes approximatus</i> (O. P.-Cambridge, 1871) |                      | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Bathypantes gracilis</i> (Blackwall, 1841)           |                      | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Centromerus serratus</i> (O. P.-Cambridge, 1875)     |                      | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Centromerus sylvaticus</i> (Blackwall, 1841)         |                      | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Ceratinella brevipes</i> (Westring, 1851)            |                      | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Ceratinella brevis</i> (Wider, 1834)                 |                      | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Cercidia prominens</i> (Westring, 1851)              |                      | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Cheiracanthium</i>                                   |                      | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Clubiona brevipes</i> Blackwall, 1841                |                      | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Clubiona comta</i> C.L. Koch, 1839                   |                      | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Clubiona phragmitis</i> C.L. Koch, 1843              |                      | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Clubiona pseudoneglecta</i> Wunderlich, 1994         |                      | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Clubiona terrestris</i> Westring, 1851               |                      | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Cnephalocotes obscurus</i> (Blackwall, 1834)         |                      | 2013-2013 | 2013-2014 |
| <i>Crustulina guttata</i> (Wider, 1834)                 |                      | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Dictyna latens</i> (Fabricius, 1775)                 |                      | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Dicymbium nigrum</i> (Blackwall, 1834)               |                      | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Diplostyla concolor</i> (Wider, 1834)                |                      | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Dipoena melanogaster</i> (C.L. Koch, 1837)           |                      | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Dolomedes fimbriatus</i> (Clerck, 1758)              |                      | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Drassodes cupreus</i> (Blackwall, 1834)              |                      | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Drassodes lapidosus</i> (Walckenaer, 1802)           |                      | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Drassodes pubescens</i> (Thorell, 1856)              |                      | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Drassyllus lutetianus</i> (L. Koch, 1866)            |                      | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Drassyllus praeficus</i> (L. Koch,                   |                      | 2013-     | 2013-2014 |



|                                                    |  |           |           |
|----------------------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 1866)                                              |  | 2014      |           |
| <i>Drassyllus pusillus</i> (C.L. Koch, 1833)       |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Drassyllus villicus</i> (Thorell, 1875)         |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Dysdera erythrina</i> (Walckenaer, 1802)        |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Enoplognatha caricis</i> (Fickert, 1876)        |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Enoplognatha latimana</i> Hippa & Oksala, 1982  |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Enoplognatha mordax</i> (Thorell, 1875)         |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Enoplognatha ovata</i> (Clerck, 1758)           |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Enoplognatha thoracica</i> (Hahn, 1833)         |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Episinus truncatus</i> Latreille, 1809          |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Erigone atra</i> Blackwall, 1833                |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Erigone dentipalpis</i> (Wider, 1834)           |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Euophrys frontalis</i> (Walckenaer, 1802)       |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Frontinellina frutetorum</i> (C.L. Koch, 1834)  |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Gibbaranea bituberculata</i> (Walckenaer, 1802) |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Gnathonarium dentatum</i> (Wider, 1834)         |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Hahnina nava</i> (Blackwall, 1841)              |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Haplodrassus dalmatensis</i> (L. Koch, 1866)    |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Haplodrassus signifer</i> (C.L. Koch, 1839)     |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Harpactea hombergi</i> (Scopoli, 1763)          |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Heliophanus cupreus</i> (Walckenaer, 1802)      |  | 2008      | 2013-2014 |
| <i>Heliophanus flavipes</i> (Hahn, 1831)           |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| Heriaeus                                           |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Hylyphantes nigrinus</i> (Simon, 1881)          |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Hypomma cornutum</i> (Blackwall, 1833)          |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Larinioides cornutus</i> (Clerck, 1758)         |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| Lepthyphantes                                      |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Liocranum rupicola</i> (Walckenaer, 1830)       |  | 2013-2014 | 2013-2014 |

|                                                         |  |           |           |
|---------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|
| <i>Mangora acalypha</i> (Walckenaer, 1802)              |  | 2008      | 2013-2014 |
| <i>Marpissa nivoyi</i> (Lucas, 1846)                    |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Maso gallicus</i> Simon, 1894                        |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Meioneta mollis</i> (O. P.-Cambridge, 1871)          |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Meioneta rurestris</i> (C.L. Koch, 1836)             |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Mermesius trilobatus</i>                             |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Meta</i> C.L. Koch, 1836                             |  | 2018      | 2018      |
| <i>Metellina mengei</i> (Blackwall, 1869)               |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Metopobactrus prominulus</i> (O. P.-Cambridge, 1872) |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Micaria albovittata</i> (Lucas, 1846)                |  | 2008      | 2013-2014 |
| <i>Micaria formicaria</i> (Sundevall, 1831)             |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Micaria pulicaria</i> (Sundevall, 1831)              |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Micrargus subaequalis</i> (Westring, 1851)           |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Micrommata ligurinum</i> (C.L. Koch, 1845)           |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Misumena vatia</i> (Clerck, 1758)                    |  | 2008      | 2013-2014 |
| <i>Misumenops tricuspidatus</i> (Fabricius, 1775)       |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Myrmarachne formicaria</i> (De Geer, 1778)           |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Neriere clathrata</i> (Sundevall, 1829)              |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Neriere furtiva</i> (O. P.-Cambridge, 1871)          |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Nigma puella</i> (Simon, 1870)                       |  | 2008      | 2008      |
| <i>Oedothorax apicatus</i> (Blackwall, 1850)            |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Oedothorax fuscus</i> (Blackwall, 1834)              |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Oedothorax gibbosus</i> (Blackwall, 1841)            |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Oedothorax retusus</i> (Westring, 1851)              |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Ozyptila atomaria</i> (Panzer, 1801)                 |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Ozyptila brevipes</i> (Hahn, 1826)                   |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Ozyptila claveata</i> (Walckenaer, 1837)             |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Ozyptila praticola</i> (C.L. Koch, 1837)             |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Ozyptila simplex</i> (O. P.-Cambridge, 1862)         |  | 2013-2014 | 2013-2014 |

|                                                        |  |           |           |
|--------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|
| <i>Pachygnatha clercki</i> Sundevall, 1823             |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Pachygnatha degeeri</i> Sundevall, 1829             |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Palliduphantes culicinus</i> (Simon, 1884)          |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Palliduphantes pallidus</i> (O. P.-Cambridge, 1871) |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Panamomops sulcifrons</i> (Wider, 1834)             |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Parapelecopsis nemoralis</i> (Blackwall, 1841)      |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Pardosa agrestis</i> (Westring, 1861)               |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Pardosa amentata</i> (Clerck, 1758)                 |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Pardosa bifasciata</i> (C.L. Koch, 1834)            |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Pardosa hortensis</i> (Thorell, 1872)               |  | 2008      | 2013-2014 |
| <i>Pardosa lugubris</i> (Walckenaer, 1802)             |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Pardosa nigriceps</i> (Thorell, 1856)               |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Pardosa paludicola</i> (Clerck, 1758)               |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Pardosa palustris</i> (Linnaeus, 1758)              |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Pardosa prativaga</i> (L. Koch, 1870)               |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Pardosa proxima</i> (C.L. Koch, 1848)               |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1758)                  |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Pardosa saltans</i> (Töpfer-Hofmann, 2000)          |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Pardosa vittata</i> (Keyserling, 1863)              |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Pelecopsis parallela</i> (Wider, 1834)              |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Pelecopsis radiculicola</i> (L. Koch, 1872)         |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Phaeocedus braccatus</i> (L. Koch, 1866)            |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Philodromus dispar</i> Walckenaer, 1826             |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Phrurolithus festivus</i> (C.L. Koch, 1835)         |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Phrurolithus nigrinus</i> (Simon, 1878)             |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Pirata hygrophilus</i> Thorell, 1872                |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Pirata latitans</i> (Blackwall, 1841)               |  | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Pirata piraticus</i> (Clerck, 1758)                 |  | 2013-2014 | 2013-2014 |

|                                                         |                |           |           |
|---------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| <i>Pisaura mirabilis</i> (Clerck, 1758)                 |                | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Pocadicnemis juncea</i> Locket & Millidge, 1953      |                | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Porrhomma microphthalmum</i> (O. P.-Cambridge, 1871) |                | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Robertus lividus</i> (Blackwall, 1836)               |                | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Saaristoa abnormis</i> (Blackwall, 1841)             |                | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Saitis barbipes</i> (Simon, 1868)                    |                | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Scotina celans</i> (Blackwall, 1841)                 |                | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Sibianor aurocinctus</i> (Ohlert, 1865)              |                | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Synema globosum</i> (Fabricius, 1775)                |                | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Talavera aequipes</i> (O. P.-Cambridge, 1871)        |                | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Tallusia experta</i> (O. P.-Cambridge, 1871)         |                | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Tapinocyba insecta</i> (L. Koch, 1869)               |                | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Tapinocyba praecox</i> (O. P.-Cambridge, 1873)       |                | 2013-2014 | 2013-2014 |
| Tegenaria                                               |                | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Tenuiphantes flavipes</i> (Blackwall, 1854)          |                | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Tenuiphantes tenuis</i> (Blackwall, 1852)            |                | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Tenuiphantes zimmermanni</i> (Bertkau, 1890)         |                | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Tetragnatha extensa</i> (Linnaeus, 1758)             |                | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Tetragnatha montana</i> Simon, 1874                  |                | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Theridion impressum</i> L. Koch, 1881                |                | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Theridion pictum</i> (Walckenaer, 1802)              |                | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Thomisus onustus</i> Walckenaer, 1805                | Thomise replet | 2016      | 2016      |
| <i>Tiso vagans</i> (Blackwall, 1834)                    |                | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Tmarus piger</i> (Walckenaer, 1802)                  |                | 2008      | 2013-2014 |
| <i>Trachyzelotes pedestris</i> (C.L. Koch, 1837)        |                | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Trichopterna cito</i> (O. P.-Cambridge, 1872)        |                | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Trochosa ruricola</i> (De Geer, 1778)                |                | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Trochosa spinipalpis</i> (F.O. P.-Cambridge, 1895)   |                | 2013-2014 | 2013-2014 |

|                                                          |                                              |           |           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|
| <i>Trochosa terricola</i> Thorell, 1856                  |                                              | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Troxochrus scabriculus</i> (Westring, 1851)           |                                              | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Uloborus walckenaerius</i> Latreille, 1806            |                                              | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Walckenaeria acuminata</i> Blackwall, 1833            |                                              | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Walckenaeria antica</i> (Wider, 1834)                 |                                              | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Walckenaeria atrotibialis</i> (O. P.-Cambridge, 1878) |                                              | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Xerolycosa miniata</i> (C.L. Koch, 1834)              |                                              | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Xerolycosa nemoralis</i> (Westring, 1861)             |                                              | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Xysticus acerbus</i> Thorell, 1872                    |                                              | 2008      | 2013-2014 |
| <i>Xysticus cristatus</i> (Clerck, 1758)                 |                                              | 2008      | 2013-2014 |
| <i>Xysticus erraticus</i> (Blackwall, 1834)              |                                              | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Xysticus kempeleni</i> nigriceps Simon, 1932          |                                              | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Xysticus kochi</i> Thorell, 1872                      |                                              | 2008      | 2013-2014 |
| <i>Xysticus ulmi</i> (Hahn, 1831)                        |                                              | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Zelotes apricorum</i> (L. Koch, 1876)                 |                                              | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Zelotes atrocaeruleus</i> (Simon, 1878)               |                                              | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Zelotes civicus</i> (Simon, 1878)                     |                                              | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Zelotes latreillei</i> (Simon, 1878)                  |                                              | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Zelotes petrensis</i> (C.L. Koch, 1839)               |                                              | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Zelotes tenuis</i> (L. Koch, 1866)                    |                                              | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Zodarion italicum</i> (Canestrini, 1868)              |                                              | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Zodarion rubidum</i> Simon, 1914                      |                                              | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Zora parallela</i> Simon, 1878                        |                                              | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <i>Zora spinimana</i> (Sundevall, 1833)                  |                                              | 2013-2014 | 2013-2014 |
| <b>Avifaune</b>                                          |                                              |           |           |
| <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)           | Rousserolle effarvatte                       | 2015      | 2019      |
| <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)              | Mésange à longue queue, Orite à longue queue | 1995      | 2015      |
| <i>Alauda arvensis</i> (Linnaeus, 1758)                  | Alouette des champs                          | 2000      | 2014      |
| <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)                    | Martin-pêcheur d'Europe                      | 2002      | 2019      |



|                                                    |                                      |           |           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| <i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758)             | Perdrix rouge                        | 1995-2000 | 1995-2000 |
| <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)           | Pipit farlouse                       | 2018      | 2018      |
| <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)                  | Martinet noir                        | 1995-2000 | 2016      |
| <i>Ardea alba</i> (Linnaeus, 1758)                 | Grande Aigrette                      | 2015      | 2015      |
| <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758                | Héron cendré                         | 1995-2000 | 2018      |
| <i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766               | Héron pourpré                        | 1995-2000 | 2014      |
| <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)               | Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna | 2011      | 2011      |
| <i>Bubulcus ibis</i> ibis (Linnaeus, 1758)         | Héron garde-bâufs                    | 2016      | 2016      |
| <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)                | Buse variable                        | 1995-2000 | 2017      |
| <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)        | Chardonneret élégant                 | 1995-2000 | 2018      |
| <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)          | Verdier d'Europe                     | 2009-2014 | 2014      |
| <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820      | Grimpereau des jardins               | 1995-2000 | 2015      |
| <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)               | Bouscarle de Cetti                   | 1995-2000 | 2020      |
| <i>Chloris chloris</i> (Linnaeus, 1758)            | Verdier d'Europe                     | 2015      | 2015      |
| <i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766) | Mouette rieuse                       | 1995-2000 | 2004      |
| <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)            | Cigogne blanche                      | 1995-2000 | 2014      |
| <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)       | Cisticole des joncs                  | 1995-2000 | 2021      |
| <i>Columba livia</i> Gmelin, 1789                  | Pigeon biset                         | 2000      | 2015      |
| <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758                | Pigeon colombin                      | 1995-2000 | 2018      |
| <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758             | Pigeon ramier                        | 1995-2000 | 2021      |
| <i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758                | Corneille noire                      | 1995-2000 | 2018      |
| <i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758)                  | Râle des genêts                      | 1995-2000 | 2008      |
| <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758              | Coucou gris                          | 1995-2000 | 2016      |
| <i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)        | Mésange bleue                        | 1995-2000 | 2018      |
| <i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758)           | Hirondelle de fenêtre                | 1995-2000 | 2015      |
| <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)          | Pic épeiche                          | 1995-2000 | 2018      |
| <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)          | Pic épeichette                       | 1995-2000 | 2017      |
| <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)          | Pic noir                             | 2015      | 2015      |
| <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)           | Aigrette garzette                    | 1995-2000 | 2017      |

|                                                  |                                             |           |           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758        | Bruant jaune                                | 2013      | 2013      |
| <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)     | Bruant des roseaux                          | 1995-2000 | 2009-2014 |
| <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)       | Rougegorge familier                         | 2004      | 2021      |
| <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758             | Faucon hobereau                             | 2013      | 2015      |
| <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758          | Faucon crécerelle                           | 1994      | 2021      |
| <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758          | Pinson des arbres                           | 1995-2000 | 2018      |
| <i>Fulica atra</i> (Linnaeus, 1758)              | Foulque macroule                            | 1995-2000 | 2014      |
| <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)      | Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau          | 1995-2000 | 2017      |
| <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)      | Geai des chênes                             | 1995-2000 | 2018      |
| <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)     | Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant    | 1995-2000 | 2015      |
| <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758            | Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée | 1995-2000 | 2015      |
| <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758            | Pie-grièche écorcheur                       | 1995      | 2020      |
| <i>Linaria cannabina</i> (Linnaeus, 1758)        | Linotte mélodieuse                          | 2015      | 2015      |
| <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)        | Locustelle tachetée                         | 1995-2000 | 2019      |
| <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)          | Alouette lulu                               | 1995-2000 | 2011      |
| <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831   | Rossignol philomèle                         | 1995-2000 | 2015      |
| <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758             | Bergeronnette grise                         | 1995-2000 | 2011      |
| <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771          | Bergeronnette des ruisseaux                 | 2015      | 2015      |
| <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)          | Gobemouche gris                             | 2013      | 2021      |
| <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)          | Loriot d'Europe                             | 1995-2000 | 2014      |
| <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758                | Mésange charbonnière                        | 2010      | 2016      |
| <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)        | Mésange domestique                          | 1995-2000 | 2014      |
| <i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)            | Perdrix grise                               | 1995-2000 | 2010      |
| <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)          | Bondrée apivore                             | 1995-2000 | 2013      |
| <i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758        | Faisan de Colchide                          | 1995-2000 | 2019      |
| <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | Rougequeue noir                             | 1995-2000 | 2014      |
| <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817)   | Pouillot véloce                             | 2003      | 2019      |
| <i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)                | Pie bavarde                                 | 2004      | 2018      |
| <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758              | Pic vert, Pivert                            | 1995-2000 | 2016      |

|                                                    |                                        |           |      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|------|
| <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)          | Bouvreuil pivoine                      | 1995-2000 | 2014 |
| <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)            | Hirondelle de rivage                   | 2018      | 2018 |
| <i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)            | Serin cini                             | 2015      | 2015 |
| <i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldszky, 1838)   | Tourterelle turque                     | 1995-2000 | 2016 |
| <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)        | Tourterelle des bois                   | 1995-2000 | 2017 |
| <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758                  | Chouette hulotte                       | 1995-2000 | 2021 |
| <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758             | Etourneau sansonnet                    | 1995-2000 | 2015 |
| <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)         | Fauvette à tête noire                  | 1995-2000 | 2015 |
| <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)               | Fauvette des jardins                   | 1995-2000 | 2003 |
| <i>Sylvia communis</i> (Latham, 1787)              | Fauvette grisette                      | 1995-2000 | 2014 |
| <i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758              | Chevalier culblanc                     | 2021      | 2021 |
| <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)    | Troglodyte mignon                      | 2010      | 2021 |
| <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758                | Merle noir                             | 1995-2000 | 2021 |
| <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831         | Grive musicienne                       | 1995-2000 | 2014 |
| <i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758               | Grive litorne                          | 2018      | 2018 |
| <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758            | Grive draine                           | 1995-2000 | 2018 |
| <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)                   | Chouette effraie, Effraie des clochers | 1995-2000 | 2016 |
| <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758                  | Huppe fasciée                          | 2013      | 2013 |
| <b>Blattoptères</b>                                |                                        |           |      |
| <i>Ectobius pallidus</i> (Olivier, 1789)           |                                        | 2013      | 2016 |
| <i>Planuncus vinzi</i> (Maurel, 2012)              |                                        | 2017      | 2017 |
| <b>Bryophytes</b>                                  |                                        |           |      |
| <i>Anomodon viticulosus</i> (Hedw.) Hook. & Taylor |                                        | 2010      | 2010 |
| <i>Barbula unguiculata</i> Hedw.                   |                                        | 2010      | 2010 |
| <i>Brachythecium rutabulum</i> (Hedw.) Schimp.     |                                        | 2010      | 2010 |
| <i>Bryum radiculosum</i> Brid.                     |                                        | 2010      | 2010 |
| <i>Calliergonella cuspidata</i> (Hedw.) Loeske     |                                        | 2010      | 2010 |
| <i>Cephaloziella cf baumgartneri</i> Niemelä       |                                        | 2010      | 2010 |
| <i>Cryphaea heteromalla</i> (Hedw.) D.Mohr         |                                        | 2010      | 2010 |
| <i>Didymodon fallax</i> (Hedw.) R.H.Zander         |                                        | 2010      | 2010 |
| <i>Didymodon luridus</i> Hornsch.                  |                                        | 2010      | 2010 |
| <i>Didymodon vinealis</i> (Brid.) R.H.Zander       |                                        | 2010      | 2010 |

|                                                                |                |      |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------|------|
| <i>Eurhynchium striatum</i> (Hedw.) Schimp.                    |                | 2010 | 2010 |
| <i>Frullania dilatata</i> (L.) Dumort.                         |                | 2010 | 2010 |
| <i>Grimmia orbicularis</i> Bruch ex Wilson                     |                | 2010 | 2010 |
| <i>Gyroweisia tenuis</i> (Hedw.) Schimp.                       |                | 2010 | 2010 |
| <i>Homalothecium lutescens</i> (Hedw.) H.Rob.                  |                | 2010 | 2010 |
| <i>Homalothecium sericeum</i> (Hedw.) Schimp.                  |                | 2010 | 2010 |
| <i>Oxyrrhynchium hians</i> (Hedw.) Loeske                      |                | 2010 | 2010 |
| <i>Pleurochaete squarrosa</i> (Brid.) Lindb.                   |                | 2010 | 2010 |
| <i>Porella platyphylla</i> (L.) Pfeiff.                        |                | 2010 | 2010 |
| <i>Pseudocrossidium purum</i>                                  |                | 2010 | 2010 |
| <i>Pseudocrossidium revolutum</i> (Brid.) R.H.Zander           |                | 2010 | 2010 |
| <i>Rhynchostegiella tenella</i> (Dicks.) Limpr.                |                | 2010 | 2010 |
| <i>Rhynchostegium confertum</i> (Dicks.) Schimp.               |                | 2010 | 2010 |
| <i>Syntrichia laevipila</i> Brid.                              |                | 2010 | 2010 |
| <i>Syntrichia montana</i> Nees. Intermediate                   |                | 2010 | 2010 |
| <i>Syntrichia papillosa</i> (Wilson) Jur.                      |                | 2010 | 2010 |
| <i>Tortula marginata</i> (Bruch & Schimp.) Spruce              |                | 2010 | 2010 |
| <i>Tortula muralis</i> Hedw.                                   |                | 2010 | 2010 |
| <i>Weissia brachycarpa</i> (Nees & Hornsch.) Jur.              |                | 2010 | 2010 |
| <i>Weissia longifolia</i> Mitt. Sheet                          |                | 2010 | 2010 |
| <b>Champignons</b>                                             |                |      |      |
| <i>Aleuria aurantia</i> (Pers. : Fr.) Fuckel, 1870             | Pézize orangée | 1994 | 1994 |
| <i>Auricularia mesenterica</i> (Dicks. : Fr.) Pers.            |                | 2010 | 2010 |
| <i>Crepidotus cesatii</i> (Rabenhorst) Saccardo                |                | 2010 | 2010 |
| <i>Crinipellis stipitaria</i> (Fr. : Fr.) Patouillard          |                | 2010 | 2010 |
| <i>Diatrype stigma</i> (Hoffmann ex Fries) Fries               |                | 2010 | 2010 |
| <i>Flammulaster ferrugineus</i> (R. Maire ex R. Maire) Watling |                | 2010 | 2010 |
| <i>Flammulina velutipes</i> (Curtis) Singer 1951 (douteux)     |                | 2010 | 2010 |
| <i>Ganoderma lipsiense</i> (Batsch) G.F. Atkinson              |                | 2010 | 2010 |
| <i>Ganoderma lipsiense</i>                                     |                | 2010 | 2010 |

|                                                                     |                                                                 |      |      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|
| (Batsch) G.F. Atkinson                                              |                                                                 |      |      |
| <i>Hemimycena mairei</i> (E.-J. Gilbert) Singer                     |                                                                 | 2010 | 2010 |
| <i>Morchella Dill. ex L.: Fr.</i>                                   | Morilles                                                        | 2015 | 2015 |
| <i>Mycena aetites</i> (Fr.) Quélet                                  |                                                                 | 2010 | 2010 |
| <i>Mycena arcangeliana</i> Bresadola                                |                                                                 | 2010 | 2010 |
| <i>Mycena flavescens</i> Velenovsky                                 |                                                                 | 2010 | 2010 |
| <i>Mycena olida</i> Bresadola                                       |                                                                 | 2010 | 2010 |
| <i>Psathyrella spadiceogrisea</i> (J.C. Sch.) R. Maire              |                                                                 | 2010 | 2010 |
| <i>Psathyrella tephrophylla</i> (Romagnesi) Moser ex Romagnesi      |                                                                 | 2010 | 2010 |
| <i>Schizophyllum commune</i> Fr. : Fr.                              |                                                                 | 2010 | 2010 |
| <i>Tremella mesenterica</i> Retz. : Fr.                             |                                                                 | 2010 | 2010 |
| <i>Tubaria furfuracea</i> (Persoon ex Fries) Gill., sensu Romagnesi |                                                                 | 2010 | 2010 |
| <b>Chiroptères</b>                                                  |                                                                 |      |      |
| <i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)                    | Barbastelle d'Europe                                            | 1987 | 2018 |
| <i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)                         | Sérotine commune                                                | 1987 | 2021 |
| <i>Myotis alcathoe</i> Helversen & Heller, 2001                     | Murin d'Alcathoe                                                | 2010 | 2011 |
| <i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)                              | Murin de Bechstein                                              | 1987 | 2021 |
| <i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)                              | Murin de Daubenton                                              | 1983 | 2021 |
| <i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)         | Murin à oreilles échancrées, Vespertilion à oreilles échancrées | 1985 | 2021 |
| <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)                             | Grand Murin                                                     | 1984 | 2021 |
| <i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)                               | Murin à moustaches, Vespertilion à moustaches                   | 1984 | 2021 |
| <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)                                | Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer                     | 1983 | 2021 |
| <i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)                               | Noctule de Leisler                                              | 2008 | 2016 |
| <i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)                            | Noctule commune                                                 | 2016 | 2016 |
| <i>Pipistrellus kuhlii</i> (Natterer in Kuhl, 1817)                 | Pipistrelle de Kuhl                                             | 2008 | 2016 |
| <i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)           | Pipistrelle de Nathusius                                        | 2016 | 2016 |
| <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)                   | Pipistrelle commune                                             | 1998 | 2016 |
| <i>Pipistrellus pygmaeus</i> (Leach, 1825)                          | Pipistrelle pygmée                                              | 1986 | 2015 |
| <i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758)                            | Oreillard roux, Oreillard septentrional                         | 1983 | 2021 |
| <i>Plecotus austriacus</i> (J. B. Fischer, 1829)                    | Oreillard gris, Oreillard méridional                            | 1983 | 2009 |
| <i>Rhinolophus euryale</i> (Blasius, 1853)                          | Rhinolophe euryale                                              | 2008 | 2010 |



|                                                            |                                                        |      |      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|
| <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)          | Grand rhinolophe                                       | 1983 | 2021 |
| <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Borkhausen, 1797)         | Petit rhinolophe                                       | 1989 | 2021 |
| <b>Coléoptères</b>                                         |                                                        |      |      |
| <i>Abax parallelepipedus</i> (Piller & Mitterpacher, 1783) |                                                        | 2013 | 2013 |
| <i>Adalia decempunctata</i> (Linnaeus, 1758)               | Coccinelle à dix points                                | 2020 | 2020 |
| <i>Adrastus rachifer</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)      |                                                        | 2020 | 2020 |
| <i>Agapanthia cardui</i> (Linnaeus, 1767)                  | Aiguille des piquants, Agapanthie du Chardon           | 2008 | 2020 |
| <i>Agapanthia villosa viridescens</i> (De Geer, 1775)      |                                                        | 2001 | 2020 |
| <i>Agrilus</i> Curtis, 1825                                |                                                        | 2020 | 2020 |
| <i>Agriotes</i> Eschscholtz, 1829                          |                                                        | 2020 | 2020 |
| <i>Agriotes pilosellus</i> (Schönherr, 1817)               |                                                        | 2020 | 2020 |
| <i>Agrypnus murinus</i> (Linnaeus, 1758)                   | Taupin rongeur                                         | 2013 | 2020 |
| <i>Ahasverus advena</i> (Waltl, 1834)                      |                                                        | 2020 | 2020 |
| <i>Alticini</i> Newman, 1834                               |                                                        | 2013 | 2018 |
| <i>Amara aenea</i> (De Geer, 1774)                         | Amare bronzée                                          | 2013 | 2013 |
| <i>Ampedus pomorum</i> (Herbst, 1784)                      |                                                        | 2020 | 2020 |
| <i>Ampedus sanguinolentus</i> (Schränk, 1776)              |                                                        | 2018 | 2020 |
| <i>Amphimallon majale</i> (Razoumowsky, 1789)              |                                                        | 2020 | 2020 |
| <i>Anaspis lurida</i> Stephens, 1832                       |                                                        | 2020 | 2020 |
| <i>Anchomenus dorsalis</i> (Pontoppidan, 1763)             |                                                        | 2013 | 2013 |
| <i>Anisosticta novemdecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)     | Coccinelle à dix-neuf points                           | 2013 | 2013 |
| <i>Anobium inexpectatum</i> Lohse, 1954                    |                                                        | 2020 | 2020 |
| <i>Anobium punctatum</i> (De Geer, 1774)                   |                                                        | 2020 | 2020 |
| <i>Anomala dubia</i> (Scopoli, 1763)                       |                                                        | 2020 | 2020 |
| <i>Anthaxia candens</i> (Panzer, 1792)                     |                                                        | 2020 | 2020 |
| <i>Anthaxia nitidula</i> (Linnaeus, 1758)                  |                                                        | 2001 | 2020 |
| <i>Anthocomus rufus</i> (Herbst, 1784)                     |                                                        | 2019 | 2019 |
| <i>Apioninae</i> Schönherr, 1823                           |                                                        | 2018 | 2018 |
| <i>Aromia moschata</i> (Linnaeus, 1758)                    | Parfumeur, Aromie musquée (L'), Capricorne musqué (Le) | 2020 | 2020 |
| <i>Asida sabulosa</i> (Fuessly, 1775)                      |                                                        | 2013 | 2013 |
| <i>Athous haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1801)            |                                                        | 2020 | 2020 |

|                                                    |                                              |      |      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|
| <i>Aulacobaris coerulescens</i> (Scopoli, 1763)    |                                              | 2018 | 2018 |
| <i>Badister bullatus</i> (Schränk, 1798)           |                                              | 2013 | 2013 |
| <i>Badister lacertosus</i> Sturm, 1815             |                                              | 2013 | 2016 |
| <i>Berginus tamarisci</i> Wollaston, 1854          |                                              | 2020 | 2020 |
| <i>Bodilopsis rufa</i> (Moll, 1782)                |                                              | 2020 | 2020 |
| <i>Bruchinae</i> Latreille, 1802                   |                                              | 2018 | 2018 |
| <i>Byturus ochraceus</i> (Scriba, 1790)            |                                              | 2020 | 2020 |
| <i>Calamobius filum</i> (Rossi, 1790)              |                                              | 2017 | 2020 |
| <i>Calvia quatuordecimguttata</i> (Linnaeus, 1758) |                                              | 2020 | 2020 |
| <i>Cantharis fusca</i> Linnaeus, 1758              |                                              | 2013 | 2021 |
| <i>Cantharis pallida</i> Goeze, 1777               |                                              | 2018 | 2018 |
| <i>Cantharis rufa</i> Linnaeus, 1758               | Cantharide rouge                             | 2018 | 2018 |
| <i>Cantharis rustica</i> Fallén, 1807              | Téléphone de campagne, Cantharide rustique   | 2015 | 2020 |
| <i>Carabus auratus</i> Linnaeus, 1760              | Carabe doré, Sergent, Vinaigrier, Jardinière | 2013 | 2013 |
| <i>Carabus coriaceus</i> Linnaeus, 1758            | Carabe chagriné                              | 2001 | 2017 |
| <i>Carabus granulatus</i> (Linnaeus, 1758)         | Carabe granuleux                             | 2013 | 2013 |
| <i>Carabus monilis</i> Fabricius, 1792             |                                              | 2013 | 2013 |
| <i>Carabus nemoralis</i> (O.F. Müller, 1764)       | Carabe des bois                              | 2013 | 2013 |
| <i>Cardiophorus gramineus</i> (Scopoli, 1763)      |                                              | 2015 | 2020 |
| <i>Cardiophorus nigerrimus</i> Erichson, 1840      |                                              | 2020 | 2020 |
| <i>Cardiophorus rufipes</i> (Goeze, 1777)          |                                              | 2020 | 2020 |
| <i>Cassida vibex</i> Linnaeus, 1767                |                                              | 2018 | 2018 |
| <i>Cerambyx scopolii</i> Fuessly, 1775             | Petit Capricorne (Le)                        | 2019 | 2020 |
| <i>Cetonia aurata</i> (Linnaeus, 1758)             | Cétoine dorée (la), Hanneton des roses       | 1999 | 2021 |
| <i>Ceutorhynchus obstrictus</i> (Marsham, 1802)    |                                              | 2001 | 2001 |
| <i>Chilocorus renipustulatus</i> (Scriba, 1791)    |                                              | 2020 | 2020 |
| <i>Chlaenius nigricornis</i> (Fabricius, 1787)     |                                              | 2013 | 2013 |
| <i>Choleva angustata</i> (Fabricius, 1781)         |                                              | 2020 | 2020 |
| <i>Choleva glauca</i> Britten, 1918                |                                              | 2020 | 2020 |
| <i>Chrysobothris affinis</i> (Fabricius, 1794)     | Richard bosselé, Chrysobothre ressemblant    | 2018 | 2020 |
| <i>Chrysolina bankii</i> (Fabricius, 1775)         |                                              | 2017 | 2017 |

|                                                         |                                                    |           |      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------|
| <i>Cis Latreille</i> , 1796                             |                                                    | 2020      | 2020 |
| <i>Clerus mutillarius</i> Fabricius, 1775               |                                                    | 2020      | 2020 |
| <i>Clivina fossor</i> (Linnaeus, 1758)                  |                                                    | 2017      | 2013 |
| <i>Clytra laeviuscula</i> Ratzeburg, 1837               |                                                    | 2013-2014 | 2021 |
| <i>Coccidula rufa</i> (Herbst, 1783)                    |                                                    | 2017      | 2018 |
| <i>Coccinella septempunctata</i> Linnaeus, 1758         | Coccinelle à 7 points, Coccinelle, Bête à bon Dieu | 2001      | 2021 |
| <i>Coccinula quatuordecimpustulata</i> (Linnaeus, 1758) |                                                    | 2018      | 2020 |
| <i>Cryptarcha strigata</i> (Fabricius, 1787)            |                                                    | 2020      | 2020 |
| <i>Cryptarcha undata</i> (Olivier, 1790)                |                                                    | 2020      | 2020 |
| <i>Cryptocephalus flavipes</i> Fabricius, 1781          |                                                    | 2018      | 2018 |
| <i>Cryptocephalus pygmaeus</i> Fabricius, 1792          |                                                    | 2020      | 2020 |
| <i>Cryptolestes</i> Ganglbauer, 1899                    |                                                    | 2020      | 2020 |
| <i>Cryptophagus</i> Herbst, 1792                        |                                                    | 2020      | 2020 |
| <i>Cteniopus sulphureus</i> (Linnaeus, 1758)            |                                                    | 2013      | 2020 |
| <i>Cyphon</i> Paykull, 1799                             |                                                    | 2020      | 2020 |
| <i>Dasytes aeratus</i> Stephens, 1830                   |                                                    | 2020      | 2020 |
| <i>Dasytes plumbeus</i> (O.F. Müller, 1776)             |                                                    | 2020      | 2020 |
| <i>Denticollis linearis</i> (Linnaeus, 1758)            |                                                    | 2020      | 2020 |
| <i>Diachromus germanus</i> (Linnaeus, 1758)             | Diachrome allemand                                 | 2018      | 2021 |
| <i>Dicronychus cinereus</i> (Herbst, 1784)              |                                                    | 2020      | 2020 |
| <i>Dorcatoma robusta</i> A. Strand, 1938                |                                                    | 2020      | 2020 |
| <i>Dorcatoma substriata</i> Hummel, 1829                |                                                    | 2020      | 2020 |
| <i>Dorcus parallelipipedus</i> (Linnaeus, 1758)         | Petite biche, Petite lucane                        | 2020      | 2020 |
| <i>Drilus flavescens</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)   | Drille joyeux, Panache jaune                       | 2013      | 2020 |
| <i>Drypta dentata</i> (Rossi, 1790)                     |                                                    | 2013      | 2013 |
| <i>Elater ferrugineus</i> Linnaeus, 1758                |                                                    | 2020      | 2020 |
| <i>Epuraea ocularis</i> Fairmaire, 1849                 |                                                    | 2020      | 2020 |
| <i>Epuraea unicolor</i> (Olivier, 1790)                 |                                                    | 2020      | 2020 |
| <i>Esymus pusillus</i> (Herbst, 1789)                   |                                                    | 2020      | 2020 |
| <i>Euchemis capucina</i> Ahrens, 1812                   |                                                    | 2020      | 2020 |
| <i>Eulagius filicornis</i> (Reitter,                    |                                                    | 2020      | 2020 |

|                                                               |                                                     |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1887)                                                         |                                                     |                      |                      |
| <i>Exocentrus punctipennis</i><br>Mulsant & Guillebeau, 1856  |                                                     | 2020                 | 2020                 |
| <i>Exochomus quadripustulatus</i><br>(Linnaeus, 1758)         |                                                     | 2017                 | 2020                 |
| <i>Galeruca pomonae</i> (Scopoli,<br>1763)                    |                                                     | 2018                 | 2018                 |
| <i>Geotrupes spiniger</i> <b>Marsham,<br/>1802</b>            |                                                     | 2020                 | 2020                 |
| <i>Grammoptera ruficornis</i><br>(Fabricius, 1781)            |                                                     | 2013                 | 2020                 |
| <i>Hadrobregmus denticollis</i><br>(Creutzer in Panzer, 1796) |                                                     | 2020                 | 2020                 |
| <i>Halyzia sedecimguttata</i><br>(Linnaeus, 1758)             |                                                     | 2020                 | 2020                 |
| <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas,<br>1773)                    | Coccinelle asiatique (la), Coccinelle arlequin (La) | 2013                 | 2020                 |
| <i>Harpalus</i> Latreille, 1802                               |                                                     | 2018                 | 2018                 |
| <i>Helophorus</i> Fabricius, <b>1775</b>                      |                                                     | 2020                 | 2020                 |
| <i>Hemicrepidius hirtus</i> (Herbst,<br>1784)                 |                                                     | 2020                 | 2020                 |
| <i>Henosepilachna argus</i><br>(Geoffroy in Fourcroy, 1785)   | Coccinelle de la Bryone                             | 2001                 | 2020                 |
| <i>Hispa atra</i> Linnaeus, 1767                              |                                                     | 2017                 | 2020                 |
| <i>Hister</i> Linnaeus, 1758                                  | Escarbots                                           | 2013                 | 2013                 |
| <i>Hoplia philanthus</i> (Fuessly,<br>1775)                   |                                                     | 2013                 | 2013                 |
| <i>Hydrobius fuscipes</i> ( <b>Linnæus,<br/>1758</b> )        |                                                     | 2020                 | 2020                 |
| <i>Hyperaspis concolor</i> Suffrian,<br>1843                  |                                                     | 2018                 | 2018                 |
| <i>Hypocassida subferruginea</i><br>(Schränk, 1776)           |                                                     | 2018                 | 2018                 |
| <i>Isomira</i> Mulsant, 1856                                  |                                                     | 2013,00 <sup>2</sup> | 2020,00 <sup>2</sup> |
| <i>Laemostenus terricola</i> (Herbst,<br>1784)                |                                                     | 2015                 | 2016                 |
| <i>Lampyrus noctiluca</i> (Linnaeus,<br>1758)                 | Ver luisant, Lampyre                                | 2018                 | 2018                 |
| <i>Lasioderma serricorne</i><br><b>(Fabricius, 1792)</b>      |                                                     | 2020                 | 2020                 |
| <i>Leiopus femoratus</i> Fairmaire,<br>1859                   |                                                     | 2020                 | 2020                 |
| <i>Leiopus nebulosus</i> (Linnæus,<br>1758)                   |                                                     | 2020                 | 2020                 |
| <i>Lepidocyrtus</i> Bourlet, 1839                             |                                                     | 2013                 | 2013                 |
| <i>Leptura aurulenta</i> Fabricius,<br>1792                   |                                                     | 2020                 | 2020                 |
| <i>Limarus zenkeri</i> ( <b>Germer,<br/>1813</b> )            |                                                     | 2020                 | 2020                 |
| <i>Liocola marmorata</i> (Fabricius,<br>1792)                 |                                                     | 2020                 | 2020                 |
| <i>Litargus connexus</i> (Geoffroy in<br>Fourcroy, 1785)      |                                                     | 2020                 | 2020                 |

|                                                        |                                                                 |      |      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|
| <i>Litargus</i> Erichson, 1845                         |                                                                 | 2020 | 2020 |
| <i>Lixus iridis</i> Olivier, 1807                      | Charançon poudré, Lixe des ombellifères                         | 2018 | 2018 |
| <i>Lixus ochraceus</i> Boheman, 1842                   |                                                                 | 2021 | 2021 |
| <i>Loricera pilicornis</i> (Fabricius, 1775)           | Loricère à antennes poilues, Loricera                           | 2013 | 2013 |
| <i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)                 | Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane, Lucane cerf-volant | 2016 | 2020 |
| <i>Luperus</i> Geoffroy, 1762                          |                                                                 | 2018 | 2018 |
| <i>Lygistopterus sanguineus</i> (Linnaeus, 1758)       |                                                                 | 2020 | 2020 |
| <i>Malthinus seriepunctatus</i> Kiesenwetter, 1852     |                                                                 | 2018 | 2020 |
| <i>Malthodes</i> Kiesenwetter, 1852                    |                                                                 | 2018 | 2020 |
| <i>Mecaspis alternans</i> (Herbst, 1795)               |                                                                 | 2013 | 2018 |
| <i>Mecinus pascuorum</i> (Gyllenhal, 1813)             |                                                                 | 2001 | 2001 |
| <i>Melanotus punctolineatus</i> (Pélerin, 1829)        |                                                                 | 2020 | 2020 |
| <i>Melanotus villosus</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785) |                                                                 | 2020 | 2020 |
| <i>Meligethes</i> Stephens, 1830                       |                                                                 | 2020 | 2020 |
| <i>Melinopterus prodromus</i> (Brahm, 1790)            |                                                                 | 2020 | 2020 |
| <i>Meloe</i> Linnaeus, 1758                            |                                                                 | 2013 | 2013 |
| <i>Metallina</i> Motschulsky, 1850                     |                                                                 | 2013 | 2013 |
| <i>Mononychus punctumalbum</i> (Herbst, 1784)          | Charançon des iris, Charançon de l'Iris des marais              | 2021 | 2021 |
| <i>Mordellidae</i> Latreille, 1802                     |                                                                 | 2018 | 2018 |
| <i>Mycetophagus quadripustulatus</i> (Linnaeus, 1760)  |                                                                 | 2018 | 2020 |
| <i>Nalassus laevioctostriatus</i> (Goeze, 1777)        |                                                                 | 2020 | 2020 |
| <i>Nathrius brevipennis</i> (Mulsant, 1839)            |                                                                 | 2020 | 2020 |
| <i>Nebria brevicollis</i> (Fabricius, 1792)            | Nébrie à cou bref                                               | 2013 | 2013 |
| <i>Nemozoma caucasicum</i> Ménétriés, 1832             |                                                                 | 2020 | 2020 |
| <i>Nephus quadrimaculatus</i> (Herbst, 1783)           |                                                                 | 2016 | 2020 |
| <i>Netocia morio</i> (Fabricius, 1781)                 | Cétoine noire                                                   | 1994 | 2020 |
| <i>Nicrophorus humator</i> (Gleditsch, 1767)           |                                                                 | 2020 | 2020 |
| <i>Nicrophorus interruptus</i> Stephens, 1830          |                                                                 | 2020 | 2020 |
| <i>Nothodes parvulus</i> (Panzer, 1799)                |                                                                 | 2020 | 2020 |
| <i>Notiophilus rufipes</i> Curtis, 1829                |                                                                 | 2013 | 2013 |
| <i>Notoxus</i> Geoffroy, 1762                          |                                                                 | 2018 | 2018 |



|                                                      |                                                          |      |      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|
| <i>Notoxus monoceros</i> (Linnæus, 1760)             |                                                          | 2020 | 2020 |
| <i>Ocypus olens</i> (O.F. Müller, 1764)              | Staphylin odorant                                        | 2013 | 2021 |
| <i>Oedemera lurida</i> (Marsham, 1802)               |                                                          | 2018 | 2020 |
| <i>Oedemera nobilis</i> (Scopoli, 1763)              | Cycliste maillot-vert, Cycliste émeraude, Oedemère noble | 2001 | 2020 |
| <i>Oedemera podagrariae</i> (Linnaeus, 1767)         | Cycliste maillot-jaune, Oedemère ochracée                | 2017 | 2020 |
| <i>Omaloplia ruricola</i> (Fabricius, 1775)          | Petit hanneton de 11h45, Scarabée à bordure              | 2018 | 2018 |
| <i>Onthophagus coenobita</i> (Herbst, 1783)          |                                                          | 2020 | 2020 |
| <i>Onthophagus medius</i> (Kugelann, 1792)           |                                                          | 2020 | 2020 |
| <i>Onthophagus ovatus/joannae</i>                    |                                                          | 2020 | 2020 |
| <i>Oodes helopioides</i> (Fabricius, 1792)           |                                                          | 2013 | 2013 |
| <i>Opilo mollis</i> (Linnaeus, 1758)                 | Clairon porte-croix                                      | 2018 | 2020 |
| <i>Opsilia coerulescens</i> (Scopoli, 1763)          | Aiguille de la vipérine, Phytoécie bleuâtre              | 2013 | 2013 |
| <i>Orchesella cincta</i> (Linnaeus, 1758)            |                                                          | 2013 | 2013 |
| <i>Orchesella villosa</i> (Geoffroy, 1762)           |                                                          | 2013 | 2013 |
| <i>Otiorhynchus tenebriosus</i> (Herbst, 1784)       |                                                          | 2020 | 2020 |
| <i>Oulema</i> Des Gozis, 1886                        |                                                          | 2018 | 2018 |
| <i>Oxythyrea funesta</i> (Poda, 1761)                | drap mortuaire (le)                                      | 2001 | 2021 |
| <i>Paracorymbia fulva</i> (De Geer, 1775)            | Lepture fauve                                            | 2001 | 2013 |
| <i>Peritelus sphaeroides</i> Germar, 1823            | Péritèle gris                                            | 2001 | 2001 |
| <i>Phosphuga atrata</i> (Linnaeus, 1758)             |                                                          | 2016 | 2017 |
| <i>Phyllobrotica quadrimaculata</i> (Linnaeus, 1758) |                                                          | 2018 | 2018 |
| <i>Phyllotreta nemorum</i> (Linnaeus, 1758)          |                                                          | 2001 | 2001 |
| <i>Phymatodes testaceus</i> (Linnaeus, 1758)         |                                                          | 2013 | 2020 |
| <i>Phytoecia cylindrica</i> (Linnaeus, 1758)         |                                                          | 2017 | 2020 |
| <i>Placonotus testaceus</i> (Fabricius, 1787)        |                                                          | 2020 | 2020 |
| <i>Platydracus</i> Thomson, 1858                     |                                                          | 2013 | 2013 |
| <i>Platynaspis luteorubra</i> (Goeze, 1777)          |                                                          | 2015 | 2018 |
| <i>Platystomos albinus</i> (Linnaeus, 1758)          |                                                          | 2018 | 2020 |
| <i>Pleurophorus caesus</i> (Creutzer, 1796)          |                                                          | 2020 | 2020 |
| <i>Podagrica fuscicornis</i>                         |                                                          | 2020 | 2020 |

|                                                                     |                                                                   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|
| <b>(Linnaeus, 1767)</b>                                             |                                                                   |      |      |
| <i>Poecilus cupreus</i> (Linnaeus, 1758)                            |                                                                   | 2013 | 2018 |
| <i>Poecilus versicolor</i> (Sturm, 1824)                            |                                                                   | 2013 | 2016 |
| <i>Potosia cuprea</i> (Fabricius, 1775)                             |                                                                   | 2020 | 2020 |
| <i>Procrastus tibialis</i> (Lacordaire in Boissieu & Lacord., 1835) |                                                                   | 2020 | 2020 |
| <i>Procrustes coriaceus</i> (Rugifer Kr., 1877)                     | Procuste chagriné                                                 | 2001 | 2014 |
| <i>Propylea quatuordecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)               | Coccinelle à damier, Coccinelle à 14 points, Coccinelle à sourire | 2001 | 2019 |
| <i>Pseudovadonia livida</i> (Fabricius, 1777)                       |                                                                   | 2020 | 2020 |
| <i>Psylliodes Latreille</i> , 1829                                  |                                                                   | 2018 | 2018 |
| <i>Psyllobora vigintiduopunctata</i> (Linnaeus, 1758)               | Coccinelle à 22 points                                            | 2001 | 2020 |
| <i>Pterostichus madidus</i> (Fabricius, 1775)                       |                                                                   | 2013 | 2013 |
| <i>Pterostichus nigrita</i> (Paykull, 1790)                         |                                                                   | 2013 | 2013 |
| <i>Ptosima undecimmaculata</i> (Herbst, 1784)                       |                                                                   | 2001 | 2020 |
| <i>Pyrochroa coccinea</i> (Linnaeus, 1760)                          | Cardinal, Pyrochore écarlate                                      | 2001 | 2020 |
| <i>Pyrochroa serraticornis</i> (Scopoli, 1763)                      | Mazarin des écorces, Cardinal à tête rouge                        | 2013 | 2021 |
| <i>Pyrrhidium sanguineum</i> (Linnaeus, 1758)                       |                                                                   | 2018 | 2020 |
| <i>Rhagonycha fulva</i> (Scopoli, 1763)                             | Téléphore fauve                                                   | 2018 | 2020 |
| <i>Rhagonycha testacea</i> (Linnaeus, 1758)                         | Cantharide fauve avec la pointe des étuis noire                   | 2018 | 2018 |
| <i>Rhinocyllus conicus</i> (Frölich, 1792)                          | Charançon du Chardon penché                                       | 2001 | 2001 |
| <i>Rhizotrogus aestivus</i> (Olivier, 1789)                         |                                                                   | 2013 | 2020 |
| <i>Rhizotrogus marginipes</i> Mulsant, 1842                         |                                                                   | 2018 | 2018 |
| <i>Rhynchites auratus</i> (Scopoli, 1763)                           | Charançon à écailles vertes                                       | 2001 | 2001 |
| <i>Rhynchites bacchus</i> (Linnaeus, 1758)                          |                                                                   | 2001 | 2017 |
| <i>Rutpela maculata</i> (Poda, 1761)                                | Lepture tachetée, Lepture cycliste                                | 2001 | 2020 |
| <i>Salpingus planirostris</i> (Fabricius, 1787)                     |                                                                   | 2020 | 2020 |
| <i>Saperda punctata</i> (Linnaeus, 1767)                            |                                                                   | 2020 | 2020 |
| <i>Scaphidium quadrimaculatum</i> Olivier, 1790                     |                                                                   | 2018 | 2020 |
| <i>Scaphisoma balcanicum</i> Tamanini, 1954                         |                                                                   | 2020 | 2020 |
| <i>Scobicia chevrieri</i> (A. Villa &                               |                                                                   | 2020 | 2020 |

|                                                              |                                                                   |      |      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|
| G.B. Villa, 1835)                                            |                                                                   |      |      |
| <i>Scryptia testacea</i> Allen, 1940                         |                                                                   | 2020 | 2020 |
| <i>Scymnus haemorrhoidalis</i> Herbst, 1797                  |                                                                   | 2018 | 2018 |
| <i>Scymnus interruptus</i> (Goeze, 1777)                     | Coccinelle velue à bandes                                         | 2016 | 2016 |
| <i>Scymnus rubromaculatus</i> (Goeze, 1777)                  |                                                                   | 2018 | 2018 |
| <i>Selatosomus latus</i> (Fabricius, 1801)                   |                                                                   | 2020 | 2020 |
| <i>Serica brunnea</i> (Linnaeus, 1758)                       |                                                                   | 2013 | 2020 |
| <i>Silpha obscura</i> Linnaeus, 1758                         |                                                                   | 2013 | 2013 |
| <i>Silpha tristis</i> Illiger, 1798                          | Silphe triste                                                     | 2013 | 2018 |
| <i>Silvanus unidentatus</i> (Olivier, 1790)                  |                                                                   | 2020 | 2020 |
| <i>Soronia grisea</i> (Linnæus, 1758)                        |                                                                   | 2020 | 2020 |
| <i>Staphylinus dimidiaticornis</i> Gemminger, 1851           |                                                                   | 2013 | 2013 |
| <i>Stenolophus teutonus</i> (Schränk, 1781)                  |                                                                   | 2018 | 2018 |
| <i>Stenomax aeneus</i> (Scopoli, 1763)                       |                                                                   | 2020 | 2020 |
| <i>Stenopterus rufus</i> (Linnaeus, 1767)                    | Calleux Cycliste, Sténoptère roux                                 | 2013 | 2021 |
| <i>Stenurella bifasciata</i> (Müller, 1776)                  |                                                                   | 2017 | 2019 |
| <i>Stenurella nigra</i> (Linnaeus, 1758)                     |                                                                   | 2020 | 2020 |
| <i>Stethorus pusillus</i> (Herbst, 1797)                     |                                                                   | 2016 | 2020 |
| <i>Stictoleptura cordigera</i> (Fuessly, 1775)               | Lepture de cœur                                                   | 2001 | 2021 |
| <i>Stictoleptura fulva</i> (De Geer, 1775)                   | Lepture sauvage, Lepture fauve                                    | 2001 | 2019 |
| <i>Stictoleptura rubra</i> (Linnaeus, 1758)                  | Lepture cardinale (femelle), Lepture papale (mâle), Lepture rouge | 2001 | 2020 |
| <i>Subcoccinella vigintiquatuorpunctata</i> (Linnaeus, 1758) |                                                                   | 2016 | 2017 |
| <i>Synaptus filiformis</i> (Fabricius, 1781)                 |                                                                   | 2020 | 2020 |
| <i>Tetrops praeustus</i> (Linnaeus, 1758)                    |                                                                   | 2020 | 2020 |
| <i>Thanasimus formicarius</i> (Linnaeus, 1758)               | Clairon des fourmis                                               | 2018 | 2020 |
| <i>Timarcha goettingensis</i> (Linnaeus, 1758)               |                                                                   | 2013 | 2013 |
| <i>Trachys minutus</i> (Linnaeus, 1758)                      |                                                                   | 2020 | 2020 |
| <i>Trichius</i> Fabricius, 1775                              |                                                                   | 2019 | 2019 |
| <i>Trichius gallicus</i> Dejean, 1821                        |                                                                   | 2020 | 2020 |
| <i>Trichodes alvearius</i> (Fabricius, 1792)                 | Caliron des abeilles solitaires, Clairon des ruches               | 2001 | 2021 |

|                                                           |                                                       |      |      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|
| <i>Trichodes apiarius</i> (Linnaeus, 1758)                | Caliron des abeilles solitaires, Clairon des abeilles | 2001 | 2021 |
| <i>Triplax russica</i> (Linnaeus, 1758)                   |                                                       | 2020 | 2020 |
| <i>Tytthaspis sedecimpunctata</i> (Linnaeus, 1760)        |                                                       | 2013 | 2020 |
| <i>Valgus hemipterus</i> (Linnaeus, 1758)                 | Cétoine punaise, Mini cétoine                         | 2001 | 2020 |
| <i>Vibidia duodecimguttata</i> (Poda, 1761)               |                                                       | 2016 | 2020 |
| <i>Xanthogaleruca luteola</i> (Müller, 1766)              | Galéruque de l'orme (La)                              | 2016 | 2020 |
| <i>Xestobium Motschulsky</i> , 1845                       |                                                       | 2020 | 2020 |
| <i>Xyleborinus saxesenii</i> (Ratzeburg, 1837)            |                                                       | 2020 | 2020 |
| <i>Xylodrepa quadripunctata</i> ( <b>Schreber, 1759</b> ) |                                                       | 2020 | 2020 |
| <i>Xylotrechus arvicola</i> (Olivier, 1800)               |                                                       | 2018 | 2020 |
| <b>Dermaptères</b>                                        |                                                       |      |      |
| <i>Forficula auricularia</i> Linnaeus, 1758               | Forficule, Pince-oreille, Perce-oreille               | 2016 | 2020 |
| <b>Diptères</b>                                           |                                                       |      |      |
| <i>Baccha elongata</i> (Fabricius, 1775)                  |                                                       | 2018 | 2019 |
| <i>Brachyopa pilosa</i>                                   |                                                       | 2018 | 2018 |
| <i>Callicera aurata</i> (Rossi, 1790)                     |                                                       | 2018 | 2018 |
| <i>Chalcosyrphus nemorum</i>                              |                                                       | 2018 | 2019 |
| <i>Cheilosia aerea</i> Dufour, 1848                       |                                                       | 2018 | 2019 |
| <i>Cheilosia albitarsis</i> (Meigen, 1822)                |                                                       | 2018 | 2019 |
| <i>Cheilosia barbata</i> Loew, 1857                       |                                                       | 2018 | 2019 |
| <i>Cheilosia illustrata</i> (Harris, 1780)                |                                                       | 2018 | 2019 |
| <i>Cheilosia impressa</i> (Loew, 1840)                    |                                                       | 2018 | 2018 |
| <i>Cheilosia latifrons</i> (Zetterstedt, 1843)            |                                                       | 2018 | 2018 |
| <i>Cheilosia pagana</i> (Meigen, 1822)                    |                                                       | 2018 | 2019 |
| <i>Cheilosia proxima</i> (Zetterstedt, 1843)              |                                                       | 2018 | 2019 |
| <i>Cheilosia ranunculi</i> (Doczkal, 2000)                |                                                       | 2019 | 2019 |
| <i>Cheilosia scutellata</i> (Fallén, 1817)                |                                                       | 2018 | 2018 |
| <i>Cheilosia soror</i> (Zetterstedt, 1843)                |                                                       | 1999 | 2019 |
| <i>Cheilosia variabilis</i> (Panzer, 1798)                |                                                       | 2019 | 2019 |
| <i>Cheilosia vernalis</i> (Fallén, 1817)                  |                                                       | 2019 | 2019 |
| <i>Cheilosia vulpina</i> (Meigen, 1822)                   |                                                       | 2018 | 2018 |
| <i>Chrysotoxum bicinctum</i>                              |                                                       | 2018 | 2018 |

|                                                   |                                   |      |      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|
| (Linnaeus, 1758)                                  |                                   |      |      |
| <i>Chrysotoxum cautum</i> (Harris, 1778)          |                                   | 2018 | 2019 |
| <i>Chrysotoxum festivum</i> (Linnaeus, 1758)      |                                   | 1999 | 2019 |
| <i>Chrysotoxum intermedium</i> Meigen, 1822       |                                   | 2018 | 2019 |
| <i>Chrysotoxum vernale</i> Loew, 1841             |                                   | 2018 | 2019 |
| <i>Chrysotoxum verralli</i> (Collin, 1940)        |                                   | 2018 | 2019 |
| <i>Dasypogon diadema</i> (Fabricius, 1781)        |                                   | 2020 | 2020 |
| <i>Dasysyrphus albostratus</i> (Fallén, 1817)     |                                   | 2019 | 2019 |
| <i>Epistrophe diaphana</i> (Zetterstedt, 1843)    |                                   | 2018 | 2019 |
| <i>Epistrophe eligans</i> (Harris, 1780)          |                                   | 2018 | 2019 |
| <i>Epistrophe melanostoma</i> (Zatterstedt, 1843) |                                   | 2018 | 2019 |
| <i>Epistrophe nitidicollis</i> (Meigen, 1822)     |                                   | 2018 | 2019 |
| <i>Episyrphus balteatus</i> (De Geer, 1776)       |                                   | 1999 | 2019 |
| <i>Eristalinus sepulchralis</i> (Linnaeus, 1758)  |                                   | 1999 | 2018 |
| <i>Eristalis arbustorum</i> (Linnaeus, 1758)      |                                   | 1999 | 2019 |
| <i>Eristalis intricaria</i> (Linnaeus, 1758)      |                                   | 2018 | 2018 |
| <i>Eristalis nemorum</i> (Linnaeus, 1758)         |                                   | 2018 | 2018 |
| <i>Eristalis pertinax</i> (Scopoli, 1763)         |                                   | 2018 | 2019 |
| <i>Eristalis similis</i> (Fallén, 1817)           |                                   | 2018 | 2018 |
| <i>Eristalis tenax</i> (Linnaeus, 1758)           | Eristale gluante, Mouche pourceau | 1999 | 2019 |
| <i>Eumerus amoenus</i> Loew, 1848                 |                                   | 2018 | 2019 |
| <i>Eumerus consimilis</i> Å imic & Vujic, 1996    |                                   | 2018 | 2019 |
| <i>Eumerus ornatus</i> (Meigen, 1822)             |                                   | 2019 | 2019 |
| <i>Eumerus sogdianus</i> (Stackelberg, 1952)      |                                   | 2018 | 2019 |
| <i>Eupeodes corollae</i> (Fabricius, 1794)        |                                   | 2018 | 2019 |
| <i>Eupeodes latifasciatus</i> (Macquart, 1829)    |                                   | 2018 | 2019 |
| <i>Eupeodes luniger</i> (Meigen, 1822)            |                                   | 2018 | 2019 |
| <i>Ferdinandea cuprea</i> (Scopoli, 1763)         |                                   | 2019 | 2019 |
| <i>Helophilus pendulus</i> (Linnaeus, 1758)       |                                   | 1999 | 2019 |



|                                                        |                                            |      |      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|
| <i>Helophilus trivittatus</i><br>(Fabricius, 1805)     |                                            | 2015 | 2019 |
| <i>Heringia heringi</i> (Zetterstedt, 1843)            |                                            | 2019 | 2019 |
| <i>Lapposyrphus lapponicus</i><br>(Zetterstedt, 1838)  |                                            | 2019 | 2019 |
| <i>Lomatia</i> (Meigen, 1822)                          |                                            | 2020 | 2020 |
| <i>Melanogaster nuda</i> (Macquart, 1829)              |                                            | 2018 | 2018 |
| <i>Melanostoma mellinum</i><br>(Linnaeus, 1758)        |                                            | 2018 | 2019 |
| <i>Melanostoma scalare</i><br>(Fabricius, 1794)        |                                            | 2018 | 2019 |
| <i>Meligramma triangulifera</i><br>(Zetterstedt, 1843) |                                            | 2019 | 2019 |
| <i>Meliscaeva auricollis</i> (Meigen, 1822)            |                                            | 2018 | 2019 |
| <i>Merodon avidus</i> (Rossi, 1790)                    |                                            | 1999 | 1999 |
| <i>Merodon equestris</i> (Fabricius, 1794)             | Mouche des narcisses, Syrphé des narcisses | 2018 | 2019 |
| <i>Merodon moenium</i><br>(Wiedemann in Meigen, 1822)  |                                            | 2019 | 2019 |
| <i>Milesia crabroniformis</i><br>(Fabricius, 1775)     | Milésie faux-frelon                        | 2015 | 2021 |
| <i>Myathropa florea</i> (Linnaeus, 1758)               |                                            | 2015 | 2019 |
| <i>Neoascia interrupta</i> (Meigen, 1822)              |                                            | 2019 | 2019 |
| <i>Neoascia podagrica</i> (Fabricius, 1775)            |                                            | 1999 | 2019 |
| <i>Neoascia tenur</i> (Harris, 1780)                   |                                            | 2018 | 2018 |
| <i>Paragus albifrons</i> (Fallén, 1817)                |                                            | 2018 | 2019 |
| <i>Paragus bicolor</i> (Fabricius, 1794)               |                                            | 2019 | 2019 |
| <i>Paragus haemorrhous</i> Meigen, 1822                |                                            | 1999 | 2019 |
| <i>Paragus pecchiolii</i> Rondani, 1857                |                                            | 2018 | 2019 |
| <i>Paragus quadrfasciatus</i><br>(Meigen, 1822)        |                                            | 2018 | 2019 |
| <i>Paragus tibialis</i> (Fallén, 1817)                 |                                            | 2019 | 2019 |
| <i>Phryno Robineau-Desvoidy</i> , 1830                 |                                            | 2013 | 2013 |
| <i>Pipiza noctiluca</i> (Linnaeus, 1758)               |                                            | 2019 | 2019 |
| <i>Pipiza notata</i> (Meigen, 1822)                    |                                            | 2018 | 2019 |
| <i>Pipizella annulata</i> (Macquart, 1829)             |                                            | 2018 | 2019 |
| <i>Pipizella viduata</i> (Linnaeus, 1758)              |                                            | 2018 | 2019 |
| <i>Pipizella zeneggenensis</i><br>(Goeldlin, 1974)     |                                            | 2018 | 2018 |
| <i>Platycheirus albimanus</i>                          |                                            | 2018 | 2019 |

|                                                                   |                                    |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|
| (Fabricius, 1781)                                                 |                                    |      |      |
| <i>Platycheirus ambiguus</i> (Fallén, 1817)                       |                                    | 2018 | 2019 |
| <i>Platycheirus angustatus</i> (Zetterstedt, 1843)                |                                    | 2019 | 2019 |
| <i>Platycheirus clypeatus</i> (Meigen, 1822)                      |                                    | 2018 | 2019 |
| <i>Platycheirus europaeus</i> (Goeldlin, Maibach & Speight, 1990) |                                    | 2018 | 2018 |
| <i>Platycheirus fulviventris</i> (Macquart, 1829)                 |                                    | 2018 | 2019 |
| <i>Platycheirus occultus</i> (Goeldlin, Maibach & Speight, 1990)  |                                    | 2018 | 2019 |
| <i>Platycheirus scutatus</i> (Meigen, 1822)                       |                                    | 2018 | 2019 |
| <i>Pyrophæna rosarum</i> (Fabricius, 1787)                        |                                    | 2015 | 2019 |
| <i>Rhagio tringarius</i> (Linnaeus, 1758)                         |                                    | 2020 | 2020 |
| <i>Rhingia campestris</i> Meigen, 1822                            | Rhyngie champêtre                  | 2013 | 2019 |
| <i>Riponnensia splendens</i> (Meigen, 1822)                       |                                    | 2019 | 2019 |
| <i>Scaeva pyrastræ</i> (Linnaeus, 1758)                           | Syrphe du poirier, Syrphe pyrastræ | 2018 | 2019 |
| <i>Sphaerophoria scripta</i> (Linnaeus, 1758)                     |                                    | 1999 | 2019 |
| <i>Syrirta pipiens</i> (Linnaeus, 1758)                           |                                    | 1999 | 2019 |
| <i>Syrphus ribesii</i> (Linnaeus, 1758)                           | Syrphe du groseillier              | 1999 | 2019 |
| <i>Syrphus vitripennis</i> Meigen, 1822                           |                                    | 1999 | 2019 |
| <i>Temnostoma bombylans</i> (Fabricius, 1805)                     |                                    | 2019 | 2019 |
| <i>Temnostoma vespiforme</i> (Linnaeus, 1758)                     |                                    | 2019 | 2019 |
| <i>Thereva nobilitata</i> (Fabricius, 1775)                       |                                    | 2020 | 2020 |
| <i>Trichopoda pennipes</i> (Fabricius, 1781)                      |                                    | 2015 | 2015 |
| <i>Tropidia scita</i> (Harris, 1780)                              |                                    | 2018 | 2019 |
| <i>Urophora cardui</i> (Linnaeus, 1758)                           | Mouche du chardon                  | 2018 | 2018 |
| <i>Volucella bombylans</i> (Linnaeus, 1758)                       |                                    | 1999 | 2019 |
| <i>Volucella inanis</i> (Linnaeus, 1758)                          |                                    | 2015 | 2018 |
| <i>Volucella inflata</i> (Fabricius, 1794)                        |                                    | 2018 | 2019 |
| <i>Volucella zonaria</i> (Poda, 1761)                             | Volucelle zonée                    | 1999 | 2018 |
| <i>Xanthogramma citrofasciatum</i> (De Geer, 1776)                |                                    | 2019 | 2019 |
| <i>Xanthogramma dives</i> (Rondani, 1857)                         |                                    | 2015 | 2019 |

|                                                                      |                                                              |      |      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|
| <i>Xanthogramma pedissequum</i> (Harris, 1778)                       |                                                              | 2018 | 2019 |
| <i>Xylota segnis</i> (Linnaeus, 1758)                                |                                                              | 2015 | 2019 |
| <i>Xylota sylvarum</i> (Linnaeus, 1758)                              |                                                              | 2019 | 2019 |
| <b>Flore vasculaire</b>                                              |                                                              |      |      |
| <i>Acer campestre</i> L., 1753                                       | Erable champêtre                                             | 2013 | 2015 |
| <i>Achillea millefolium</i> L., 1753                                 | Achillée millefeuille                                        | 2015 | 2015 |
| <i>Achillea ptarmica</i> L., 1753                                    | Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, Achillée ptarmique | 2010 | 2016 |
| <i>Aegonychon purpureoeruleum</i> (L.) Holub, 1973                   | Grémil bleu pourpre                                          | 1995 | 2021 |
| <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753                                  | Aigremoine eupatoire, Francormier                            | 2011 | 2015 |
| <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753                                 | Agrostide stolonifère                                        | 2011 | 2015 |
| <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916                     | Ailante glanduleux, Faux vernis du Japon, Ailante, Ailante   | 2018 | 2018 |
| <i>Aira praecox</i> L., 1753                                         | Canche précoce                                               | 2015 | 2015 |
| <i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb., 1773                          | Bugle Petit-Pin                                              |      | /    |
| <i>Ajuga reptans</i> L., 1753                                        | Bugle rampant                                                | 1995 | 2015 |
| <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913            | Alliaire, Herbe aux aulx                                     | 1994 | 2019 |
| <i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753                               | Ail à tête ronde                                             | 1994 | 2021 |
| <i>Allium vineale</i> L. 1753                                        | Ail des vignes                                               | 2008 | 2015 |
| <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790                            | Aulne glutineux, Verne                                       | 2008 | 2018 |
| <i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753                                 | Vulpin des prés                                              | 2013 | 2021 |
| <i>Althaea officinalis</i> L., 1753                                  | Guimauve officinale, Guimauve sauvage                        | 1999 | 2019 |
| <i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | Orchis bouffon                                               | 2020 | 2020 |
| <i>Angelica sylvestris</i> L. 1753                                   | Angélique des bois                                           | 2008 | 2015 |
| <i>Anisantha diandra</i> (Roth) Tutin ex Tzvelev                     | Brome à deux étamines                                        | 1995 | 2015 |
| <i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski, 1934                          | Brome stérile                                                | 1995 | 2021 |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i> L. 1753                                 | Flouve odorante                                              | 2008 | 2015 |
| <i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>Vulneraria</i> L., 1753        | Anthyllide vulnéraire                                        | 2010 | 2015 |
| <i>Aphanes arvensis</i> , L., 1753                                   | Alchémille des champs                                        | 2012 | 2015 |
| <i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842                        | Arabette de thalium, Arabette des dames                      | 2011 | 2015 |
| <i>Arctium lappa</i> L., 1753                                        | Grande bardane, Bardane commune                              | 2019 | 2019 |
| <i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800                             | Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules          | 2008 | 2021 |
| <i>Arenaria leptoclados</i> (Rchb.)                                  | Sabline à parois fines, Sabline grêle                        | 2011 | 2015 |

|                                                                                 |                                                                            |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Guss., 1844                                                                     |                                                                            |      |      |
| <i>Arenaria serpyllifolia</i> L. Var. <i>Serpyllifolia</i> , L., 1753           | Sabline à feuilles de serpolet                                             | 1995 | 2015 |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819           | Fromental élevé, Ray-grass français                                        | 1995 | 2021 |
| <i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753                                              | Armoise commune                                                            | 1995 | 2015 |
| <i>Arum italicum</i> Mill., 1768                                                | Gouet d'Italie                                                             | 1994 | 2015 |
| <i>Arum maculatum</i> L., 1753                                                  | Gouet tacheté                                                              | 1995 | 2015 |
| <i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753                                         | Scolopendre, Scolopendre officinale                                        | 1994 | 2017 |
| <i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753                                         | Scolopendre                                                                | 1994 | 2015 |
| <i>Asplenium trichomanes</i> L., 1753                                           | Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge, Asplénie    | 1994 | 2017 |
| <i>Bellis perennis</i> L., 1753                                                 | Pâquerette                                                                 | 1995 | 2021 |
| <i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762                                  | Chlorette, Chlore perfoliée                                                | 2003 | 2015 |
| <i>Borago officinalis</i> L., 1753                                              | Bourrache officinale                                                       | 1994 | 2015 |
| <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812                                | Brachypode penné                                                           | 1995 | 2015 |
| <i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult., 1817                       | Brachypode des rochers                                                     | 2019 | 2021 |
| <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812                           | Brachypode des bois, Brome des bois                                        | 2008 | 2021 |
| <i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr., 1869                                    | Brome érigé                                                                | 1995 | 2021 |
| <i>Bromus commutatus</i> Schrad., 1806                                          | Brôme confondu                                                             | 2008 | 2015 |
| <i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753                                               | Brome mou                                                                  | 2008 | 2021 |
| <i>Bromus racemosus</i> L., 1762                                                | Brome en grappe                                                            | 2008 | 2021 |
| <i>Bryonia cretica</i> subsp. <i>Dioica</i> (Jacq.) Tutin, 1774                 | Bryone dioïque                                                             | 1995 | 2015 |
| <i>Bryonia dioica</i> Jacq., 1774                                               | Bryone dioïque                                                             | 2015 | 2021 |
| <i>Caltha palustris</i> L., 1753                                                | Populage des marais, Sarbouillotte                                         | 1999 | 2021 |
| <i>Campanula rapunculus</i> L., 1753                                            | Campanule raiponce                                                         | 1995 | 2021 |
| <i>Capsella bursa-pastoris</i> Subsp. <i>Bursa-pastoris</i> , (L.) Medik., 1792 | Bourse-à-Pasteur                                                           | 1994 | 2015 |
| <i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753                                               | Cardamine hirsute                                                          | 1994 | 2015 |
| <i>Cardamine impatiens</i> L., 1753                                             | Cardamine impatiens                                                        | 1995 | 2015 |
| <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753                                             | Cardamine des prés, Cresson des prés                                       | 1999 | 2020 |
| <i>Carduus nutans</i> L., 1753                                                  | Chardon penché                                                             | 1994 | 2015 |
| <i>Carex acuta</i> L., 1753                                                     | Laîche aiguë                                                               | 2012 | 2015 |
| <i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789                                            | Laîche des marais, Laîche fausse, Laîche aiguë, Laîche fausse Laîche aiguë | 2008 | 2021 |
| <i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785                                        | Laîche printanière                                                         | 2013 | 2015 |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| <i>Carex disticha</i> Huds., 1762                                       | Laîche distique                                                                                                                                                                     | 2008 | 2021 |
| <i>Carex divulsa</i> Stokes, 1787                                       | Laîche écartée                                                                                                                                                                      | 2012 | 2021 |
| <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771                                       | Laîche glauque, Langue-de-pic                                                                                                                                                       | 1999 | 2019 |
| <i>Carex hirta</i> L., 1753                                             | Laîche hérissée                                                                                                                                                                     | 2008 | 2021 |
| <i>Carex pairae</i> F.W. schultz, 1868                                  | Laiche de paira                                                                                                                                                                     | 2015 | 2015 |
| <i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753                                     | Laîche faux souchet                                                                                                                                                                 | 2008 | 2015 |
| <i>Carex riparia</i> Curtis, 1783                                       | Laîche des rives                                                                                                                                                                    | 2008 | 2015 |
| <i>Carex spicata</i> Huds., 1762                                        | Laîche en épis                                                                                                                                                                      | 1995 | 2021 |
| <i>Carex tomentosa</i> L., 1767                                         | Laîche tomenteuse                                                                                                                                                                   | 2017 | 2017 |
| <i>Carex vesicaria</i> L., 1753                                         | Laîche vésiculeuse, Laîche à utricules renflés                                                                                                                                      | 2013 | 2021 |
| <i>Carlina vulgaris</i> L., 1753                                        | Carline commune, Chardon doré                                                                                                                                                       | 1995 | 2019 |
| <i>Catapodium rigidum</i> (L.)<br>C.E.Hubb., 1953                       | Pâturin rigide, Desmazérie rigide                                                                                                                                                   | 1995 | 2015 |
| <i>Centaurea decipiens</i> Thuill.,<br>1799                             | Centaurée trompeuse , Centaurée décevante, Centaurée de Debeaux, Centaurée des prés, Centaurée du Roussillon, Centaurée des bois, Centaurée d'Endress, Centaurée à appendice étroit | 2011 | 2021 |
| <i>Centaurea jacea</i> L., 1753                                         | Centaurée jacée                                                                                                                                                                     | 1995 | 2015 |
| <i>Centaurea nigra</i> L., 1753                                         | Centaurée noire                                                                                                                                                                     | 1995 | 2015 |
| <i>Centaurea thuillieri</i> (Thuill,<br>1799)                           | Centaurée de Thuillier                                                                                                                                                              | 2011 | 2015 |
| <i>Centaurium erythraea</i> Rafn,<br>1800                               | Petite centaurée commune, Erythrée                                                                                                                                                  | 2001 | 2015 |
| <i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.)<br>Druce, 1898                       | Petite centaurée délicate                                                                                                                                                           | 1999 | 2015 |
| <i>Cerastium brachypetalum</i><br>Pers., 1805                           | Céraiste à pétales courts                                                                                                                                                           | 2011 | 2021 |
| <i>Cerastium fontanum</i> Baumg.,<br>1816                               | Céraiste commune                                                                                                                                                                    | 1994 | 2019 |
| <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.,<br>1799                            | Céraiste aggloméré                                                                                                                                                                  | 2019 | 2019 |
| <i>Chaerophyllum temulum</i> L.,<br>1753                                | Chérophylle penché, Couquet                                                                                                                                                         | 1995 | 2021 |
| <i>Chelidonium majus</i> L., 1753                                       | Grande chélidoine, Herbe à la verrue, Eclaire                                                                                                                                       | 1994 | 2015 |
| <i>Chenopodium hybridum</i><br>(L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch,<br>2012 | Chénopode à feuilles de Stramoine                                                                                                                                                   | 2002 | 2015 |
| <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.,<br>1772                              | Cirse des champs                                                                                                                                                                    | 2008 | 2015 |
| <i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.,<br>1772                           | Cirse laineux                                                                                                                                                                       | 1995 | 2015 |
| <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.,<br>1838                             | Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé                                                                                                                           | 1995 | 2021 |
| <i>Clematis vitalba</i> L., 1753                                        | Clématite des haies, Herbe aux gueux                                                                                                                                                | 2015 | 2021 |
| <i>Clinopodium acinos</i> (L.) Kuntze,<br>1891                          | Calament acinos                                                                                                                                                                     | 1995 | 2015 |
| <i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753                                     | Sariette commune, Grand Basilic                                                                                                                                                     | 2015 | 2015 |
| <i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753                                    | Liseron des champs                                                                                                                                                                  | 2008 | 2015 |
| <i>Convolvulus sepium</i> L., 1753                                      | Liset, Liseron des haies                                                                                                                                                            | 2008 | 2021 |



|                                                               |                                                           |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|
| <i>Convolvulus sepium</i> L., 1753                            | Liseron des haies                                         | 2008 | 2015 |
| <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753                              | Cornouiller sanguin                                       | 1995 | 2015 |
| <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775                         | Aubépine à un style, Epine noire, Bois de mai             | 2008 | 2021 |
| <i>Crepis biennis</i> L., 1753                                | Crépide bisannuelle                                       | 2008 | 2015 |
| <i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840                    | Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires            | 2011 | 2012 |
| <i>Crepis vesicaria</i> L., 1753                              | Barkhausie à feuilles de pissenlit, Crépis à vésicules    | 2002 | 2021 |
| <i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852                           | Gaillet croisette, Croisette commune                      | 1995 | 2021 |
| <i>Cydonia oblonga</i> Mill.                                  | Cognassier                                                | 2012 | 2015 |
| <i>Cyperus longus</i> L., 1753                                | Souchet long, Souchet odorant                             | 1999 | 2021 |
| <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753                            | Dactyle aggloméré, Pied-de-poule                          | 2008 | 2021 |
| <i>Daphne laureola</i> L., 1753<br>Subsp. Laureola            | Daphné lauréole                                           | 1994 | 2015 |
| <i>Daucus carota</i> L., 1753                                 | Carotte sauvage, Daucus carotte                           | 1995 | 2021 |
| <i>Dianthus caryophyllus</i> L., 1753                         | Oeillet giroflée                                          | 1994 | 2018 |
| <i>Digitalis purpurea</i> L., 1753                            | Digitale pourpre                                          | 1995 | 1995 |
| <i>Dioscorea communis</i> (L.)<br>Caddick & Wilkin, 2002      | Sceau de Notre Dame                                       | 2021 | 2021 |
| <i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753                             | Cabaret des oiseaux                                       | 2008 | 2015 |
| <i>Echinops sphaerocephalus</i> L., 1753                      | Echinops à tête ronde, Boulette à grosse tête             | 2000 | 2019 |
| <i>Echinops sphaerocephalus</i> L., 1753                      | Echinops à tête ronde                                     | 1995 | 2015 |
| <i>Echium vulgare</i> L., 1753                                | Vipérine commune, Vipérine vulgaire                       | 1995 | 2021 |
| <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753                            | Epilobe hirsute                                           | 2008 | 2015 |
| <i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753                          | Epilobe à 4 angles                                        | 1995 | 2015 |
| <i>Equisetum arvense</i> L., 1753                             | Prêle des champs                                          | 2013 | 2015 |
| <i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753                          | Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières | 1999 | 2015 |
| <i>Equisetum palustre</i> L., 1753                            | Prêle des marais                                          | 1999 | 2021 |
| <i>Erigeron canadensis</i> L., 1753                           | Vergerette du Canada                                      | 1995 | 2015 |
| <i>Erigeron sumatrensis</i> Retz., 1810                       | Vergerette de Barcelone                                   | 2019 | 2019 |
| <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789                   | Erodium à feuilles de Ciguë                               | 1995 | 2015 |
| <i>Ervilia hirsuta</i> (L.) Opiz, 1852)                       | Vesce hérissée                                            | 2013 | 2015 |
| <i>Eryngium campestre</i> L., 1753                            | Chardon Roland, Panicaud champêtre                        | 1994 | 2021 |
| <i>Euonymus europaeus</i> L., 1753                            | Bonnet-d'évêque                                           | 2011 | 2011 |
| <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753                         | Eupatoire chanvrine                                       | 2008 | 2015 |
| <i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753                         | Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès               | 1994 | 2021 |
| <i>Euphorbia dulcis</i> subsp.<br>Incompta (Ces.) Nyman, 1890 | Euphorbe douce                                            | 2008 | 2015 |
| <i>Euphorbia esula</i> L., 1753                               | Euphorbe éssule, Euphorbe feuillue, Euphorbe âcre         | 2014 | 2014 |

|                                                                                                     |                                                 |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|
| <i>Euphorbia exigua</i> L., 1753                                                                    | Euphorbe fluette                                | 2013 | 2015 |
| <i>Euphorbia lathyris</i> L., 1753                                                                  | Euphorbe épurge                                 | 1994 | 1994 |
| <i>Euphorbia stricta</i> L., 1753                                                                   | Euphorbe raide                                  | 2008 | 2015 |
| <i>Evonymus europaeus</i> L., 1753                                                                  | Fusain d'europe                                 | 1995 | 2015 |
| <i>Fallopia convolvulus</i> (var. <i>Convolvulus</i> (L.) Á.Löve, 1970                              | Renouée faux-liseron                            | 1994 | 2015 |
| <i>Festuca ovina</i> L., 1753                                                                       | Fétuque ovine                                   | 2008 | 2015 |
| <i>Festuca rubra</i> L., 1753                                                                       | Fétuque rouge                                   | 2008 | 2015 |
| <i>Ficaria verna</i> Huds., 1762                                                                    | Ficaire fausse-renoncule                        | 1994 | 2015 |
| <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879                                                        | Reine des prés, Spirée Ulmaire                  | 2008 | 2021 |
| <i>Foeniculum vulgare</i> Mill., 1768                                                               | Fenouil commun                                  | 1995 | 2015 |
| <i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>Oxycarpa</i> (M.Bieb. Ex Willd.) Franco & Rocha Afonso, 1804 | Frêne à feuilles étroites                       | 2008 | 2015 |
| <i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl, 1804                                                             | Frêne à feuilles étroites                       | 2011 | 2011 |
| <i>Fumaria capreolata</i> L., 1753                                                                  | Fumeterre grimpante                             | 1994 | 1994 |
| <i>Fumaria officinalis</i> L., 1753                                                                 | Fumeterre officinale                            | 1995 | 2015 |
| <i>Galium album</i> Mill., 1768                                                                     | Gaillet dressé                                  | 2012 | 2021 |
| <i>Galium aparine</i> L., 1753                                                                      | Gaillet gratteron, Herbe collante               | 1995 | 2021 |
| <i>Galium mollugo</i> L., 1753                                                                      | Gaillet commun, Gaillet Mollugine               | 1995 | 2015 |
| <i>Galium palustre</i> L., 1753                                                                     | Gaillet des marais                              | 2008 | 2021 |
| <i>Galium uliginosum</i> L., 1753                                                                   | Gaillet des fanges                              | 2012 | 2015 |
| <i>Galium verum</i> L., 1753                                                                        | Gaillet jaune, Caille-lait jaune                | 2008 | 2019 |
| <i>Geranium columbinum</i> L., 1753                                                                 | Géranium des colombes, Pied de pigeon           | 1995 | 2021 |
| <i>Geranium dissectum</i> L., 1755                                                                  | Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées | 1995 | 2021 |
| <i>Geranium molle</i> L., 1753                                                                      | Géranium mou                                    | 1995 | 2015 |
| <i>Geranium robertianum</i> L., 1753                                                                | Herbe à Robert                                  | 1994 | 2021 |
| <i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753                                                              | Géranium à feuilles rondes, Mauvette            | 1995 | 2021 |
| <i>Geum urbanum</i> L., 1753                                                                        | Benoîte commune, Herbe de saint Benoît          | 1995 | 2021 |
| <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753                                                                  | Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre     | 1995 | 2019 |
| <i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb., 1919                                                        | Grande glycérie                                 | 1999 | 2015 |
| <i>Hedera helix</i> L., 1753                                                                        | Lierre grimpant                                 | 1994 | 2015 |
| <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753                                                               | Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce       | 2008 | 2019 |
| <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753                                                               | Grande Berce                                    | 2008 | 2015 |
| <i>Hieracium lachenalii</i> Suter, 1802                                                             | Epervière de Lachenal                           | 1995 | 1995 |
| <i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826                                                   | Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc      | 1999 | 2017 |
| <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753                                                                  | Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval              | 1994 | 2021 |

|                                                                            |                                                          |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|
| <i>Holcus lanatus</i> L., 1753                                             | Houlque laineuse, Blanchard                              | 2008 | 2021 |
| <i>Hordeum vulgare</i> L., 1753                                            | Escourgeon                                               | 2008 | 2015 |
| <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.)<br>Chouard ex Rothm., 1944           | Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée      | 2017 | 2017 |
| <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753                                       | Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean             | 1995 | 2021 |
| <i>Inula conyzae</i> (Greiss.) DC.,<br>1836                                | Inule conyze, Inule squarreuse                           | 1994 | 2021 |
| <i>Iris foetidissima</i> L., 1753                                          | Iris jaune, Iris gigot, Glaïeul puant                    | 1994 | 2015 |
| <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753                                           | Iris faux acore, Iris des marais                         | 2000 | 2021 |
| <i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn.,<br>1791                                  | Séneçon jacobée, Herbe de Saint Jacques, Jacobée commune | 2008 | 2021 |
| <i>Juglans regia</i> L., 1753                                              | Noyer commun, Calottier                                  | 1995 | 2011 |
| <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex<br>Hoffm., 1791                         | Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore                    | 2008 | 2015 |
| <i>Juncus articulatus</i> L., 1753                                         | Jonc articulé                                            | 2012 | 2015 |
| <i>Juncus bufonius</i> L., 1753                                            | Jonc des crapauds                                        | 1994 | 2015 |
| <i>Juncus effusus</i> L., 1753                                             | Jonc épars, Jonc diffus                                  | 2019 | 2019 |
| <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.,<br>1828                               | Knautie des champs, Oreille-d'âne                        | 2011 | 2015 |
| <i>Lactuca serriola</i> L., 1756                                           | Laitue scariole, Escarole                                | 2019 | 2021 |
| <i>Lactuca virosa</i> L., 1753                                             | Laitue sauvage                                           | 1995 | 2015 |
| <i>Lamium purpureum</i> L., 1753                                           | Lamier pourpre                                           | 1995 | 2015 |
| <i>Lapsana communis</i> L., 1753<br>Subsp. Communis                        | Lampsane commune                                         | 1995 | 2015 |
| <i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753                                         | Gesse des prés                                           | 2008 | 2021 |
| <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.,<br>1779                                  | Marguerite commune, Leucanthème commun                   | 1999 | 2021 |
| <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753                                          | Troà«ne, Raisin de chien                                 | 1995 | 2015 |
| <i>Linum catharticum</i> L., 1753                                          | Lin purgatif                                             | 1995 | 2015 |
| <i>Linum usitatissimum</i> subsp.<br>angustifolium (Huds.) Thell.,<br>1912 | Lin à feuilles étroites, Lin bisannuel                   | 2003 | 2021 |
| <i>Lithospermum officinale</i> L.,<br>1753                                 | Grémil officinal, Herbe aux perles                       | 2003 | 2003 |
| <i>Lolium multiflorum</i> Lam., 1779                                       | Ray-grass d'Italie                                       | 2008 | 2015 |
| <i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753                                         | Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies            | 1994 | 2020 |
| <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753                                         | Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée      | 2008 | 2021 |
| <i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793                                       | Lotus des marais, Lotier des marais                      | 2008 | 2021 |
| <i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753                                        | Oeil-de-perdrix                                          | 1999 | 2019 |
| <i>Lycopsis arvensis</i> L., 1753                                          | Buglosse des champs                                      | 1994 | 2015 |
| <i>Lysimachia nummularia</i> , M.,<br>1753                                 | Lysimaque nummulaire                                     | 2012 | 2015 |
| <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753                                        | Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire                    | 2000 | 2021 |
| <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753                                          | Salicaire commune, Salicaire pourpre                     | 2008 | 2021 |
| <i>Malva alcea</i> L., 1753                                                | Mauve alcée                                              | 2008 | 2015 |
| <i>Malva neglecta</i> Wallr., 1824                                         | Mauve commune                                            | 1995 | 2015 |

|                                                                             |                                                                                                                 |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| <i>Malva sylvestris</i> L., 1753                                            | Grande Mauve                                                                                                    | 1995 | 2015 |
| <i>Matricaria discoidea</i> DC., 1838                                       | Matricaire odorante                                                                                             | 1995 | 2015 |
| <i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762                                    | Luzerne tachetée                                                                                                | 1995 | 2021 |
| <i>Medicago lupulina</i> L., 1753                                           | Luzerne lupuline, Minette                                                                                       | 1995 | 2015 |
| <i>Medicago sativa</i> L., 1753                                             | Luzerne cultivée                                                                                                | 2008 | 2021 |
| <i>Melampyrum arvense</i> L., 1753                                          | Mélampyre des champs                                                                                            | 2003 | 2008 |
| <i>Melampyrum pratense</i> L., 1753                                         | Mélampyre des prés                                                                                              | 1999 | 1999 |
| <i>Mentha aquatica</i> L., 1753                                             | Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouille | 2008 | 2021 |
| <i>Mentha suaveolens</i> Subsp. <i>Suaveolens</i> Ehrh., 1792               | Menthe à feuilles rondes                                                                                        | 1995 | 2015 |
| <i>Mercurialis annua</i> L., 1753                                           | Mercuriale annuelle                                                                                             | 1995 | 2015 |
| <i>Microthlaspi perfoliatum</i> (L.) F.K.Mey.                               | Monnoyère à feuilles embrassantes                                                                               | 1995 | 2015 |
| <i>Misopates orontium</i> (L.) Raf., 1840                                   | Mufler des champs                                                                                               | 1994 | 1994 |
| <i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768                                     | Muscari à toupet, Muscari chevelu                                                                               | 2011 | 2021 |
| <i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764                                    | Myosotis des champs                                                                                             | 2019 | 2019 |
| <i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797                                        | Myosotis bicolore, Myosotis changeant                                                                           | 2021 | 2021 |
| <i>Myosotis laxa</i> subsp. <i>Cespitosa</i> (Schultz) Hyl. Ex Nordh., 1940 | Myosotis gazonnant                                                                                              | 2008 | 2015 |
| <i>Myosotis ramosissima</i> (Rochel, 1814)                                  | Myosotis hérissé                                                                                                | 2012 | 2015 |
| <i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753                                        | Myosotis des marais                                                                                             | 1999 | 2015 |
| <i>Narcissus pseudonarcissus</i> subsp. <i>pseudonarcissus</i> L., 1753     | Jonquille                                                                                                       | 2018 | 2018 |
| <i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809                                          | Nénuphar jaune                                                                                                  | 2008 | 2008 |
| <i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort., 1827                            | Odontite rouge, Euphrase rouge                                                                                  | 2003 | 2021 |
| <i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753                                          | Oenanthe fistuleuse                                                                                             | 2008 | 2015 |
| <i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819                                    | Oenanthe à feuilles de Silaüs, Oenanthe intermédiaire                                                           | 2001 | 2015 |
| <i>Ononis natrix</i> L., 1753                                               | Bugrane jaune                                                                                                   | 1994 | 2021 |
| <i>Ononis spinosa</i> L., 1753                                              | Bugrane épineuse, Arrête-boeuf                                                                                  | 1999 | 2021 |
| <i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762                                           | Ophrys abeille                                                                                                  | 2008 | 2019 |
| <i>Ophrys aranifera</i> Huds., 1778                                         | Ophrys araignée, Oiseau-coquet                                                                                  | 1994 | 2021 |
| <i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762                                          | Orchis pourpre, Grivollée                                                                                       | 1994 | 2020 |
| <i>Orchis simia</i> Lam., 1779                                              | Orchis singe                                                                                                    | 1994 | 2021 |
| <i>Orchis x angusticruris</i> Franch. ex Rouy, 1912                         |                                                                                                                 | 2015 | 2017 |
| <i>Origanum vulgare</i> L., 1753                                            | Origan commun                                                                                                   | 1994 | 2021 |

|                                                           |                                                                             |      |      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|
| <i>Ornithogalum umbellatum</i> L., 1753                   | Ornithogale en ombelle, Dame-d'onze-heures, Ornithogale à feuilles étroites | 2016 | 2021 |
| <i>Orobanche hederæ</i> Vaucher ex Duby, 1828             | Orobanche du lierre                                                         | 1994 | 2015 |
| <i>Oxalis fontana</i> Bunge, 1835                         | Oxalide droit                                                               | 2008 | 2008 |
| <i>Papaver dubium</i> L., 1753                            | Coquelicot douteux                                                          | 1995 | 1995 |
| <i>Papaver rhoeas</i> L., 1753                            | Coquelicot                                                                  | 1995 | 2019 |
| <i>Parthenocissus inserta</i> (A.Kern.) Fritsch, 1922     | Vigne-vierge commune                                                        | 2008 | 2015 |
| <i>Pastinaca sativa</i> L., 1753                          | Panais cultivé                                                              | 2008 | 2008 |
| <i>Persicaria amphibia</i> (L.) Gray, 1821                | Persicaire flottante                                                        | 2008 | 2015 |
| <i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach, 1841             | Renouée Poivre d'eau                                                        | 2019 | 2019 |
| <i>Persicaria maculosa</i> Gray, 1821                     | Renouée persicaire                                                          | 1995 | 2015 |
| <i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753                      | Baldingère faux-roseau, Fromenteau                                          | 2008 | 2021 |
| <i>Phleum pratense</i> L., 1753                           | Fléole des prés                                                             | 2011 | 2015 |
| <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840  | Roseau, Roseau commun, Roseau à balais                                      | 1999 | 2021 |
| <i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 | Piloselle                                                                   | 1995 | 2015 |
| <i>Pinus sylvestris</i> L., 1753                          | Pin sylvestre                                                               | 2008 | 2011 |
| <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753                       | Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures                                  | 1995 | 2019 |
| <i>Plantago major</i> L., 1753                            | Grand plantain                                                              | 1995 | 2015 |
| <i>Plantago media</i> Subsp. Media L., 1753               | Plantain bâtard                                                             | 1994 | 2015 |
| <i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828        | Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère à fleurs verdâtres                | 2006 | 2016 |
| <i>Poa annua</i> L., 1753                                 | Pâturin annuel                                                              | 1995 | 2015 |
| <i>Poa compressa</i> L., 1753                             | Pâturin comprimé, Pâturin à tiges aplaties                                  | 2021 | 2021 |
| <i>Poa pratensis</i> L., 1753                             | Pâturin des prés                                                            | 1995 | 2021 |
| <i>Poa trivialis</i> L., 1753                             | Pâturin commun, Gazon d'Angleterre                                          | 2008 | 2021 |
| <i>Polygonum aviculare</i> L., 1753                       | Renouée des oiseaux                                                         | 2008 | 2015 |
| <i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961                | Polypode intermédiaire                                                      | 1994 | 1994 |
| <i>Polypodium</i> L., 1753                                |                                                                             | 2017 | 2017 |
| <i>Populus nigra</i> L., 1753                             | Peuplier commun noir, Peuplier noir                                         | 2008 | 2018 |
| <i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797               | Potentille dressée                                                          | 2008 | 2008 |
| <i>Potentilla reptans</i> L., 1753                        | Potentille rampante, Quintefeuille                                          | 2008 | 2021 |
| <i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753                      | Pimprenelle à fruits réticulés                                              | 1995 | 2021 |
| <i>Primula veris</i> L., 1753                             | Coucou, Primevère officinale, Brérelle                                      | 1994 | 2021 |
| <i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1753                   | Brunelle laciniée                                                           | 1995 | 1995 |
| <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1753                         | Merisier                                                                    | 1994 | 2015 |
| <i>Prunus domestica</i> L., 1753                          | Prunier                                                                     | 1995 | 1995 |



|                                             |                                                              |      |      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|
| <i>Prunus spinosa</i> L., 1753              | Epine noire, Prunellier, Pelossier                           | 1994 | 2021 |
| <i>Pyrus cordata</i> Desv., 1818            | Poirier à feuilles en cœur                                   | 1995 | 2015 |
| <i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl., 1784 | Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets                | 2015 | 2015 |
| <i>Quercus robur</i> L., 1753               | Chêne pédonculé, Gravelin                                    | 2008 | 2015 |
| <i>Ranunculus acris</i> L., 1753            | Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre                     | 2008 | 2021 |
| <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753         | Renoncule bulbeuse                                           | 1995 | 2019 |
| <i>Ranunculus parviflorus</i> L., 1753      | Renoncule à petites fleurs                                   | 1995 | 1995 |
| <i>Ranunculus repens</i> L., 1753           | Renoncule rampante                                           | 2008 | 2021 |
| <i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763      | Renoncule de Sardaigne                                       | 2008 | 2015 |
| <i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753       | Renoncule à feuilles de cèleri                               | 1999 | 2015 |
| <i>Reseda lutea</i> L., 1753                | Réséda jaune                                                 | 1994 | 2015 |
| <i>Reseda luteola</i> L., 1753              | Réséda jaunâtre, Réséda des teinturiers, Mignonette jaunâtre | 1994 | 2008 |
| <i>Reseda luteola</i> L., 1753              | Réséda jaunâtre                                              | 1994 | 2008 |
| <i>Rhamnus alaternus</i> L., 1753           | Nerprun Alaterne, Alaterne                                   | 2020 | 2020 |
| <i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753          | Nerprun purgatif                                             | 1995 | 2015 |
| <i>Ribes rubrum</i> L., 1753                | Groseillier à grappes                                        | 1999 | 2015 |
| <i>Rosa canina</i> L., 1753                 | Rosier des Chiens                                            | 1995 | 2015 |
| <i>Rosa</i> L., 1753                        |                                                              | 1995 | 2021 |
| <i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm., 1812   | Rosier à petites fleurs, Eglantier à petites fleurs          | 2008 | 2012 |
| <i>Rubia peregrina</i> L., 1753             | Garance voyageuse, Petite garance                            | 1995 | 2015 |
| <i>Rubus fruticosus</i> L., 1753            | Ronce des bois                                               | 2008 | 2015 |
| <i>Rubus</i> L., 1753                       |                                                              | 2008 | 2021 |
| <i>Rumex acetosa</i> L., 1753               | Oseille des prés, Rumex oseille                              | 1995 | 2021 |
| <i>Rumex acetosella</i> L.                  | Petite oseille                                               | 2008 | 2015 |
| <i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770     | Patience agglomérée, Oseille agglomérée                      | 2008 | 2021 |
| <i>Rumex crispus</i> L., 1753               | Patience crépue, Oseille crépue                              | 1995 | 2021 |
| <i>Rumex hydrolapathum</i> Huds., 1778      | Patience d'eau, Grande Parelle                               | 2008 | 2017 |
| <i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753          | Patience à feuilles obtuses                                  | 1995 | 2015 |
| <i>Rumex pulcher</i> L., 1753               | Patience élégante, Rumex joli                                | 1995 | 2017 |
| <i>Rumex sanguineus</i> L., 1753            | Patience sanguine                                            | 2017 | 2021 |
| <i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804        | Saule à feuilles d'olivier                                   | 2008 | 2015 |
| <i>Salix caprea</i> L., 1753                | Saule marsault                                               | 2008 | 2015 |
| <i>Salix</i> L., 1753                       | Saules                                                       | 2008 | 2018 |
| <i>Salvia officinalis</i> L., 1753          | Sauge officinale                                             | 1994 | 2015 |
| <i>Salvia pratensis</i> L., 1753            | Sauge commune                                                | 1999 | 2015 |

|                                                         |                                                 |      |      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|
| <i>Salvia verbenaca</i> L., 1753                        | Sauge fausse-verveine                           | 1995 | 2015 |
| <i>Sambucus ebulus</i> L., 1753                         | Sureau yèble, Herbe à l'aveugle                 | 2008 | 2021 |
| <i>Sambucus nigra</i> L., 1753                          | Sureau noir                                     | 1995 | 2015 |
| <i>Saponaria officinalis</i> L., 1753                   | Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon | 1994 | 2021 |
| <i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753                     | Scabieuse colombarie                            | 1995 | 2019 |
| <i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824 | Fétuque Roseau                                  | 2008 | 2021 |
| <i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv., 1812     | Fétuque des prés                                | 2008 | 2015 |
| <i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753                      | Scirpe des bois                                 | 2008 | 2015 |
| <i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753                     | Scrofulaire noueuse                             | 2008 | 2015 |
| <i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753                | Scutellaire à casque                            | 2008 | 2015 |
| <i>Sedum rupestre</i> L., 1753                          | Orpin réfléchi, Orpin des rochers               | 2015 | 2015 |
| <i>Senecio vulgaris</i> L., 1753                        | Séneçon commun                                  | 1995 | 2015 |
| <i>Seseli montanum</i> , L., 1753                       | Séséli des montagnes                            | 2013 | 2015 |
| <i>Sherardia arvensis</i> L., 1753                      | Rubéole des champs, Gratteron fleuri            | 1995 | 2019 |
| <i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915         | Silaüs des prés, Cumin des prés                 | 2011 | 2015 |
| <i>Silene baccifera</i> (L.) Roth, 1788                 | Silene baccifera                                | 1995 | 2015 |
| <i>Silene latifolia</i> Poir., 1789                     | Compagnon blanc, Silène à feuilles larges       | 1995 | 2015 |
| <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869            | Silène commun                                   | 1995 | 2015 |
| <i>Sinapis arvensis</i> L., 1753                        | Moutarde des champs, Raveluche                  | 1995 | 2015 |
| <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753                       | Morelle douce-amère                             | 2013 |      |
| <i>Solanum nigrum</i> L., 1753                          | Morelle noire                                   | 1994 | 2015 |
| <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769                    | Laiteron rude, Laiteron piquant                 | 1995 | 2021 |
| <i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753                       | Laiteron potager, Laiteron lisse                | 1995 | 2021 |
| <i>Sorbus domestica</i> L., 1753                        | Sorbier domestique                              | 1995 | 2015 |
| <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763              | Alisier des bois, Alisier torminal              | 2015 | 2015 |
| <i>Stachys palustris</i> L., 1753                       | Epiaire des marais, Ortie bourbière             | 2001 | 2019 |
| <i>Stachys recta</i> L., 1767                           | Epiaire droite                                  | 1995 | 2021 |
| <i>Stellaria holostea</i> L., 1753                      | Stellaire holostée                              | 1994 | 2015 |
| <i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789                 | Stellaire intermédiaire                         | 1995 | 2015 |
| <i>Symphytum officinale</i> L., 1753                    | Grande consoude                                 | 2008 | 2021 |
| <i>Syringa vulgaris</i> L., 1753                        | Lilas commun                                    | 2008 | 2015 |
| <i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch.Bip., 1844         | Grande Camomille                                | 1995 | 1995 |
| <i>Taraxacum erythrospermum</i> Andr. Ex Besser, 1821   | Pissenlit à feuilles lisses                     | 1995 | 2008 |
| <i>Taraxacum</i> section Ruderalia                      | Pissenlit                                       | 2012 | 2015 |

|                                                                                            |                                                                                         |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| <i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753                                                        | Germandrée petit-chêne, Chênnette                                                       | 1994 | 2021 |
| <i>Thalictrum flavum</i> L., 1753                                                          | Pigamon jaune, Pigamon noircissant                                                      | 1999 | 2021 |
| <i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1830                                                 | Torilis faux-cerfeuil, Grattau                                                          | 2021 | 2021 |
| <i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753                                                       | Salsifis des prés                                                                       | 2008 | 2015 |
| <i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804                                                   | Trèfle des champs                                                                       | 1995 | 2015 |
| <i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794                                                       | Trèfle douteux                                                                          | 1995 | 2021 |
| <i>Trifolium pratense</i> L., 1753                                                         | Trèfle des prés, Trèfle violet                                                          | 2008 | 2021 |
| <i>Trifolium repens</i> L., 1753                                                           | Trèfle blanc                                                                            | 1995 | 2015 |
| <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768                                                             | Petit orme, Orme champêtre                                                              | 1995 | 2021 |
| <i>Urtica dioica</i> L., 1753                                                              | Ortie dioïque, Grande ortie                                                             | 1994 | 2021 |
| <i>Valeriana dioica</i> L., 1753                                                           | Valériane dioïque                                                                       | 1999 | 2018 |
| <i>Valeriana officinalis</i> L., 1753                                                      | Valériane officinale, Valériane des collines                                            | 1999 | 2019 |
| <i>Valerianella locusta</i> f. <i>Carinata</i> (Loisel.) Devesa, J.López & R.Gonzalo, 1821 | Valérianelle carénée                                                                    | 1995 | 1995 |
| <i>Verbascum lychnitis</i> L., 1753                                                        | Bouillon noir                                                                           | 2008 | 2015 |
| <i>Verbascum thapsus</i> L., 1753                                                          | Molène Bouillon blanc                                                                   | 1994 | 2015 |
| <i>Verbena officinalis</i> L., 1753                                                        | Verveine sauvage                                                                        | 2008 | 2015 |
| <i>Veronica anagallis-aquatica</i> L., 1753                                                | Mouron aquatique                                                                        | 2019 | 2019 |
| <i>Veronica arvensis</i> L., 1753                                                          | Véronique des champs, Velvete sauvage                                                   | 1995 | 2021 |
| <i>Veronica beccabunga</i> L., 1753                                                        | Véronique des ruisseaux                                                                 | 1999 | 2015 |
| <i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753                                                        | Véronique petit chêne, Fausse Germandrée                                                | 1995 | 2019 |
| <i>Veronica persica</i> Poir., 1808                                                        | Véronique de Perse                                                                      | 1995 | 2015 |
| <i>Veronica scutellata</i> L., 1753                                                        | Véronique à écus, Véronique à écusson                                                   | 1999 | 2015 |
| <i>Vicia angustifolia</i> L., 1759                                                         | Vesce à feuilles étroites                                                               | 2021 | 2021 |
| <i>Vicia cracca</i> L., 1753                                                               | Vesce cracca, Jarosse                                                                   | 2008 | 2019 |
| <i>Vicia sativa</i> L., 1753                                                               | Vesce cultivée, Poisette                                                                | 1995 | 2021 |
| <i>Vinca major</i> L., 1753                                                                | Grande pervenche                                                                        | 1994 | 2021 |
| <i>Viola hirta</i> L., 1753                                                                | Violette hérissée                                                                       | 1995 | 2015 |
| <i>Viola odorata</i> L., 1753                                                              | Violette odorante                                                                       | 1995 | 2015 |
| <i>Viscum album</i> L., 1753                                                               | Gui blanc                                                                               | 2008 | 2015 |
| <i>Vitis vinifera</i> L. Subsp. <i>Vinifera</i> L., 1753                                   | Vigne cultivée                                                                          | 2008 | 2015 |
| <i>Ziziphora acinos</i> (L.) Melnikov, 2016                                                | Calament acinos, Thym basilic, Clinopode des champs, Petit Basilic, Sariette des champs | 2011 | 2011 |
| <b>Hémiptères</b>                                                                          |                                                                                         |      |      |
| <i>Elasmotethus minor</i> Horvath, 1899                                                    |                                                                                         | 2015 | 2016 |
| <i>Adelphocoris Reuter</i> , 1896                                                          |                                                                                         | 2018 | 2018 |
| <i>Aelia acuminata</i> (Linnaeus, 1758)                                                    | Punaise à tête allongée                                                                 | 2016 | 2020 |
| <i>Aellopus atratus</i> (Goeze, 1778)                                                      |                                                                                         | 2013 | 2013 |

|                                                                                        |                                            |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|
| <i>Aneurus avenius</i> (Dufour, 1833)                                                  |                                            | 2016 | 2016 |
| <i>Anthocoris nemoralis</i> (Fabricius, 1794)                                          |                                            | 2016 | 2016 |
| <i>Aphrophora alni</i> (Fallén, 1805)                                                  |                                            | 2017 | 2017 |
| <i>Apoplymus pectoralis</i> Fieber, 1859                                               |                                            | 2020 | 2020 |
| <i>Arma custos</i> (Fabricius, 1794)                                                   |                                            | 2020 | 2020 |
| <i>Beosus maritimus</i> (Scopoli, 1763)                                                |                                            | 2013 | 2019 |
| <i>Camptopus lateralis</i> (Germar, 1817)                                              | Alydide des genêts                         | 2017 | 2019 |
| <i>Capsus ater</i> (Linnaeus, 1758)                                                    |                                            | 2018 | 2018 |
| <i>Carpocoris purpureipennis</i> (De Geer, 1773)                                       |                                            | 2016 | 2018 |
| <i>Ceraleptus obtusus</i> (Brullé, 1838)                                               |                                            | 2017 | 2017 |
| <i>Cercopis intermedia</i> Kirschbaum, 1868                                            |                                            | 2016 | 2021 |
| <i>Cercopis vulnerata</i> Rossi, 1807                                                  | Cercope, Crachat de coucou                 | 2005 | 2021 |
| <i>Coptosoma scutellatum</i> (Geoffroy, 1785)                                          | Punaise cuirasse                           | 2016 | 2020 |
| <i>Coreus marginatus</i> (Linnaeus, 1758)                                              | Corée marginée                             | 2013 | 2021 |
| <i>Corizus hyoscyami</i> (Linnaeus, 1758)                                              | Corise de la jusquiame                     | 2001 | 2019 |
| <i>Cydnus aterrimus</i> (Forster, 1771)                                                |                                            | 2013 | 2013 |
| <i>Deraeocoris lutescens</i> (Schilling, 1837)                                         |                                            | 2016 | 2017 |
| <i>Deraeocoris ruber</i> (Linnaeus, 1758)                                              |                                            | 2013 | 2020 |
| <i>Dictyla humuli</i> (Fabricius, 1794)                                                |                                            | 2016 | 2018 |
| <i>Dictyophara europaea</i> (Linnaeus, 1767)                                           | Dictyophore européen, Fulgore d'Europe     | 2017 | 2017 |
| <i>Drymus sylvaticus</i> (Fabricius, 1775)                                             |                                            | 2013 | 2016 |
| <i>Emblethis griseus</i> (Wolff, 1802)                                                 |                                            | 2013 | 2013 |
| <i>Enoplops scapha</i> (Fabricius, 1794)                                               |                                            | 2018 | 2018 |
| <i>Eurydema oleracea</i> (Linnaeus, 1758)                                              | Punaise verte à raies & rouges ou blanches | 2016 | 2019 |
| <i>Eurygaster austriaca</i> (Schrank, 1776)                                            |                                            | 2018 | 2018 |
| <i>Eurygaster maura</i> (Linnaeus, 1758)                                               |                                            | 2013 | 2016 |
| <i>Eurygaster testudinaria</i> (Geoffroy, 1785)                                        | Punaise tortue brune                       | 2013 | 2020 |
| <i>Geocoris erythrocephalus</i> (Lepeletier de Saint Fargeau & Audinet-Serville, 1825) | Géocore à tête rouge                       | 2020 | 2020 |
| <i>Graphosoma italicum</i> (O.F. Müller, 1766)                                         | Punaise arlequin                           | 2001 | 2021 |

|                                                             |                                            |      |      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|
| <i>Graptopeltus lynceus</i><br>(Fabricius, 1775)            |                                            | 2013 | 2013 |
| <i>Haploprocta sulcicornis</i><br>(Fabricius, 1794)         |                                            | 2016 | 2016 |
| <i>Heterogaster urticae</i><br>(Fabricius, 1775)            | Hétérogaster de l'ortie                    | 2016 | 2016 |
| <i>Heterotoma planicornis</i> (Pallas, 1772)                |                                            | 2020 | 2020 |
| <i>Himacerus mirmicoides</i> (O. Costa, 1834)               | Nabide-fourmi                              | 2013 | 2020 |
| <i>Horvathiolus superbus</i> (Pollich, 1781)                |                                            | 2017 | 2018 |
| <i>Ischnocoris angustulus</i><br>(Boheman, 1852)            |                                            | 2013 | 2013 |
| <i>Ischnodemus sabuleti</i> (Fallén, 1826)                  |                                            | 2018 | 2018 |
| <i>Kalama tricornis</i> (Schränk, 1801)                     |                                            | 2013 | 2013 |
| <i>Leptopterna dolabrata</i><br>(Linnaeus, 1758)            |                                            | 2013 | 2013 |
| <i>Liocoris tripustulatus</i><br>(Fabricius, 1781)          |                                            | 2016 | 2018 |
| <i>Lygus</i> Hahn, 1833                                     |                                            | 2016 | 2018 |
| <i>Megalonotus emarginatus</i><br>(Rey, 1888)               |                                            | 2018 | 2018 |
| <i>Megalonotus praetextatus</i><br>(Herrich-Schäffer, 1835) |                                            | 2018 | 2018 |
| <i>Melanocoryphus albomaculatus</i> (Goeze, 1778)           |                                            | 2016 | 2020 |
| <i>Miris striatus</i> (Linnaeus, 1758)                      |                                            | 2016 | 2020 |
| <i>Nabis</i> Latreille, 1802                                |                                            | 2016 | 2016 |
| <i>Neides aduncus</i> Fieber, 1859                          |                                            | 2018 | 2018 |
| <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)                     | Punaise verte ponctuée                     | 2013 | 2021 |
| <i>Nysius graminicola</i> (Kolenati, 1845)                  |                                            | 2016 | 2016 |
| <i>Palomena prasina</i> (Linnaeus, 1760)                    | Punaise verte                              | 2015 | 2020 |
| <i>Peirates stridulus</i> (Fabricius, 1787)                 | Rèduve pirate                              | 2013 | 2013 |
| <i>Pentatoma rufipes</i> (Linnaeus, 1758)                   | Punaise à pattes rousses, Punaise des bois | 2017 | 2020 |
| <i>Peribalus strictus vernalis</i><br>(Wolff, 1804)         |                                            | 2017 | 2020 |
| <i>Peritrechus gracilicornis</i> Puton, 1877                |                                            | 2013 | 2019 |
| <i>Physatocheila dumetorum</i><br>(Herrich-Schäffer, 1838)  |                                            | 2016 | 2017 |
| <i>Picromerus bidens</i> (Linnaeus, 1758)                   |                                            | 2019 | 2019 |
| <i>Plinthisus brevipennis</i><br>(Latreille, 1807)          |                                            | 2013 | 2013 |
| <i>Polymerus unifasciatus</i><br>(Fabricius, 1794)          |                                            | 2019 | 2019 |



|                                                         |                                           |      |      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|
| <i>Pterotmetus staphyliniformis</i> (Schilling, 1829)   |                                           | 2013 | 2019 |
| <i>Raglius confusus</i> (Reuter, 1886)                  |                                           | 2016 | 2020 |
| <i>Rhopalus subrufus</i> (Gmelin, 1790)                 |                                           | 2017 | 2018 |
| <i>Rhynocoris annulatus</i> (Linnaeus, 1758)            |                                           | 2017 | 2017 |
| <i>Rhynocoris erythropus</i> (Linnaeus, 1767)           | Rèduve à pattes rouges                    | 2017 | 2019 |
| <i>Rhyparochromus vulgaris</i> (Schilling, 1829)        |                                           | 2013 | 2019 |
| <i>Scolopostethus affinis</i> (Schilling, 1829)         |                                           | 2016 | 2016 |
| <i>Spathocera lobata</i> (Herrich-Schäffer, 1840)       |                                           | 2017 | 2017 |
| <i>Spilostethus saxatilis</i> (Scopoli, 1763)           | Punaise à damier                          | 2001 | 2001 |
| <i>Stenodema calcarata</i> (Fallén, 1807)               |                                           | 2013 | 2013 |
| <i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977         | Membracide bison                          | 2019 | 2021 |
| <i>Stictopleurus punctatonervosus</i> (Goeze, 1778)     |                                           | 2016 | 2016 |
| <i>Strobilotoma typhaecornis</i> (Fabricius, 1803)      |                                           | 2013 | 2018 |
| <i>Tingis crispata</i> (Herrich-Schäffer, 1838)         |                                           | 2019 | 2019 |
| <i>Tritomegas sexmaculatus</i> (Rambur, 1839)           |                                           | 2019 | 2019 |
| <i>Vilpianus galii</i> (Wolff, 1802)                    |                                           | 2017 | 2020 |
| <i>Aradus depressus</i> (Fabricius, 1794)               |                                           | 2020 | 2020 |
| <i>Arocatus roeselii</i> (Schilling, 1829)              |                                           | 2016 | 2016 |
| <i>Capsodes</i> sp.                                     |                                           | 2013 | 2013 |
| <i>Cardiastethus fasciiventris</i> (Garbiglietti, 1869) |                                           | 2016 | 2016 |
| <i>Centrotus cornutus</i> (Linnaeus, 1758)              | Demi-diable                               | 2013 | 2021 |
| <i>Coriomeris</i> (affinis)                             |                                           | 2013 | 2013 |
| <i>Dolycoris baccarum</i> (Linnaeus, 1758)              | Punaise brune à antennes & bords panachés | 2013 | 2018 |
| <i>Dyroderes umbraculatus</i> (Fabricius, 1775)         |                                           | 2020 | 2020 |
| <i>Eremocoris podagricus</i> (Fabricius, 1775)          |                                           | 2016 | 2016 |
| <i>Gonocerus acuteangulatus</i> (Goeze, 1778)           | Gonocère du buis                          | 2017 | 2020 |
| <i>Orius</i> Wolff, 1811                                |                                           | 2016 | 2019 |
| <i>Podops inunctus</i> (Fabricius, 1775)                |                                           | 2017 | 2017 |
| <i>Psallus</i> Fieber, 1858                             |                                           | 2020 | 2020 |
| <i>Pyrrhocoris apterus</i> (Linnaeus, 1758)             | Gendarme                                  | 2016 | 2019 |

|                                                              |                                                          |      |      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|
| 1758)                                                        |                                                          |      |      |
| <i>Rhaphigaster nebulosa</i> (Poda, 1761)                    | Punaise nébuleuse                                        | 2015 | 2020 |
| <i>Sciocoris homalonotus</i> Fieber, 1851                    |                                                          | 2016 | 2016 |
| <i>Stenodema laevigata</i> (Linnaeus, 1758)                  |                                                          | 2019 | 2019 |
| <i>Stygnocoris fuliginus</i> (Geoffroy, 1785)                |                                                          | 2020 | 2020 |
| <i>Taphropeltus</i> sp.                                      |                                                          | 2013 | 2013 |
| <i>Tetraneura ulmi</i> (Linnaeus, 1758)                      |                                                          | 2020 | 2020 |
| <i>Tingis auriculata</i> (A. Costa, 1847)                    |                                                          | 2020 | 2020 |
| <i>Tropistethus holosericus</i> (Scholtz, 1846)              |                                                          | 2020 | 2020 |
| <b>Hétérocères</b>                                           |                                                          |      |      |
| <i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)                 | Ecaille chinée (L')                                      | 1999 | 2018 |
| <i>Aedia funesta</i> (Esper, 1786)                           | Pie (La)                                                 | 2001 | 2001 |
| <i>Thyris fenestrella</i> (Scopoli, 1763)                    | Pygmée (Le), Sphinx-Pygmée (Le)                          | 2013 | 2015 |
| <i>Zygaena transalpina</i> (Esper, 1780)                     | Zygène transalpine (La)                                  | 2001 | 2001 |
| <i>Alucita hexadactyla</i> (Linnaeus, 1758)                  |                                                          | 2016 | 2018 |
| <i>Anania verbascalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)     |                                                          | 2001 | 2001 |
| <i>Aplocera efformata</i> (Guenée, 1858)                     | Petite Rayure (La)                                       | 2001 | 2001 |
| <i>Aplocera plagiata</i> (Linnaeus, 1758)                    | Triple Raie (La), Rayure commune (La)                    | 2001 | 2001 |
| <i>Arctia caja</i> (Linnaeus, 1758)                          | Ecaille Martre (L'), Hérissone (La)                      | 2019 | 2019 |
| <i>Arctia villica</i> (Linnaeus, 1758)                       | Ecaille fermière (L'), Ecaille villageoise (L')          | 2018 | 2018 |
| <i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758)                     | Gamma (Le)                                               | 2001 | 2021 |
| <i>Camptogramma bilineata</i> (Linnaeus, 1758)               | Brocatelle d'or (La)                                     | 2019 | 2019 |
| <i>Chamaesphecia Spuler</i> , 1910                           |                                                          | 2015 | 2015 |
| <i>Chiasmia clathrata</i> (Linnaeus, 1758)                   | Réseau (Le), Géomètre à barreaux (La)                    | 1999 | 2021 |
| <i>Dysgonia algira</i> (Linnaeus, 1767)                      | Passagère (La)                                           | 2020 | 2020 |
| <i>Ematurga atomaria</i> (Linnaeus, 1758)                    | Phalène picotée (La)                                     | 2015 | 2021 |
| <i>Epirrhoe alternata</i> (O.F. Müller, 1764)                | Alternée (L')                                            | 2001 | 2001 |
| <i>Euclidia glyphica</i> (Linnaeus, 1758)                    | Doublure jaune (La)                                      | 1999 | 2021 |
| <i>Eupithecia centaureata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Eupithécie des Centaurées (L'), Eupithécie oblongue (L') | 2016 | 2016 |
| <i>Hemaris fuciformis</i> (Linnaeus, 1758)                   | Sphinx gazé (Le), Sphinx du Chèvrefeuille (Le)           | 2018 | 2020 |

|                                                            |                                                   |      |      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|
| <i>Hyles euphorbiae</i> (Linnaeus, 1758)                   | Sphinx de l'Euphorbe (Le)                         | 1999 | 2013 |
| <i>Lasiocampa quercus</i> (Linnaeus, 1758)                 | Bombyx du Chêne (Le), Minime à bandes jaunes (Le) | 2018 | 2018 |
| <i>Macroglossum stellatarum</i> (Linnaeus, 1758)           | Moro-Sphinx (Le), Sphinx du Caille-Lait (Le)      | 2011 | 2021 |
| <i>Marasmarcha lunaedactyla</i> (Haworth, 1811)            |                                                   | 2001 | 2001 |
| <i>Mythimna albipuncta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)  | Point blanc (Le)                                  | 2021 | 2021 |
| <i>Opisthograptis luteolata</i> (Linnaeus, 1758)           | Citronnelle rouillée (La)                         | 2010 | 2010 |
| <i>Panemeria tenebrata</i> (Scopoli, 1763)                 | Noctuelle héliaque (La)                           | 2001 | 2001 |
| <i>Pleurota aristella</i> (Linnaeus, 1767)                 |                                                   | 2001 | 2001 |
| <i>Pterophorus pentadactylus</i> (Linnaeus, 1758)          |                                                   | 2018 | 2018 |
| <i>Pyrausta aurata</i> (Scopoli, 1763)                     |                                                   | 2001 | 2019 |
| <i>Saturnia pavonia</i> (Linnaeus, 1758)                   | Petit Paon de Nuit (Le)                           | 2018 | 2019 |
| <i>Scoliopteryx libatrix</i> (Linnaeus, 1758)              | Découpure (La)                                    | 2016 | 2018 |
| <i>Synanthedon tipuliformis</i> (Clerck, 1759)             | Sésie du Groseillier (La)                         | 2001 | 2001 |
| <i>Triphosa dubitata</i> (Linnaeus, 1758)                  | Incertaine (L'), Dent-de-Scie (La), Douteuse (La) | 2013 | 2018 |
| <i>Tyta luctuosa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)        | Noctuelle en deuil (La)                           | 2019 | 2021 |
| <i>Zygaena trifolii</i> (Esper, 1783)                      | Zygène des prés (La), Zygène des Cornettes (La)   | 1999 | 2021 |
| <i>Acontia trabealis</i> (Scopoli, 1763)                   | Arlequinette jaune (L')                           | 2019 | 2019 |
| <i>Agrotis bigramma</i> (Esper, 1790)                      | Noctuelle épaisse                                 | 1999 | 1999 |
| <i>Agrotis exclamatoris</i> (Linnaeus, 1758)               | Point d'exclamation                               | 1999 | 1999 |
| <i>Amphipyra pyramidea</i> (Linnaeus, 1758)                | Noctuelle du noyer                                | 1999 | 1999 |
| <i>Cucullia umbratica</i> (Linnaeus, 1758)                 | Ombrageuse                                        | 1999 | 2008 |
| <i>Diacrisia sannio</i> (Linnaeus, 1758)                   | Bordure ensanglantée                              | 1999 | 1999 |
| <i>Eilema complana</i> (Linnaeus, 1758)                    | Manteau à tête jaune                              | 1999 | 1999 |
| <i>Emmelina monodactyla</i> (Linnaeus, 1758)               |                                                   | 2001 | 2001 |
| <i>Eupithecia breviculata</i> (Donzel, 1837)               | Eupithécie rouillée                               | 1999 | 1999 |
| <i>Eupithecia nanata</i> (Hübner, 1813)                    | Eupithécie naine                                  | 1999 | 1999 |
| <i>Furcula furcula</i> (Clerck, 1759)                      | Queue fourchue du hêtre                           | 1999 | 1999 |
| <i>Gandaritis pyraliata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) |                                                   | 1999 | 1999 |
| <i>Heliothis virescens</i> (Hufnagel, 1766)                | Noctuelle de la Cardère                           | 1999 | 1999 |

|                                                               |                                                                                      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| <i>Hoplodrina alsines</i> (Brahm)                             |                                                                                      | 1999 | 1999 |
| <i>Horisme tersata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)         | Horisme rayé                                                                         | 1999 | 1999 |
| <i>Idaea humiliata</i> (Hufnagel, 1767)                       | Phalène à côte rousse                                                                | 1999 | 1999 |
| <i>Macdunnoughia confusa</i> (Stephens, 1850)                 | Goutte d'Argent (La)                                                                 | 2013 | 2013 |
| <i>Malacosoma neustria</i> (Linnaeus, 1758)                   | Bombyx à livrée                                                                      | 1999 | 1999 |
| <i>Melanchra persicariae</i> (Linnaeus, 1761)                 | Noctuelle de la persicaire                                                           | 1999 | 1999 |
| <i>Mesoligia furuncula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)     | Noctuelle furoncule                                                                  | 1999 | 1999 |
| <i>Oligia latruncula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)       | Trompeuse                                                                            | 1999 | 1999 |
| <i>Oncocera semirubella</i> (Scopoli, 1763)                   |                                                                                      | 2001 | 2001 |
| <i>Pasiphila rectangulata</i> (Linnaeus, 1758)                | Eupithécie rectangulaire                                                             | 1999 | 1999 |
| <i>Pterapherapteryx sexalata</i> (Retzius, 1783)              | Phalène à six ailes                                                                  | 1999 | 1999 |
| <i>Pyrausta despicata</i> (Scopoli, 1763)                     |                                                                                      | 2019 | 2019 |
| <i>Scopula ornata</i> (Scopoli, 1763)                         | Acidalie ornée (L')                                                                  | 1999 | 2017 |
| <i>Scotopteryx chenopodiata</i> (Linnaeus, 1758)              | Phalène de l'ansérine                                                                | 1999 | 1999 |
| <i>Siona lineata</i> (Scopoli, 1763)                          | Divisée                                                                              | 2001 | 2021 |
| <i>Spilarctia lutea</i> (Hufnagel, 1766)                      | Écaille-lièvre                                                                       | 1999 | 1999 |
| <i>Stigmella lemniscella</i> (Zeller, 1839)                   |                                                                                      | 2020 | 2020 |
| <i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Processionnaire du Pin                                                               | 1999 | 1999 |
| <i>Timandra comae</i> Schmidt, 1931                           | Timandre aimée (La)                                                                  | 2016 | 2018 |
| <i>Tyria jacobaeae</i> (Linnaeus, 1758)                       | Goutte-de-sang                                                                       | 2021 | 2021 |
| <i>Zeuzera pyrina</i> (Linnaeus, 1761)                        | Zeuzère du poirier                                                                   | 1999 | 1999 |
| <i>Zygaena filipendulae</i> (Linnaeus, 1758)                  | Zygène du Pied-de-Poule (La), Zygène des Lotiers (La), Zygène de la Filipendule (La) | 2017 | 2020 |
| <b>Hyménoptères</b>                                           |                                                                                      |      |      |
| <i>Bombus hypnorum</i> (Linnaeus, 1758)                       | Bourdon des arbres                                                                   | 2021 | 2021 |
| <i>Bombus lapidarius</i> (Linnaeus, 1758)                     | Bourdon des pierres                                                                  | 2001 | 2001 |
| <i>Aglaostigma fulvipes</i> (Scopoli, 1763)                   |                                                                                      | 2001 | 2001 |
| <i>Arge cyanocrocea</i> (Förster, 1771)                       |                                                                                      | 2001 | 2001 |
| <i>Arge thoracica</i> (Spinola, 1808)                         |                                                                                      | 2001 | 2001 |
| <i>Athalia bicolor</i> Audinet-Serville, 1823                 |                                                                                      | 2001 | 2001 |
| <i>Athalia cordata</i> Audinet-Serville, 1823                 |                                                                                      | 2001 | 2001 |

|                                                       |                                                                              |      |      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| <i>Athalia rosae</i> (Linnaeus, 1758)                 | Tenthrede de la rave                                                         | 2001 | 2001 |
| <i>Bembix rostrata</i> (Linnaeus, 1758)               |                                                                              | 2001 | 2001 |
| <i>Cephalodo bifasciata</i> (Müller, 1766)            |                                                                              | 2001 | 2001 |
| <i>Cephus spinipes</i> (Panzer, 1800)                 |                                                                              | 2001 | 2001 |
| <i>Emphytus laticinctus</i> (Audinet-Serville, 1823)  |                                                                              | 2001 | 2001 |
| <i>Eutomostethus gagathinus</i> (Klug, 1816)          |                                                                              | 2001 | 2001 |
| <i>Macrophya montana</i> (Scopoli, 1763)              | Mouche-à -scie à trois bandes jaunes                                         | 2001 | 2001 |
| <i>Myrmica Latreille</i> , 1804                       |                                                                              | 2018 | 2018 |
| <i>Nematus lucidus</i> (Panzer, 1801)                 |                                                                              | 2001 | 2001 |
| <i>Rhogogaster viridis</i> (Linnaeus, 1758)           |                                                                              | 2001 | 2001 |
| <i>Sterictiphora angelicae</i> (Panzer, 1799)         |                                                                              | 2001 | 2001 |
| <i>Tenthredopsis litterata</i> (Geoffroy, 1785)       | Mouche-à -scie porte-câur, Mouche-à -scie à pattes fauves et taches blanches | 2001 | 2001 |
| <i>Tenthredopsis sordida</i> (Klug, 1817)             |                                                                              | 2001 | 2001 |
| <i>Vespa crabro</i> Linnaeus, 1758                    | Frelon d'Europe, Frelon, Guichard                                            | 2015 | 2019 |
| <i>Vespa velutina</i> Lepeletier, 1836                | Frelon à pattes jaunes, Frelon asiatique, Vespa veloutée                     | 2018 | 2018 |
| <i>Zonulodo distinguenda</i> (Stein, 1885)            |                                                                              | 2001 | 2001 |
| <i>Allantus laticinctus</i> (Serville, 1823)          |                                                                              | 2001 | 2001 |
| <i>Andrena florea</i> <b>Fabricius, 1793</b>          |                                                                              | 2020 | 2020 |
| <i>Anthidiellum strigatum</i> ( <b>Panzer, 1805</b> ) |                                                                              | 2020 | 2020 |
| <i>Anthidium oblongatum</i> ( <b>Illiger, 1806</b> )  |                                                                              | 2020 | 2020 |
| <i>Apis mellifera</i> Linnaeus, 1758                  |                                                                              | 2020 | 2020 |
| <i>Arge ustulata</i> (Linnaeus, 1758)                 | Mouche-à -scie noire à ailes jaunes                                          | 2001 | 2001 |
| <i>Bombus pascuorum</i> (Scopoli, 1763)               | Bourdon des champs                                                           | 2001 | 2020 |
| <i>Camponotus piceus</i> (Leach, 1825)                |                                                                              | 2016 | 2016 |
| <i>Cryptocheilus notatus</i> (Rossius, 1792)          |                                                                              | 2020 | 2020 |
| <i>Diplolepis rosae</i> (Linnaeus, 1758)              | Cynips du rosier                                                             | 2018 | 2018 |
| <i>Harpactus laevis</i> ( <b>Latreille, 1792</b> )    |                                                                              | 2020 | 2020 |
| <i>Isodontia mexicana</i> (Saussure, 1867)            |                                                                              | 2020 | 2020 |
| <i>Macrophya annulata</i> (Geoffroy, 1785)            | Mouche-à -scie noire, avec le milieu du ventre fauve                         | 2001 | 2001 |
| <i>Macrophya duodecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)    |                                                                              | 2001 | 2001 |
| <i>Priocnemis pusilla</i> (Schioedte,                 |                                                                              | 2020 | 2020 |



|                                                               |                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|
| 1837)                                                         |                                                                     |      |      |
| <i>Pseudoanthidium nanum</i><br>(Mocsáry, 1881)               |                                                                     | 2020 | 2020 |
| <i>Scolia hirta</i> hirta (Schrank, 1781)                     |                                                                     | 2020 | 2020 |
| <i>Tenthredo bifasciata</i><br>bifasciata (O.F. Müller, 1766) | Tenthrede bifasciée                                                 | 2001 | 2001 |
| <i>Tenthredo temula</i> Scopoli, 1763                         |                                                                     | 2001 | 2001 |
| <i>Tenthredopsis nassata</i><br>(Linnaeus, 1767)              | Mouche-à -scie perlée                                               | 2001 | 2001 |
| <i>Trachelus troglodyta</i><br>(Fabricius, 1787)              |                                                                     | 2001 | 2001 |
| <i>Xylocopa violacea</i> (Linnaeus, 1758)                     |                                                                     | 2020 | 2020 |
| <i>Aphaenogaster subterranea</i><br>(Latreille, 1798)         |                                                                     | 2016 | 2018 |
| <i>Camponotus aethiops</i><br>(Latreille, 1798)               |                                                                     | 2016 | 2016 |
| <i>Formica cunicularia</i> (Latreille, 1798)                  |                                                                     | 2016 | 2018 |
| <i>Formica fusca</i> (Linnaeus, 1758)                         |                                                                     | 2019 | 2019 |
| <i>Formica gagates</i> (Latreille, 1798)                      |                                                                     | 2016 | 2018 |
| <i>Lasius alienus</i> (Forster, 1850)                         |                                                                     | 2016 | 2018 |
| <i>Lasius brunneus</i> (Latreille, 1798)                      |                                                                     | 2019 | 2019 |
| <i>Lasius emarginatus</i> (Olivier, 1792)                     |                                                                     | 2019 | 2019 |
| <i>Lasius myops</i> (Forel, 1894)                             |                                                                     | 2019 | 2019 |
| <i>Lasius niger</i> (Linnaeus, 1758)                          |                                                                     | 2016 | 2018 |
| <i>Lasius platythorax</i> (Seifert, 1991)                     |                                                                     | 2019 | 2019 |
| <i>Lasius umbratus</i> (Nylander, 1846)                       |                                                                     | 2019 | 2019 |
| <i>Myrmica sabuleti</i> (Meinert, 1861)                       |                                                                     | 2016 | 2018 |
| <i>Plagiolepis pygmaea</i> (Latreille, 1798)                  |                                                                     | 2016 | 2018 |
| <i>Solenopsis fugax</i> (Latreille, 1798)                     |                                                                     | 2018 | 2018 |
| <i>Tapinoma erraticum</i> (Latreille, 1798)                   |                                                                     | 2016 | 2018 |
| <i>Tetramorium caespitum</i><br>(Linnaeus, 1758)              |                                                                     | 2016 | 2018 |
| <b>Mammifères (hors chiroptères)</b>                          |                                                                     |      |      |
| <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)                   | Chevreuril européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrette (femelle) | 2003 | 2021 |
| <i>Clethrionomys glareolus</i><br>(Schreber, 1780)            | Campagnol roussâtre                                                 | 2017 | 2019 |
| <i>Crocidura russula</i> (Hermann, 1780)                      | Crocidure musette                                                   | 2015 | 2015 |
| <i>Micromys minutus</i> (Pallas,                              | Rat des moissons                                                    | 2015 | 2015 |

|                                                     |                                 |      |      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|
| 1771)                                               |                                 |      |      |
| <i>Microtus agrestis</i> (Linnaeus, 1760)           | Campagnol agreste               | 2015 | 2015 |
| <i>Mus musculus</i> Linnaeus, 1758                  | Souris grise, Souris domestique | 2015 | 2015 |
| <i>Sorex coronatus</i> Millet, 1828                 | Musaraigne couronnée            | 2015 | 2015 |
| <i>Talpa europaea</i> Linnaeus, 1758                | Taupe d'Europe                  | 2021 | 2021 |
| <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)               | Renard roux, Renard, Goupil     | 1994 | 2020 |
| <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)       | Lapin de garenne                | 2011 | 2017 |
| <i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758)         | Mulot sylvestre                 | 2015 | 2021 |
| <i>Eliomys quercinus</i> (Linnaeus, 1766)           | Lérot                           | 1989 | 1989 |
| <i>Lepus europaeus</i> (Pallas, 1778)               | Lièvre d'Europe                 | 2006 | 2006 |
| <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)                 | Blaireau européen               | 1994 | 1994 |
| <i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1778)              | Campagnol des champs            | 2015 | 2015 |
| <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)              | Ragondin                        | 2005 | 2005 |
| <i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769)         |                                 | 2015 | 2015 |
| <b>Mantoptères</b>                                  |                                 |      |      |
| <i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)            | Mante religieuse                | 2001 | 2021 |
| <b>Mollusques</b>                                   |                                 |      |      |
| <i>Arion rufus</i> (Linnaeus, 1758)                 | Grande loche                    | 2016 | 2017 |
| <i>Discus rotundatus</i> (O.F. Müller, 1774)        | Bouton commun                   | 2016 | 2017 |
| <i>Limax maximus</i> Linnaeus, 1758                 | Limace léopard                  | 2016 | 2017 |
| <i>Merdigera obscura</i> (O.F. Müller, 1774)        | Bulime boueux                   | 2016 | 2017 |
| <i>Monacha cartusiana</i> (O.F. Müller, 1774)       | Petit moine                     | 2017 | 2017 |
| <i>Pomatias elegans</i> (O.F. Müller, 1774)         | Elégante striée                 | 2016 | 2017 |
| <i>Pupilla muscorum</i> (Linnaeus, 1758)            | Maillot des mousses             | 2016 | 2017 |
| <i>Trochulus hispidus</i> (Linnaeus, 1758)          | Veloutée commune                | 2016 | 2016 |
| <i>Candidula</i> Kobelt, 1871                       |                                 | 2016 | 2016 |
| <i>Clausilia Draparnaud</i> , 1805                  |                                 | 2016 | 2016 |
| <i>Carychium minimum</i> O.F. Müller, 1774          |                                 | 2017 | 2017 |
| <i>Clausilia rugosa</i> parvula A. Férussac, 1807   |                                 | 2017 | 2017 |
| <i>Cochlicopa lubrica</i> (O.F. Müller, 1774)       |                                 | 2017 | 2017 |
| <i>Cochlodina laminata</i> laminata (Montagu, 1803) |                                 | 2017 | 2017 |
| <i>Cornu aspersum</i> (O.F. Müller, 1774)           | Escargot petit-gris             | 2016 | 2017 |
| <i>Hygromia cinctella</i>                           |                                 | 2017 | 2017 |

|                                                   |                                                  |      |      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|
| (Draparnaud, 1801)                                |                                                  |      |      |
| <i>Euglesa obtusalis</i> (Lamarck, 1818)          |                                                  | 2017 | 2017 |
| <i>Lauria cylindracea</i> (da Costa, 1778)        | Maillot commun                                   | 2016 | 2017 |
| <i>Nesovitrea hammonis</i> (Strøm, 1765)          |                                                  | 2017 | 2017 |
| <i>Oxychilus draparnaudi</i> (H. Beck, 1837)      |                                                  | 2017 | 2017 |
| <i>Punctum pygmaeum</i> (Draparnaud, 1801)        |                                                  | 2017 | 2017 |
| <i>Succinea putris</i> (Linnaeus, 1758)           |                                                  | 2017 | 2017 |
| <i>Truncatellina callicratis</i> (Scacchi, 1833)  |                                                  | 2017 | 2017 |
| <i>Vallonia costata</i> (O.F. Müller, 1774)       |                                                  | 2017 | 2017 |
| <i>Vallonia pulchella</i> (O.F. Müller, 1774)     |                                                  | 2017 | 2017 |
| <i>Valvata cristata</i> O.F. Müller, 1774         |                                                  | 2017 | 2017 |
| <i>Vitrea crystallina</i> (O.F. Müller, 1774)     |                                                  | 2017 | 2017 |
| <i>Zonitoides nitidus</i> (O.F. Müller, 1774)     |                                                  | 2017 | 2017 |
| <b>Neuroptères</b>                                |                                                  |      |      |
| <i>Distoleon tetragrammicus</i> (Fabricius, 1798) | Fourmillion longicorne                           | 2019 | 2019 |
| <i>Myrmeleontidae</i> Latreille, 1802             |                                                  | 2013 | 2018 |
| <b>Odonates</b>                                   |                                                  |      |      |
| <i>Aeshna cyanea</i> (O.F. Müller, 1764)          | Aesche bleue (L')                                | 2015 | 2015 |
| <i>Anax imperator</i> Leach, 1815                 | Anax empereur (L')                               | 2000 | 2016 |
| <i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1780)        | Caloptéryx éclatant                              | 1999 | 2021 |
| <i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)          | Caloptéryx vierge                                | 2010 | 2020 |
| <i>Chalcolestes viridis</i> (Vander Linden, 1825) | Leste vert                                       | 2010 | 2021 |
| <i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)         | Agrion jouvencelle                               | 2000 | 2021 |
| <i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842)         | Agrion mignon (L')                               | 2013 | 2014 |
| <i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)  | Agrion porte-coupe                               | 2000 | 2014 |
| <i>Erythromma lindenii</i> (Selys, 1840)          | Agrion de Vander Linden, Naïade de Vander Linden | 1999 | 2021 |
| <i>Gomphus pulchellus</i> Selys, 1840             | Gomphe joli (Le)                                 | 2005 | 2016 |
| <i>Gomphus vulgatissimus</i> (Linnaeus, 1758)     | Gomphe vulgaire (Le)                             | 2011 | 2015 |
| <i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)     | Agrion élégant                                   | 1999 | 2021 |
| <i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798)          | Leste sauvage                                    | 2000 | 2019 |

|                                                             |                                                                                                                             |      |      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 1798)                                                       |                                                                                                                             |      |      |
| <i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758                    | Libellule déprimée (La)                                                                                                     | 2008 | 2021 |
| <i>Libellula fulva</i> O.F. Müller, 1764                    | Libellule fauve (La)                                                                                                        | 1999 | 2020 |
| <i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)               | Orthétrum réticulé (L')                                                                                                     | 2000 | 2019 |
| <i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)             | Orthétrum bleuissant (L')                                                                                                   | 2012 | 2019 |
| <i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771)                  | Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre                                                                                 | 2000 | 2021 |
| <i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)                   | Petite nymphe au corps de feu (La)                                                                                          | 2001 | 2003 |
| <i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)             | Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le)                                                                           | 2008 | 2020 |
| <i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)             | Sympétrum fascié (Le)                                                                                                       | 2010 | 2014 |
| <i>Boyeria irene</i> (Boyer de Fonscolombe, 1838)           | Aeschne paisible (L')                                                                                                       | 2014 | 2017 |
| <i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)            | Agrion de Mercure                                                                                                           | 2017 | 2019 |
| <i>Oxygastra curtisii</i> (Dale, 1834)                      | Cordulie à corps fin (La), Oxycordulie à corps fin (L')                                                                     | 2015 | 2020 |
| <i>Aeshna mixta</i> (Latreille, 1805)                       | Aeschne mixte                                                                                                               | 2000 | 2000 |
| <i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807)               | Cordulégastré annelé (Le)                                                                                                   | 2015 | 2015 |
| <i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758)                      | Cordulie bronzée                                                                                                            | 2012 | 2012 |
| <i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758              | Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La)                                                                | 2011 | 2014 |
| <i>Onychogomphus forcipatus</i> (Linnaeus, 1758)            | Gomphe à forceps (Le), Gomphe à pinces (Le)                                                                                 | 2020 | 2020 |
| <i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820)                 | Leste brun                                                                                                                  | 2015 | 2015 |
| <i>Sympetrum meridionale</i> (Selys, 1841)                  | Sympétrum méridional                                                                                                        | 2014 | 2014 |
| <b>Orthoptères</b>                                          |                                                                                                                             |      |      |
| <i>Calliptamus barbarus</i> (O.G. Costa, 1836)              | Caloptène ochracé, Criquet de Barbarie                                                                                      | 2012 | 2016 |
| <i>Calliptamus italicus</i> (Linnaeus, 1758)                | Caloptène italien, Criquet italien, Calliptame italique, Criquet italique                                                   | 1999 | 2020 |
| <i>Chorthippus albomarginatus</i> (De Geer, 1773)           | Criquet marginé                                                                                                             | 2019 | 2019 |
| <i>Chorthippus dorsatus</i> (Zetterstedt, 1821)             | Criquet verte-échine                                                                                                        | 2012 | 2021 |
| <i>Chrysochraon dispar</i> (Germar, 1834)                   | Criquet des clairières                                                                                                      | 2019 | 2019 |
| <i>Conocephalus fuscus</i> (Fabricius, 1793)                | Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun                                                                                         | 2013 | 2021 |
| <i>Euchorthippus declivus</i> (Brisout de Barneville, 1848) | Criquet des mouillères, Criquet des Bromes                                                                                  | 2009 | 2021 |
| <i>Gomphocerippus rufus</i> (Linnaeus, 1758)                | Gomphocère roux, Gomphocère, Gomphocère fauve                                                                               | 1999 | 2021 |
| <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> (Linnaeus, 1758)             | Courtillière commune, Courtillière, Taupe-Grillon, Perce-chaussée, Taupette, Avant-taupe, Ecrevisse de terre, Loup de terre | 2013 | 2021 |

|                                                         |                                                                                                                          |      |      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| <i>Meconema meridionale</i> A. Costa, 1860              | Méconème fragile                                                                                                         | 2013 | 2017 |
| <i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc, 1792)                 | Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie forestier, Némobie forestière                                               | 2019 | 2021 |
| <i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763)              | Grillon d'Italie, Oecanthe transparent, Grillon transparent, Vairà«t                                                     | 1999 | 2020 |
| <i>Phaneroptera nana</i> Fieber, 1853                   | Phanéroptère méridional                                                                                                  | 2011 | 2021 |
| <i>Pholidoptera griseoptera</i> (De Geer, 1773)         | Decticelle cendrée, Ptérolèpe aptère                                                                                     | 2011 | 2021 |
| <i>Platycleis albopunctata</i> (Goeze, 1778)            | Decticelle grisâtre, Dectique gris                                                                                       | 1999 | 2021 |
| <i>Pseudochorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821) | Criquet des pâtures, Oedipode parallèle                                                                                  | 2013 | 2021 |
| <i>Roeseliana roeselii</i> (Hagenbach, 1822)            |                                                                                                                          | 2013 | 2021 |
| <i>Ruspolia nitidula</i> (Scopoli, 1786)                | Conocéphale gracieux, Conocéphale mandibulaire                                                                           | 2013 | 2021 |
| <i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)             | Criquet ensanglanté, Å'dipode ensanglantée                                                                               | 2013 | 2021 |
| <i>Tetrix subulata</i> (Linnaeus, 1758)                 | Tétrix riverain, Tétrix subulé, Tétrix subulée, Criquet à corselet allongé                                               | 2015 | 2018 |
| <i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)          | Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas                            | 2000 | 2021 |
| <i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804)          | Conocéphale des Roseaux                                                                                                  | 2013 | 2021 |
| <i>Gomphocerippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758)       |                                                                                                                          | 2016 | 2021 |
| <i>Gomphocerippus brunneus</i> (Thunberg, 1815)         |                                                                                                                          | 2019 | 2019 |
| <i>Chorthippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758)          | Criquet mélodieux                                                                                                        | 2012 | 2012 |
| <i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)       | Criquet des pâtures                                                                                                      | 1999 | 2013 |
| <i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758                | Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill | 2013 | 2020 |
| <i>Leptophyes punctatissima</i> (Bosc, 1792)            | Leptophye ponctuée, Sauterelle ponctuée, Barbitiste trèsponctué                                                          | 2018 | 2021 |
| <i>Mecostethus parapleurus</i> (Hagenbach, 1822)        | Criquet des Roseaux, Parapleure alliacé                                                                                  | 2013 | 2021 |
| <i>Myrmeleotettix maculatus</i> (Thunberg, 1815)        | Gomphocère tacheté                                                                                                       | 1999 | 1999 |
| <i>Oedipoda caerulea</i> (Linnaeus, 1758)               | OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OEdipode bleue, Oedipode bleuâtre    | 2012 | 2020 |
| <i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761)                | Phanéroptère commun                                                                                                      | 1999 | 2015 |
| <i>Tessellana tessellata</i> (Charpentier, 1825)        | Decticelle carroyée                                                                                                      | 2013 | 2021 |
| <i>Tetrix undulata</i> (Sowerby, 1806)                  | Tetrix commun                                                                                                            | 2013 | 2013 |
| <b>Phasmoptères</b>                                     |                                                                                                                          |      |      |
| <i>Clonopsis gallica</i> (Charpentier, 1825)            | Phasme gaulois                                                                                                           | 2017 | 2020 |
| <b>Poissons</b>                                         |                                                                                                                          |      |      |
| <i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)               | Anguille d'Europe                                                                                                        | 2017 | 2017 |



|                                                       |                                                                                                                                  |      |      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 1758)                                                 |                                                                                                                                  |      |      |
| <b>Reptiles</b>                                       |                                                                                                                                  |      |      |
| <i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802                 |                                                                                                                                  | 1994 | 2021 |
| <i>Natrix helvetica</i> (Lacepède, 1789)              |                                                                                                                                  | 2010 | 2020 |
| <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)              | Lézard des murailles (Le)                                                                                                        | 1994 | 2021 |
| <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768             | Coronelle lisse (La)                                                                                                             | 2010 | 2018 |
| <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758)                  | Vipère aspic (La)                                                                                                                | 1997 | 2015 |
| <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758                 | Orvet fragile (L')                                                                                                               | 1994 | 2021 |
| <i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768)           | Couleuvre d'Esculape (La)                                                                                                        | 2008 | 2019 |
| <b>Rhopalocères</b>                                   |                                                                                                                                  |      |      |
| <i>Aglais io</i> (Linnaeus, 1758)                     | Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil -de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L')                                   | 1983 | 2021 |
| <i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)                | Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Renard (Le)                                                                   | 2014 | 2017 |
| <i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)        | Aurore (L')                                                                                                                      | 1983 | 2021 |
| <i>Aphantopus hyperantus</i> (Linnaeus, 1758)         | Tristan (Le)                                                                                                                     | 2013 | 2019 |
| <i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)               | Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La)                | 1983 | 2021 |
| <i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758)              | Carte géographique (La), Jaspé (Le)                                                                                              | 1983 | 2021 |
| <i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)               | Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argentée (La), Empereur (L')                                                        | 1983 | 2021 |
| <i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)  | Collier-de-corail (Le), Argus brun (L')                                                                                          | 1983 | 2021 |
| <i>Brenthis daphne</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Nacré de la Ronce (Le), Nacré lilacé (Le), Nacré lilas (Le), Daphné (Le), Grande Violette (La)                                   | 2007 | 2021 |
| <i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758)               | Thécla de la Ronce (La), Argus vert (L')                                                                                         | 1983 | 2021 |
| <i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)               | Hespérie de l'Alcée (L'), Hespérie de la Passe-Rose (L'), Grisette (La), Hespérie de la Guimauve (L'), Hespérie de la Mauve (L') | 1983 | 2021 |
| <i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)           | Azuré des Nerpruns (L'), Argus à bande noire (L'), Argus bordé (L'), Argiolus (L')                                               | 1983 | 2021 |
| <i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)         | Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foin (Le), Pamphile (Le)                                                     | 1983 | 2021 |
| <i>Colias crocea</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)     | Souci (Le)                                                                                                                       | 1983 | 2021 |
| <i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758)                 | Point de Hongrie (Le), Grisette (La)                                                                                             | 1983 | 2021 |
| <i>Iphiclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758)         | Flambé (Le)                                                                                                                      | 1983 | 2020 |
| <i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758)              | Petit Nacré (Le), Latonia (Le), Lathone (Le)                                                                                     | 1983 | 2021 |
| <i>Lampides boeticus</i> (Linnaeus, 1767)             | Azuré porte-queue (L'), Argus porte-queue (L'), Porte-Queue bleu strié (Le), Lycène du Baguenaudier (Le), Strié (Le)             | 2001 | 2020 |
| <i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767)             | Mégère (La), Satyre (Le)                                                                                                         | 1983 | 2021 |
| <i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758)              | Piéride du Lotier (La), Piéride de la Moutarde (La), Blanc-de-lait (Le)                                                          | 1983 | 2021 |
| <i>Limenitis reducta</i> Staudinger, 1901             | Sylvain azuré (Le), Camille (Le)                                                                                                 | 2015 | 2021 |

|                                                       |                                                                                                                                               |      |      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| <i>Lycaena tityrus</i> (Poda, 1761)                   | Cuivré fuligineux (Le), Argus myope (L'), Polyommate Xanthé (Le)                                                                              | 1983 | 2021 |
| <i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)           | Demi-Deuil (Le), Echiquier (L'), Echiquier commun (L'), Arge galathée (L')                                                                    | 1983 | 2021 |
| <i>Melitaea athalia</i> (Rottemburg, 1775)            | Mélitée du Mélampyre (La), Damier Athalie (Le)                                                                                                | 1983 | 2010 |
| <i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758)               | Mélitée du Plantain (La), Déesse à ceinturons (La), Damier du Plantain (Le), Damier pointillé (Le), Damier (Le), Mélitée de la Piloselle (La) | 2010 | 2021 |
| <i>Melitaea parthenoides</i> Keferstein, 1851         | Mélitée de la Lancéole (La), Mélitée des Scabieuses (La), Damier Parthénie (Le)                                                               | 2015 | 2021 |
| <i>Melitaea phoebe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Mélitée des Centaurées (La), Grand Damier (Le)                                                                                                | 2010 | 2021 |
| <i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)         | Grande Tortue (La), Vanesse de l'Orme (La), Grand-Renard (Le), Doré (Le)                                                                      | 2019 | 2020 |
| <i>Ochlodes sylvanus</i> (Esper, 1777)                | Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La)                                                                                                     | 1983 | 2021 |
| <i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758                 | Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le)                                                                                                          | 1983 | 2021 |
| <i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)              | Piérade du Chou (La), Grande Piérade du Chou (La), Papillon du Chou (Le)                                                                      | 1983 | 2021 |
| <i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)                   | Piérade du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le)                                                                                      | 1983 | 2021 |
| <i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)                  | Piérade de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piérade du Chou (La)                                                                | 1983 | 2021 |
| <i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)             | Gamma (Le), Robert-le-diable (Le), C-blanc (Le), Dentelle (La), Vanesse Gamma (La), Papillon-C (Le)                                           | 1983 | 2021 |
| <i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)          | Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')                                | 1983 | 2021 |
| <i>Thecla betulae</i> (Linnaeus, 1758)                | Thécla du Bouleau (La), Thècle du Bouleau (La), Porte-Queue à bandes fauves (Le)                                                              | 1999 | 2015 |
| <i>Thymelicus acteon</i> (Rottemburg, 1775)           | Hespérie du Chiendent (L'), Hespérie Actéon (L'), Actéon (L')                                                                                 | 1983 | 2021 |
| <i>Thymelicus lineola</i> (Ochsenheimer, 1808)        | Hespérie du Dactyle (L'), Hespérie européenne (au Canada) (L'), Ligné (Le), Hespérie orangée (L')                                             | 1983 | 2021 |
| <i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)                | Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de l'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nympe des Chardons (La)                     | 1983 | 2021 |
| <i>Colias alfacariensis</i> Ribbe, 1905               | Fluoré (Le)                                                                                                                                   | 2019 | 2019 |
| <i>Hamearis lucina</i> (Linnaeus, 1758)               | Lucine (La), Fauve à taches blanches (Le), Faune à taches blanches (Le)                                                                       | 2019 | 2019 |
| <i>Lysandra bellargus</i> (Rottemburg, 1775)          | Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')                                 | 1983 | 2021 |
| <i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758)               | Azuré du Serpolet (L'), Azuré d'Arion (L'), Argus à bandes brunes (L'), Arion (L'), Argus Arion (L')                                          | 1999 | 2021 |
| <i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus, 1758)                 | Hespérie de la Mauve (L')                                                                                                                     | 2019 | 2019 |
| <i>Satyrus pruni</i> (Linnaeus, 1758)                 | Thécla du Prunier (La), Thécla du Coudrier (La), Porte-Queue brun à lignes blanches (Le)                                                      | 2015 | 2015 |
| <i>Plebejus kluk</i> , 1780                           |                                                                                                                                               | 2017 | 2017 |
| <i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758)                  | Grand mars changeant (Le), Grand Mars (Le), Chatoyant (Le)                                                                                    | 2019 | 2019 |
| <i>Boloria dia</i> (Linnaeus, 1767)                   | Petite Violette (La), Nacré violet (Le)                                                                                                       | 1983 | 2021 |
| <i>Colias hyale</i> (Linnaeus, 1758)                  | Soufré                                                                                                                                        | 1983 | 1999 |
| <i>Cupido alcetas</i> (Hoffmannsegg, 1804)            | Azuré de la Faucille (L'), Argus rase-queue (L'), Azuré frêle (L')                                                                            | 2004 | 2021 |
| <i>Cupido argiades</i> (Pallas, 1771)                 | Azuré du Trèfle (L'), Petit Porte-Queue (Le), Argus mini-queue (L'),                                                                          | 1983 | 2020 |

|                                              |                                                                                                                                                               |      |      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                                              | Myrmidon (Le)                                                                                                                                                 |      |      |
| <i>Cyaniris semiargus</i> (Rottemburg, 1775) | Azuré des Anthyllides (L'), Demi-Argus (Le), Argus violet (L')                                                                                                | 1983 | 2021 |
| <i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)    | Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La)                                                                                                              | 1983 | 2021 |
| <i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758)     | Némusien (Le), Ariane (L'), Némutien (Le), Satyre (Le)                                                                                                        | 1983 | 2021 |
| <i>Limenitis camilla</i> (Linnaeus, 1764)    | Petit sylvain                                                                                                                                                 | 2007 | 2007 |
| <i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)        | Cuivré des marais (Le), Grand Cuivré (Le), Grand Argus satiné (Le), Argus satiné à taches noires (Le), Lycène disparate (Le), Cuivré de la Parelle-d'eau (Le) | 2010 | 2021 |
| <i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1760)      | Cuivré commun (Le), Argus bronzé (L'), Bronzé (Le)                                                                                                            | 1983 | 2021 |
| <i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)      | Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La)                                                                                                         | 1983 | 2021 |
| <i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)      | Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Egérie (L')                                                                                                                 | 1983 | 2021 |
| <i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1771)     | Amaryllis (L')                                                                                                                                                | 1983 | 2021 |
| <i>Satyrion w-album</i> (Knoch, 1782)        | Thécla de l'Orme                                                                                                                                              | 2010 | 2019 |
| <i>Speyeria aglaja</i> (Linnaeus, 1758)      | Grand Nacré                                                                                                                                                   | 2018 | 2018 |
| <i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)    | Hespérie de la Houque                                                                                                                                         | 1983 | 2021 |
| <i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)     | Vulcain                                                                                                                                                       | 1983 | 2021 |